

Boletín ESTADÍSTICO No. XXXIII

Semana epidemiológica 19

sobre el exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia por COVID-19

De la primera semana epidemiológica de 2020 a la semana epidemiológica 19 de 2022, el porcentaje de exceso de mortalidad por todas las causas ha sido superior en los hombres que en las mujeres.

Hombres
(38.2%)

Mujeres
(30.9%)

1 ER PICO

En la semana epidemiológica 28 de 2020 (5 al 11 de julio): los **hombres** alcanzaron su primer pico con **114.7%** y una semana después las **mujeres** con **88.3%**.

2 DO PICO

En la semana epidemiológica 3 de 2021 (17 al 23 de enero): **205.1% para hombres** y **165.4% en mujeres** y, según los datos disponibles, la tendencia descendió entre las semanas epidemiológicas 3 a 22 (23 al 5 de junio), con **1.6% de exceso de mortalidad para hombres** y **1.0% para mujeres** en la semana epidemiológica 20 (16 al 22 de mayo).

3 ER PICO

En la semana epidemiológica 33 de 2021 (15 al 21 de agosto): **103.6% en hombres** y **105.2% en mujeres**. Para la semana epidemiológica 50 (12 al 18 de diciembre) se observó un descenso de **-1.9% en hombres** y en la semana epidemiológica 51 (19 al 25 de diciembre) descendió **1.0% para mujeres**.

4 TO PICO

En la semana epidemiológica 4 de 2022 (23 al 29 de enero): **87.2% en hombres** y **77.8% en mujeres**, también comenzando a descender de la semana epidemiológica 5 (30 de enero al 5 de febrero) hasta la 17 con **-22.6 % en hombres** y **-16.8 en mujeres**.