



Encuesta Nacional de Adicciones 2011

**GOBIERNO
FEDERAL**

SALUD



Directorio

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg

Secretario de Salud

Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci

Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Dr. Pablo Kuri Morales

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Lic. Igor Rosette Valencia

Subsecretario de Administración y Finanzas

Dr. Romeo Sergio Rodríguez Suárez

**Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud
y Hospitales de Alta Especialidad**

Mtro. Miguel Limón García

Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social

Mtro. José Francisco Caballero García

Titular de la Unidad de Análisis Económico

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa

Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Dr. José Méjtem Moctezuma

Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

Mtro. David García-Junco Machado

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Lic. Carlos Olmos Tomasini

Director General de Comunicación Social

Dr. Carlos Tena Tamayo

Comisionado Nacional contra las Adicciones

Dr. Mauricio Hernández Ávila

Director General del Instituto Nacional de Salud Pública

Dra. María Elena Medina-Mora Icaza

Directora General del Instituto Nacional De Psiquiatría

Dr. Ramón de la Fuente Muñiz

Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas

Primera edición 2012

D.R© Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)

Calzada México-Xochimilco 101 Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370

<http://www.inprf.gob.mx>

<http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx>

Editor: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz / Secretaría de Salud

Tiraje: 1000 ejemplares

Reservados todos los derechos

ISBN 978-607-460-284-5

Impreso en México / Printed in México

Diseño Editorial: Mónica Rodríguez. Diseño Interactivo: Aurora Paredes Mendoza

Citación Sugerida para el presente documento:

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud. **Encuesta Nacional de Adicciones 2011: Reporte de Drogas**. Villatoro-Velázquez JA, Medina-Mora ME, Fleiz-Bautista C, Téllez-Rojo MM, Mendoza-Alvarado LR, Romero-Martínez M, Gutiérrez-Reyes JP, Castro-Tinoco M, Hernández-Ávila M, Tena-Tamayo C, Alvear-Sevilla C y Guisa-Cruz V. México DF, México: INPRFM; 2012. Disponible en: www.inprf.gob.mx, www.conadic.gob.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx

Nota Importante Para el Lector

"La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 tiene representatividad para toda la población del país de 12 a 65 años que vive en sus hogares. Dado que su principal objetivo es evaluar lo que ha pasado en los últimos 3 años en el país, su estratificación fue regional, considerando 8 regiones, que son comparables con las encuestas previas que se han hecho con base en 8 regiones o estatales y, en el caso de 3 regiones, se pueden reagrupar adecuadamente las regiones de esta encuesta para fines de compatibilidad.

Una prioridad al realizar el presente estudio ha sido el contar con estadísticas actualizadas de la problemática, en menos tiempo entre encuestas, que en los estudios anteriores, para tomar decisiones dirigidas a la prevención y tratamiento de la problemática.

Se invita al lector a revisar con detalle la sección metodológica a fin de conocer con mayor precisión los alcances del presente estudio".

Créditos

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 es un esfuerzo coordinado por la Comisión Nacional Contra las Adicciones y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, con la participación del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", institución que tuvo a su cargo el diseño conceptual, la elaboración de los cuestionarios, la capacitación de los encuestadores, la supervisión del trabajo de campo así como el análisis de las secciones de drogas y alcohol; y del Instituto Nacional de Salud Pública que fue responsable del diseño muestral de la encuesta, del operativo de campo y del desarrollo del diseño conceptual y del análisis e interpretación de los datos de tabaco

La Encuesta se realizó con financiamiento de la Secretaría de Salud.

Coordinación General

Mauricio Hernández Avila
Carlos Tena Tamayo
Celina Alvear Sevilla
Ma. Elena Medina Mora Icaza
Mario Henry Rodríguez López
Secretaría de Salud

Diseño Conceptual

Mauricio Hernández Avila
Carlos Tena Tamayo
Celina Alvear Sevilla
Víctor Manuel Guisa Cruz
Secretaría de Salud

Ma. Elena Medina Mora Icaza
Jorge A. Villatoro Velázquez
Clara Fleiz Bautista
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Mario Henry Rodríguez López
Martha María Téllez-Rojo
Martín Romero Martínez
Laura R. Mendoza Alvarado
Eduardo César Lazcano Ponce
Luz Myriam Reynales Shigematsu
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño Logístico

Juan Pablo Gutiérrez
Manuel Castro Tinoco
Instituto Nacional de Salud Pública

Diseño y Control Muestral

Martín Romero Martínez
América Andrea Sandoval Zárate
Juan Manuel Zurita Luna
Guadalupe Álvarez Verde
Instituto Nacional de Salud Pública

Capacitación General Drogas y Alcohol

Clara Fleiz Bautista
Jorge A. Villatoro Velázquez
Midiam Moreno López
Aneel Monserrat Aguiñaga Martínez
Diana Anahi Fregoso Ito
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Natania F. Oliva Robles
Miguel Ángel López Brambila
Larisa Valdez Saab
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Capacitación General Tabaco

Luz Myriam Reynales Shigematsu
Rosaura Pérez Hernández
Paola Adanari Ortega Ceballos
Carlos Manuel Guerrero López
Instituto Nacional de Salud Pública

Capacitación Operativa

Manuel Castro Tinoco
Luis Vences Romero
Claudia Lizbeth Hernández Romero
Laura R. Mendoza Alvarado
María del Carmen Mariño Hernández
Instituto Nacional de Salud Pública

Capacitación Prevención del Delito de Alto Impacto

Manuel Mondragón y Kalb
Nora Frías Melgoza
Lucio Faustino Gómez Lira
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

Levantamiento de Campo

Juan Pablo Gutiérrez
Manuel Castro Tinoco
Instituto Nacional de Salud Pública

Supervisión de Trabajo de Campo

Clara Fleiz Bautista
Midiam Moreno López
Natania F. Oliva Robles
Marycarmen Noemí Bustos Gamiño
Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores
Miguel Ángel López Brambila
Aneel Monserrat Aguiñaga Martínez
Diana Anahi Fregoso Ito
Larisa Valdez Saab
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Laura R. Mendoza Alvarado
María Isidra Hernández Serrato
Luz María Álvarez Verde
Guadalupe Álvarez Verde
Gloria María Belem Trejo Valdivia
Instituto Nacional de Salud Pública

Desarrollo de Sistemas y Bases de Datos

Fernando Zapata
César Alejandro Fuentes
Esaú Jafet Palafox
Jaime Alfonso Rodríguez
Fernando González Hernández
Lucino Iván Espín Arellano
Instituto Nacional de Salud Pública

Análisis Estadístico de Drogas y Alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez

Midiam Moreno López

Marycarmen Noemí Bustos Gamiño

Filiberto Itzcóatl Gaytán Flores

Natania F. Oliva Robles

Ma. de Lourdes Gutiérrez López

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Elaboración del Reporte de Drogas y Alcohol

Jorge A. Villatoro Velázquez

Maria Elena Medina Mora Icaza

Clara Fleiz Bautista

Midiam Moreno López

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Análisis Estadístico de Tabaco

Luz Myriam Reynales Shigematsu

Carlos Manuel Guerrero López

Andrik Adán Vallejo Mateos

José Alberto Muños Hernández

Instituto Nacional de Salud Pública

Elaboración del Reporte de Tabaco

Eduardo César Lazcano Ponce

Luz Myriam Reynales Shigematsu

Carlos Manuel Guerrero López

Andrik Adán Vallejo Mateos

José Alberto Muños Hernández

Belén Sáenz de Miera Juárez

Tonatiuh Barrientos Gutiérrez

James F. Thrasher La Fontaine

Edna Judith Arillo Santillán

Rosaura Pérez Hernández

Instituto Nacional de Salud Pública

Reporte Metodológico

Martha María Téllez-Rojo

Laura Mendoza Alvarado,

Martín Romero Martínez,

Juan Pablo Gutiérrez,

Instituto Nacional de Salud Pública

Asesores para la Clasificación de Sustancias Psicoactivas

Dr. Mario Gómez

Dr. Arturo Ortiz

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

Contenido

Presentación

DROGAS

1. Panorama Epidemiológico del Consumo de Sustancias	1
2. Documento Metodológico	10
3. Resultados principales: Drogas	25
Población general de 12 a 65 años	26
Población adolescente 12 a 17 años	35
Población adulta de 18 a 65 años	42
Uso de servicios de la población usuaria de drogas de 12 a 65 años	53
4. Conclusiones	55
5. Glosario de Términos	62
6. Referencias	64
7. Anexo 1: Antecedentes Vigilancia Epidemiológica	67
8. Anexo 2: Panorama Internacional del Consumo de Drogas	102
9. Anexo 3: Cuadros Estadísticos de Droga	111

PRESENTACIÓN

El abuso de sustancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que se presenta tanto a nivel nacional como internacional. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

Los estudios epidemiológicos, tanto nacionales como mundiales nos demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y con sustancias más dañinas. Se observa además un aumento en el uso de drogas en la mujer, tanto legales como ilegales.

Ante este panorama, desde el inicio de esta administración el Gobierno Federal tiene como tarea total el de velar por la salud, el bienestar y la seguridad de la población del país.

En el campo de la oferta se han desmantelado grupos que se dedican a la producción y venta de las sustancias ilegales, lográndose grandes decomisos de estas mismas y de sus precursores.

En el campo de la demanda se han hecho grandes esfuerzos y acorde con el programa sectorial de salud (2007-2012), se han invertido más de 6 mil 600 millones de pesos en la prevención y tratamiento de las adicciones; con estos recursos se han construido 335 centros de atención primaria llamados "Centros Nueva Vida", que operan en toda la República, en los municipios de mayor incidencia. Esta red de servicios constituyen el primer eslabón en el tratamiento, lográndose articular en este sistema a instituciones públicas, privadas y sociales, contando en la actualidad con una oferta de atención que ofrece tratamiento y prevención en sus tres niveles.

Así mismo, en esta administración se lanzó la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida, coordinada por la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y con la participación de otras dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), además de otras instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales han llevado un mensaje preventivo a todo el país, dirigido no solamente a los menores y adolescentes, sino también a padres de familia.

Se ha trabajado intensamente en las escuelas de educación básica en la detección oportuna de niños en riesgo, por medio de la aplicación de una prueba de detección y tamizaje (POSIT); con este estudio se logra detectar casos de consumo de drogas incipientes o en situación de riesgo. Los casos que se detectan se refieren a los "Centros Nueva Vida" para su atención.

Con respecto a los avances en el control del tabaco, dándose cumplimiento al Convenio Marco, se cuenta con una Ley

General para el Control del Tabaco, en beneficio de los no fumadores, la no venta a menores de edad, la presentación de pictogramas en las cajetillas y los impuestos a los productos del tabaco.

En cuanto al control del uso nocivo del alcohol se han propuesto reformas a la Ley General de Salud, que se encuentran en estudio, en la Cámara de Diputados que regulará desde su producción, hasta la venta de este producto, haciendo énfasis en la prohibición de la oferta a menores. Se ha apoyado el programa del alcoholímetro y, en general, todos los programas que limiten el consumo excesivo.

Asimismo en esta administración y con el fin de brindar una mejor atención a la prevención y tratamiento a las adicciones en el 2011, se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), entidad que tiene a su cargo la elaboración y vigilancia de las políticas públicas, la coordinación intersectorial y la observancia de los compromisos internacionales. Y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), cuyo propósito es propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las Adicciones.

Es importante señalar, que al igual que en otros problemas de salud pública, los programas de prevención y tratamiento de las adicciones, deben estar sustentados en la información, la cual deberá ser confiable, científicamente sustentada, que dé cuenta de las características del fenómeno, de los factores que inciden en las adicciones desde la disponibilidad de las sustancias, las de mayor consumo, la percepción de daño y riesgo; asimismo indagar sobre las alternativas de prevención y tratamiento que se ofrecen en nuestro país.

México ha estado en la vanguardia en la epidemiología de las adicciones, ya que desde 1980, se han realizado cinco encuestas nacionales, en 1988, 1993, 1998, 2002 y 2008, las tres primeras registraban datos urbanos y en las dos últimas se agregaron datos del medio rural. Con estos estudios se ha logrado tener datos sobre la evolución del problema tanto en el medio urbano y rural, a nivel regional y estatal.

Estos estudios epidemiológicos se han llevado a cabo con una periodicidad de aproximadamente seis años, por ello esta Sexta Encuesta Nacional de Adicciones (2011), constituye un parteaguas en esta serie y señala nuestro interés para tener información actualizada sobre este fenómeno, para poder conocer la actitud de la población ante este problema y si asiste a tratamiento en los centros especializados para tal fin.

Este estudio se llevó a cabo en 17,500 viviendas seleccionadas en forma aleatoria. Para tal efecto el país se dividió en 8 regiones. Se aplicó una entrevista directa con adultos entre los 18 y 65 años y adolescentes entre 12 y 17 años.

La coordinación de esta encuesta se realizó, por la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), del Centro Nacional para la Prevención

y el Control de las Adicciones (CENADIC). Con la destacada participación del Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz" y del Instituto Nacional de Salud Pública.

Este documento presenta los resultados, los cuales se ponen a disposición de las autoridades, de la comunidad científica y de la población en general, para la toma de decisiones y reforzar las acciones preventivas y de tratamiento.

La Secretaría de Salud reforzará, con esta información las políticas públicas enfocadas en la perspectiva de salud, viendo a las personas con adicciones como enfermos, que merecen atención adecuada con los mismos derechos que tienen otros pacientes.

Agradecemos a las instituciones participantes, a los encuestadores y a los estados, que a través de los Consejos Estatales Contra las Adicciones (CECAS), dieron el apoyo necesario para la realización de esta encuesta.

Por último reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando, junto con los padres de familia, maestros y sociedad en general, en la prevención y el control de las adicciones para propiciar que nuestros niños y jóvenes crezcan dueños de sí mismos y de su futuro. Y que quienes ya sean presa de la enfermedad, recuperen su salud y se reincorporen a la sociedad.

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg

ENCUESTA NACIONAL
de adicciones 2011



**Panorama Epidemiológico
del Consumo de Sustancias**

Panorama Epidemiológico del Consumo de Sustancias

Nuestro país cuenta con una amplia experiencia en investigaciones epidemiológicas y cualitativas acerca del consumo de drogas. Desde la década de los setentas se han llevado a cabo en México estudios con una misma metodología, utilizando técnicas de recolección y análisis uniformes por cada tipo de población estudiada, que nos permiten conocer el panorama global del fenómeno del consumo de drogas en distintos escenarios tales como el hogar, las escuelas y los centros de tratamiento.

Antes de entrar a detalle en los diversos estudios, a manera de resumen, es importante señalar que los resultados de los diferentes estudios recientes muestran incrementos significativos en el uso de drogas ilegales, especialmente en el uso de marihuana.

Con respecto a las metanfetaminas, su aparición se documentó por primera vez en los noventas y en su consumo se observan incrementos significativos.

Asimismo, los centros de atención a usuarios de la frontera con los Estados Unidos, han detectado tasas altas de consumo de heroína, donde una gran proporción se consume vía intravenosa a través de prácticas de alto riesgo para la transmisión de VIH/SIDA y hepatitis B y C. Mientras tanto, el uso de drogas de prescripción médica ha permanecido en niveles bajos. Por otra parte, el abuso de alcohol se ha incrementado entre los jóvenes y el consumo de tabaco ha venido disminuyendo.

Asociado al tabaco y al alcohol, la percepción de riesgo del consumo entre la población se mantiene constante en la primera y ha disminuido en la segunda, lo cual es congruente con las tendencias de dichas sustancias. Lo que debe llamar nuestra atención, es que la tolerancia social se ha mantenido alta en ambas sustancias; es decir, su consumo sigue siendo socialmente aceptado (Villatoro et al 2011).

Bajo este contexto global, a continuación se muestran los resultados arrojados por diversas instituciones así como por estudios llevados a cabo en el país, como preámbulo y referente de los resultados encontrados en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Panorama Nacional

1. Encuestas de Hogares

Diversas encuestas en hogares se han realizado en nuestro país en relación al uso de sustancias. Algunas de ellas con representatividad nacional como lo son la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) (Secretaría de

Salud, 1990, 1994, 1998, 2003, 2009) y la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS). También se han llevado a cabo encuestas en distintas ciudades de la República como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro y Yucatán, en el año 2005 (Rojas, Fleiz, Villatoro, Gutiérrez & Medina-Mora, 2009).

La ENA, llevada a cabo de manera periódica, tiene la finalidad de medir la evolución del consumo de sustancias y otras problemáticas de salud mental. La última encuesta realizada en 2008, muestra un incremento en el consumo alguna vez de drogas ilegales y médicas en la población, en comparación con 2002, donde los hombres son los que reportan mayores consumos. La marihuana continúa siendo la sustancia de preferencia de los usuarios. En tanto, en la cocaína se observó un incremento del 1.4%, en 2002, a 2.4% en el 2008 (Secretaría de Salud, 2009).

Otro incremento reportado fue la dependencia a drogas, que pasó del 0.4% al 0.6% para el 2008, representando a casi 450 mil personas entre los 12 y 65 años.

En las demás drogas, las prevalencias se mantienen bajas y son menores al 1%.

En cuanto a la distribución regional, el norte del país mantiene las prevalencias más altas, especialmente Tamaulipas, y en el centro del país el Estado de Hidalgo; no obstante, el mayor incremento proporcional se reflejó en la región sur, especialmente por los índices encontrados en Quintana Roo.

En cuanto al alcohol, el abuso/dependencia incrementó del 4.1% en el 2002 a 5.5% para el 2008. Por sexo, ambos tuvieron incrementos importantes (8.3% a 9.7% en hombres y de 0.4% a 1.7% en mujeres).

En relación al tabaco, la encuesta de 2008 muestra una tendencia a la disminución. En 2002, el 23.5% de la población refirió ser fumador actual y en 2008 se redujo a 18.5%. Estos resultados son consistentes con la encuesta GATS (2009), la cual reporta que el 15.9% de la población mayor de 15 años es fumadora actual (Organización Panamericana de la Salud & Instituto Nacional de Salud Pública, 2010).

2. Encuestas en estudiantes

En el país, desafortunadamente aún no se cuenta con una encuesta nacional reciente en estudiantes. No obstante, el trabajo con diversos estados ha permitido contar con encuestas en estudiantes de nivel medio y medio superior en Nuevo León (2006), Jalisco y Estado de México (2009), así como en la Ciudad de México, que cuenta con mediciones periódicas (cada 3 años). Hay otro grupo de encuestas en esta población que han sido reportadas en la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008.

La medición realizada en Nuevo León (Villatoro, Gutiérrez, Quiroz, Juárez & Medina Mora, 2007) reporta una prevalencia de 9.4% en el consumo de cualquier droga alguna vez. Por sexo, el consumo en los hombres fue mayor (10.5%) que en las mujeres (8.4%). En el caso de los hombres, las drogas de preferencia fueron la marihuana (6.3%), cocaína e inhalables (3.5% cada una). Para las mujeres, las principales drogas fueron los tranquilizantes (3.6%), inhalables (2.4%) y las anfetaminas (1.9%). En relación al consumo de alcohol alguna vez, este fue de 43.9% donde el 44.6% eran hombres y el 43.2% mujeres.

Por su parte, en Jalisco (Chávez, Villatoro, Robles, Bretón, Sánchez, et al., 2010) se encontró una prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez en la vida de 16.5%, cifra mayor a la de Nuevo León. Por sexo, este consumo fue mayor en los hombres (17.7%) que en las mujeres (15.3%). Las drogas de preferencia en los hombres fueron marihuana (8.6%), inhalables (6.7%) y tranquilizantes (4.3%); para las mujeres, las drogas de preferencia fueron: tranquilizantes (6.7%), inhalables (4.4%) y anfetaminas (3.7%). Con respecto al consumo de alcohol alguna vez, su prevalencia en la población fue de 65.1%, 65.3% en hombres y 64.9% en mujeres.

En la encuesta del Estado de México (Martín del Campo, Villatoro, Mosqueda, Gaytán, López, et al., 2009) se reporta un consumo mayor de cualquier droga alguna vez (20.2%). que la reportada en el Estado de Jalisco. Por sexo, los datos se mantienen consistentes, ya que el consumo de drogas en este estado fue mayor en hombres (22.0%) que en mujeres (18.5%). Las drogas de preferencia en los hombres y las mujeres fueron los inhalables (11.2% y 9.5%) y la marihuana (10.9% y 6.4%). En relación al consumo de alcohol alguna vez, la prevalencia en estudiantes fue de 70.8%, siendo las mujeres quienes registran un mayor consumo de alcohol (71.9%) en relación con los hombres (69.7%).

Finalmente, las mediciones de 2006 y 2009 realizadas en la Ciudad de México (Villatoro et al, 2009; 2011) permiten analizar la evolución del consumo de drogas. Así, el consumo de cualquier droga alguna vez aumentó de 17.8% a 21.5%. En los hombres pasó de 19.1% a 22.6%, mientras que el mayor incremento se observó en las mujeres que aumentaron su consumo de 16.5% a 20.5%. Por sexo, las drogas de preferencia de hombres en 2006 y 2009 fueron la marihuana (11.2% y 14.0%) e inhalables (7.3% y 10.8%), con un incremento significativo en esta última medición. En las mujeres, las drogas de preferencia en 2006 fueron en primer lugar la marihuana (6.4%) seguida de los inhalables (6.2%) y en 2009 el orden de preferencia se invirtió, apareciendo principalmente los inhalables (10.0%) seguidos de la marihuana (8.8%). En cuanto al consumo de alcohol alguna vez, en 2006 la prevalencia fue de 68.8% (hombres 68.2% y mujeres 69.4%); para 2009 esta cifra incrementó a 71.4%, siendo el mismo porcentaje para ambos sexos.

3. Sistema de Registro e Información en Drogas (SRID)

La información proveniente del SRID (Ortiz, Martínez & Meza, 2010), que se realiza sólo en la Ciudad de México, indica que la marihuana es la sustancia que presenta el nivel de consumo más alto (61%). Los usuarios de esta sustancia inician antes de los 11 años; sin embargo el grupo más afectado es el de los 15 a 19 años (56.7%). Su nivel de uso más frecuente es el alto (20 días o más durante el último mes) en el 4.8% de los casos. La vía de administración más frecuente es fumada (98.7%).

En cuanto a los inhalables, estos representan el 40.4% del uso de sustancias alguna vez. El grupo más afectado es el de los 12 a 14 años de edad (45.5%). El nivel de uso más frecuente es alto (20 días o más en el último mes) en el 34.3% de los casos. El nombre genérico y popular más mencionado es el activo (73.1%).

La cocaína ocupa el tercer lugar de consumo en la prevalencia de alguna vez (34.0%), esto representa una disminución en comparación con lo encontrado en el reporte anterior (40.7%). El grupo más afectado es el de los 15 a 19 años de edad (45.9%). El nivel de uso más frecuente es el leve (1 a 5 días en el último mes) en el 38.8% de los casos. Los nombres que más reportan los usuarios son cocaína (73.4%) y crack (25.9%).

4. Resultados de los Centros de Integración Juvenil (CIJ)

La información obtenida de los pacientes que acuden por primera vez a los CIJ (Gutierrez & Castillo, 2010), muestra consistencias con lo reportado por los centros no gubernamentales. En estos centros, 25,665 personas solicitaron atención en 2009. Las principales sustancias que motivaron la demanda de tratamiento fueron alcohol (19.9%), cocaína (12.5%), marihuana (15.6%) e inhalables (14.1%).

Por perfil sociodemográfico, la mayor demanda de tratamiento fue por parte de los hombres (77.2%). Quienes acudieron principalmente, fueron jóvenes de 15 a 19 años de edad (31.9%) seguidos por los de 35 años o más (20.9%). En cuanto al estado civil, la mayor parte eran solteros (62.2%) y tenían estudios de nivel secundaria (45%). Con respecto a la ocupación, el 28.7% eran estudiantes y el 25% tenían un trabajo estable. El nivel socioeconómico de la mayoría fue medio bajo.

El tabaco fue la principal droga de inicio en los usuarios (55.4%), pero al analizar por sexo, la marihuana fue la principal droga de inicio en los hombres (89.8%), mientras que en las mujeres fueron los depresores (57%). En cuanto a la droga de impacto, en los hombres la marihuana (89.5%) y la cocaína (87.9) fueron principalmente las drogas por las que acudían a tratamiento y en las mujeres fueron el tabaco (41.3%) y los depresores (34.5%).

5. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA).

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones del país, realiza una medición del consumo de drogas en distintas áreas, incluyendo a Centros de Tratamiento y a los CIJ. A continuación, se muestran los datos disponibles más recientes de las distintas áreas del SISVEA (Secretaría de Salud & Dirección General de Epidemiología, 2009).

a) Mediciones realizadas en los Consejos Tutelares de Menores.

En 2009, SISVEA contó con la participación de 30 Consejos Tutelares de Menores que proporcionaron información de 5,284 menores infractores. De ellos, el 90.7% tiene entre 15 y 18 años y únicamente el 7.5% son mujeres. En cuanto al nivel de estudios, el nivel de secundaria registra el mayor porcentaje (51.3%).

En relación al consumo de drogas, el 24.3% cometió un delito bajo la influencia de alguna sustancia. El robo (72.1%) fue el delito más cometido por los menores. De los menores infractores entrevistados, el 68.1% refirieron consumir habitualmente drogas, donde la marihuana es la sustancia más reportada (35.0%), seguida del alcohol (29.8%) y el tabaco (27.3%).

b) Servicio Médico Forense (SEMEFO).

El SEMEFO proporciona información sobre la presencia de sustancias en los casos de aquellas personas que murieron de manera violenta o súbita. En el año 2009 participaron 20 entidades federativas en el reporte al SISVEA¹. Se contó con información de un total de 18,724 defunciones, de las cuales 4,562 (24.4%) ocurrieron bajo la influencia de algún tipo de sustancia, presentándose los mayores porcentajes en los estados de Chihuahua (32.4%), Jalisco (21.7%) y el Distrito Federal (10.5%).

Del total de defunciones relacionadas con algún tipo de sustancia, el 92.1% fueron de hombres, el grupo de edad en el que hubo mayor número de muertes asociadas a sustancias fue el de mayores de 40 años (30.4%). Las causas más comunes de defunción bajo la influencia de alguna droga fueron ocasionadas por arma de fuego (33.3%), accidentes de tránsito (17.2%) y asfixia (10.2%), asimismo los lugares donde las defunciones ocurrieron con mayor frecuencia fueron en la calle (50.4%) y el hogar (22.4%).

c) Servicio de Urgencias Hospitalarias

El SISVEA también cuenta con un reporte de los servicios de urgencias hospitalarias, de manera que en el 2009 participaron 167 hospitales.

¹ Los estados participantes fueron Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En este universo, de un total de 16,431 pacientes atendidos, únicamente el 3.4% llegaron bajo la influencia de alguna sustancia, pero 6,560, más de una tercera parte, reportaron el uso de alguna sustancia en los últimos 30 días.

d) Centros de Tratamiento no Gubernamentales.

La información de Centros de Tratamiento No Gubernamentales, proviene de las personas que acuden a consulta por primera vez. Esta información es un registro de eventos y no de casos, ya que una misma persona puede ir a más de un Centro y ser registrada en todos los que acuda.

Estas líneas se hicieron con la ayuda de la información que proporcionó directamente el SISVEA, de manera tal que los resultados se muestran en gráficas de tendencias para las 8 regiones en que fue subdividido el país para el desarrollo de la ENA 2011.

A continuación, se presentan los resultados generales y la información más detallada podrá consultarse en el anexo 1.

De acuerdo al último informe publicado por SISVEA, durante el año 2009, 1,118 centros de tratamiento proporcionaron información de 70,467 personas que acudieron a solicitar tratamiento. Los tres estados que reportaron más casos y Centros de Tratamiento, fueron Baja California, Chihuahua y Jalisco.

El alcohol fue la droga de inicio más reportada (49.1%), seguida de tabaco (18.4%) y la marihuana (17.8%). La droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por 29,417 personas; 10,450 personas mencionaron la cocaína, 8,235 a la marihuana y 6,950 a las metanfetaminas.

La mayoría de los entrevistados tenía 35 años de edad o más (39%) seguido del grupo de 15 a 19 años (16.8%). El porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años fue mayor entre los usuarios que mencionaron como droga de impacto los inhalables (40.5%), seguido por la marihuana (35.1%). Por otro lado, entre los que tuvieron como droga de impacto a la cocaína y las metanfetaminas, más del 40% eran adultos jóvenes (20 a 29 años). Asimismo, el mayor porcentaje de adultos de 35 años o más reportaron como droga de impacto al alcohol (55.3%).

En cuanto a quienes inician con otros opiáceos, casi una tercera parte fueron mujeres (31.6%), mientras que del porcentaje que inició con marihuana solo el 5.1% fueron mujeres.

Al estratificar por regiones, la región norte presenta una mayor demanda de atención y una mayor problemática con el consumo de heroína y metanfetaminas.

Al considerar solo a la población femenina que se ha inyectado drogas (6.6% de quienes han asistido a

tratamiento), el tabaco y la marihuana son sus principales drogas de inicio; en tanto que la heroína es la droga de impacto y la mayoría se ubica en la región norte del país.

6. Atención en los Centros Nueva Vida.

Los 335 Centros Nueva Vida que operan en nuestro país han empezado a generar información importante para la vigilancia epidemiológica en el tema de las adicciones. Aunque los Centros Nueva Vida realizan fundamentalmente actividades de prevención universal y selectiva, también ofrecen tratamientos breves para primeros consumidores o experimentadores, y en algunos casos personas con dependencia moderada. A partir del 2012 se ha empezado a contar con información de personas atendidas en tratamiento y no de eventos. Los resultados que se muestran a continuación reflejan la atención registrada en los primeros meses del año.

Se atendieron 5,437 casos; la droga de impacto referida fue alcohol en el 44.8% de los casos, seguida por marihuana en el 24%, solventes 10.4%, tabaco 9.4% y cocaína 5%. De las personas atendidas 68% fueron hombres y 32% mujeres. En cuanto al perfil de los hombres atendidos el 69% son solteros, el 48.4% menores de 18 años, 24.5% entre 18 y 34 y 24.9% entre 35 y 65. En cuanto a su escolaridad el 50.4% tienen secundaria, 22.6% bachillerato, 17% primaria y 5% estudios superiores.

Con respecto a las mujeres el 71.4% son solteras, 49% menores a 18 años, 27% de 35 a 65 años y 19.7% de 18 a 34. En cuanto a escolaridad 53.7% tienen secundaria, 21.7% bachillerato, 13.6% estudios superiores, 13.6% primaria y 6% estudios superiores.

La droga de impacto para el 40.7% de los hombres es el alcohol y 29.4% de marihuana, 10% solventes, 7% tabaco y 6% cocaína. Para mujeres la droga de impacto fue alcohol en 53%, 13.7% tabaco, 12.4% marihuana, 11% solventes y 3% cocaína.

Panorama Internacional

A nivel internacional, se cuenta con diversas fuentes de información sobre el consumo de drogas. Dentro de las más relevantes se encuentran los observatorios continentales, donde América cuenta con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (2008), y cada año se presenta el Reporte Anual de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD). También se cuenta con la información de los observatorios de diversos países disponible en internet (Ver referencias 4 a 10).

A continuación se presentan algunos de los resultados del Informe Mundial de la ONUDD 2011 y de la CICAD, con datos actualizados de algunos países latinoamericanos.

El informe anual de la ONUDD, cuenta con información acerca del consumo y tráfico de drogas a nivel mundial. Este reporte se encuentra dividido en regiones y es la región de América del Norte donde se sitúa México, junto con Canadá y Estados Unidos.

El reporte indica que esta región sigue siendo el mayor mercado mundial de drogas, a pesar de que ha disminuido en términos económicos, en comparación con una o dos décadas anteriores. En ella, se ha desarrollado un modelo de consumo diversificado en el que no surge un solo tipo de droga dominante. La marihuana, los opiáceos y la cocaína son igualmente representados y constituyen partes similares en la demanda total de atención por consumo de drogas.

En América del Norte, el uso de opiáceos sin prescripción médica se ha convertido en un problema cada vez más fuerte y el consumo de anfetaminas y éxtasis esta casi a la par. Cerca del 37% de los consumidores de cocaína en todo el mundo se encuentran en esta región, con una prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 64 años, que es la más alta y está muy por encima del promedio global (0.4%). En cuanto a las anfetaminas cerca de 1.1% de la población las utiliza y una proporción similar utiliza el éxtasis. Estos porcentajes se sitúan en ambos casos por encima del promedio mundial. Aunque se habla de América del Norte, el principal consumo se ubica en Estados Unidos (UNODC, 2011).

Por otro lado, al analizar los datos de consumo anual relativos a otros países de la Comunidad Europea², estos indican claramente que México se encuentra entre los países de menor consumo.

En el caso de la marihuana, República Checa tiene la mayor prevalencia (15.2%) y México (1%) sólo está por arriba de Moldova (0.9%) formando parte de los países con menores prevalencias.

El mayor consumo de cocaína lo tiene Escocia (3.9%); México (0.4%) sólo está por arriba de Lituania (0.2%).

En cuanto al consumo de anfetaminas, México mantiene el penúltimo lugar con un consumo del 0.2%, similar al de Portugal, mientras que República Checa tiene el mayor consumo con una prevalencia anual del 1.7%.

Finalmente, en el consumo de éxtasis, República Checa tiene también el mayor consumo (3.6%) y México estaría en el último lugar con una prevalencia menor al 0.1%.

² En el anexo 2 se presentan gráficas y contenidos derivados de los informes mencionados, donde se incluyen comparativos de México con países Europeos y de América

Con relación a los países de América, el contexto es similar, México se mantiene en un consumo promedio o por debajo del promedio de la mayoría de los países del continente.

Así, en cuanto a la marihuana, Estados Unidos tiene el mayor consumo anual (13.7%) y en México este es de 1%, únicamente mayor que Ecuador (0.7%) y República Dominicana (0.3%).

En cocaína, el mayor consumo lo tiene Argentina (2.6%) y en México el consumo es de 0.4%, situándolo en el onceavo lugar de los 15 países analizados.

En cuanto a las anfetaminas, México ocupa el último lugar (0.2%) donde el mayor consumo se presenta en El Salvador (3.3%) y en Estados Unidos (1.5%).

Finalmente, México ocupa el último lugar en cuanto al consumo de éxtasis (0.1%), donde la mayor prevalencia se da en los Estados Unidos (1.4%).

Los datos observados señalan que en el país hay un consumo bajo de drogas, en comparación con otros países de América y de Europa.

En el contexto nacional, de manera especial los resultados de los Centros de Tratamiento, muestran que el consumo, la dependencia y los problemas asociados afectan a una parte importante de la población mexicana, siendo el alcohol la droga que genera una mayor problemática en nuestro país. Adicionalmente, los datos muestran que hay variaciones regionales importantes que deben tomarse en cuenta en la planeación de acciones y de políticas públicas en la materia.

ENCUESTA NACIONAL
de adicciones 2011



Documento Metodológico

Introducción

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC) y de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), encomendó al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y al Instituto Nacional de Psiquiatría "*Ramón de la Fuente Muñiz*" (INPRFM) la realización de la "Encuesta Nacional de Adicciones 2011" (ENA 2011). Su objetivo general es estimar las prevalencias del uso y abuso de tabaco, alcohol y drogas, tanto médicas como no médicas, así como evaluar las tendencias de su consumo, en la población adolescente de entre 12 y 17 años de edad y en la población adulta de entre 18 y 65 años. Además, la encuesta busca conocer los factores asociados a la utilización de estas sustancias, así como las necesidades de atención y el uso de servicios relacionados con el abuso de las mismas.

Objetivos

Los objetivos específicos que se plantearon para la ENA 2011 son:

- Estimar la prevalencia del uso de drogas tanto médicas como no médicas, alcohol y tabaco a nivel nacional, para ocho regiones del país.
- Evaluar las tendencias en el consumo de drogas, alcohol y tabaco, mediante la comparación de los resultados de la ENA 2011 con la ENA 2008.
- Identificar los grupos de población con mayor riesgo en relación al problema de consumo de tabaco, alcohol y drogas (médicas y no médicas).

Metodología

La ENA 2011 es una encuesta de hogares con representatividad nacional y para ocho regiones del país, en la que se encuentran representadas poblaciones rurales -con un número de habitantes menor o igual a 2,500-, urbanas -aquéllas con un número de habitantes entre 2,500 y 99,999- y metropolitanas -con 100 mil habitantes o más-. En la ENA 2011, al igual que en la ENA 2008, las localidades en donde más de la mitad de la población de 5 años en adelante hablaba solo alguna lengua indígena fueron excluidas. La adopción de este criterio se fundamenta en que el tema de las adicciones es considerado como sensible por lo que no es conveniente el uso de intérpretes o informantes sustitutos para la obtención de la información.

Los estados que integran cada una de las ocho regiones son:

REGIÓN	ESTADOS
Norcentral	Coahuila, Chihuahua, Durango
Noroccidental	Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa
Nororiental	Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí
Occidental	Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Nayarit
Centro	Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato
Ciudad de México	Distrito Federal
Centro Sur	Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Sur	Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco

La selección de las unidades muestrales se realizó en múltiples etapas empezando por AGEBs o localidades, siguiendo por manzanas o segmentos, viviendas y finalmente, personas dentro de los hogares.

En cada hogar, siempre que la composición del mismo lo permitiera, se seleccionó a un adulto de 18 a 65 años y a un adolescente de 12 a 17 años de edad. La selección se llevó a cabo mediante un muestreo aleatorio simple en cada uno de los dos grupos de edad.

Los resultados obtenidos por la ENA 2011 permiten:

- Estimar la prevalencia del consumo de alcohol, tabaco y drogas (médicas y no médicas) en la población de 12 a 65 años.
- Identificar las regiones geográficas en las que la población tiene mayor riesgo de consumir drogas.
- Evaluar la relación entre los factores de riesgo ambientales, interpersonales, familiares y personales con la experimentación, uso habitual y uso problemático de drogas, alcohol y tabaco.
- Desarrollar y evaluar modelos de predicción de consumo de drogas, alcohol y tabaco, con objeto de incidir en la creación e implementación de programas de prevención.
- Retroalimentar a los sectores de salud y educativos, con objeto de desarrollar y fortalecer medidas preventivas sobre el uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.
- Diseñar nuevas líneas de investigación en el campo del abuso de sustancias.
- Conocer la relación que existe entre uso de drogas, comportamiento antisocial, violencia y salud mental.

Unidades de Análisis

Las unidades de análisis definidas para ENA 2011 son las siguientes:

- Hogar, conjunto de personas relacionadas por algún parentesco o no, que habitualmente duermen en una vivienda¹ bajo el mismo techo, beneficiándose de un ingreso común, aportado por uno o más de los miembros del hogar.
- Adolescentes, integrantes de los hogares en el grupo de edad de 12 a 17 años de edad.
- Adultos, integrantes de los hogares mayores de 17 años y menores de 65.

¹Por razones de tipo operativo no se incluyeron viviendas colectivas, como: instalaciones militares, cárceles, conventos, hoteles, asilos, etc.

Estratificación

Debido a que las Encuestas Nacionales de Adicciones realizadas en 1998 y 2002 señalan la existencia de importantes diferencias por tamaño de localidad para los indicadores de interés, la población objetivo de la ENA 2011 se estratificó como se describe a continuación:

Cuadro 1. Estratificación por urbanidad

Estrato	Descripción de acuerdo a los resultados del Censo 2010
I. Ciudad o área metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> • Capitales de los estados. • Localidades con más de 100 mil habitantes. • Localidades con 2500 o más habitantes de los municipios que formaban las áreas metropolitanas en el 2000.
II. Complemento urbano	<ul style="list-style-type: none"> • Localidades no incluidas en los estratos rural y metropolitano.
III. Rural	<ul style="list-style-type: none"> • Localidades con menos de 2,500 habitantes.

Tamaño de la muestra

Para cumplir con los objetivos de la ENA 2011 se consideró que el tamaño de la muestra seleccionado por región debería permitir obtener estimaciones con errores similares a los utilizados en el diseño de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Así, se propuso estimar proporciones cercanas al 13% con un error relativo máximo del 17% para estimaciones regionales. Por otra parte, se estableció una tasa de respuesta del 75% y un número promedio de 1.29 personas seleccionadas por hogar.

El tamaño de muestra regional se determinó con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot (1-p) \cdot deff}{r^2 \cdot p \cdot TR \cdot h}$$

En donde:

- n Tamaño de muestra en viviendas
- p Proporción a estimar
- $z_{\alpha/2}$ Cuantil de una distribución normal asociado al nivel de confianza deseado
- $1 - \alpha = 0.90$
- r Error relativo máximo de estimación en el 90% de las estimaciones
- $deff$ Efecto de diseño: Se interpreta como el número de unidades colectadas por la ENA 2011 que son equivalentes, para propósitos de estimación, a una unidad colectada mediante un muestreo aleatorio simple. El $deff$ asumido fue de 3.27 para las encuestas regionales.
- TR Tasa de respuesta esperada
- h Promedio de personas por vivienda

Como consecuencia de los supuestos, se determinó un tamaño de muestra de 1,994 viviendas por región. A nivel regional, se espera estimar proporciones del 2% con un error relativo del 47%; la proporción del 2% es relevante porque la ENA 2008 estimó una prevalencia de consumo de cocaína del 2.4% para el consumo alguna vez en la vida. Por otra parte, a nivel nacional, se espera poder estimar proporciones mayores o iguales al 2% con la misma precisión que la obtenida en las encuestas regionales. En general, el diseño muestral de la ENA 2011 es similar al establecido en la ENA 2008 lo que permitirá comparar los cambios en el consumo de sustancias entre ambas Encuestas. Finalmente, con el fin de constatar que la precisión de la

ENA 2011 regional es similar a la ENA 2008 por estado, a continuación se resumen los parámetros usados (Cuadro 2).

Cuadro 2. Parámetros usados para determinar el tamaño de muestra

Parámetro	ENA 2008	ENA 2011	
		Región	Ciudad
P	12.2%	13.7	13.7
<i>d_{eff}</i>	2.183	3.27	2.183
r	15%	17%	16%
TR	85%	75%	75%
h	1.4	1.29	1.29

Nota sobre la estimación de las prevalencias

Es muy importante tomar en cuenta el alcance de la ENA 2011 y cuál es su nivel de precisión. Esto implica que el estudio NO está diseñado para estimar prevalencias muy pequeñas con precisión, lo cual puede ocurrir en la estimación de eventos muy raros o cuando se incurre en una desagregación extrema de los datos (cruces simultáneos de diferentes variables).

Por ello, se conmina al lector para que cuando tenga prevalencias regionales menores a 2%, o que el intervalo de confianza de una prevalencia incluya al cero o al 100%, las tome con precaución, ya que en esas situaciones el nivel de precisión de los datos es muy bajo.

Esquema de Selección

El procedimiento de muestreo de la ENA 2011 es probabilístico, polietápico y estratificado. El universo de selección para las unidades primarias de muestreo (UPM) lo conforma el agregado de las AGEB's (Área Geo-estadística Básica) de las localidades listadas en el Censo 2005 y las localidades del Censo 2010 no listadas en el Censo 2005 (*localidades nuevas*).

En la primera etapa de muestreo, las AGEB's se estratificaron de acuerdo a dos variables: la entidad federativa y la condición de urbanidad. La estratificación por urbanidad dividió a las AGEB's en tres categorías de acuerdo al tipo de localidad a la que pertenecen. En consecuencia, las AGEB's del país se dividieron en 96 estratos. Por su parte, las localidades *nuevas* se agruparon en ocho estratos, uno por cada región.

Cuadro 3. Estratos de AGEB's

Estrato	Definición
Rural	Localidades con menos de 2500 habitantes.
Urbano	Localidades no incluidas en los estratos rural y metropolitano
Metropolitano	Capitales de los estados Localidades con más de 100 mil habitantes. Localidades con 2500 o más habitantes de los municipios que formaban las áreas metropolitanas en el año 2000.

Una vez definidos los estratos, se implementó el siguiente proceso de selección:

- a) El tamaño de muestra por región (2,000 viviendas) se distribuye de modo proporcional en los estados que conforman a la región y el estrato de localidades *nuevas* de la región.
- b) El tamaño de muestra por estado se distribuyó de manera proporcional en los estratos urbano, rural y metropolitano del estado y en el estrato de localidades *nuevas* se asignó un tamaño de muestra de 1 ó 2 localidades dependiendo del porcentaje de la población que vive en las localidades *nuevas* de la región.

Posterior a la asignación del tamaño de muestra por estrato, las viviendas se seleccionaron como se describe a continuación.

Estratos urbano y metropolitano

- En la primera etapa se seleccionaron como unidades primarias m_j AGEB's con probabilidad proporcional a su tamaño².
- En la segunda etapa para cada AGEB seleccionada se eligieron 6 manzanas con probabilidad proporcional a su tamaño.
- Posteriormente, en cada manzana seleccionada se realizó una selección de 6 viviendas utilizando un muestreo sistemático con arranque aleatorio. La selección de viviendas se realizó en campo a partir de un croquis y listado de viviendas elaborados por el equipo de campo.

² El número de viviendas es el tamaño usado para todas las unidades de muestreo

Estrato rural

- En la primera etapa, se seleccionaron como unidades primarias m_j AGEB's con probabilidad proporcional a su tamaño.
- Posteriormente, se seleccionaron 3 localidades con probabilidad proporcional a su tamaño.
- En la tercera etapa, dado que no existen mapas de manzanas disponibles para las localidades rurales, se formaron pseudo-manzanas en campo, las cuales estuvieron integradas por aproximadamente 50 viviendas. Luego, se seleccionó una pseudo-manzana con un muestreo sistemático por cada localidad y en ella se generaron conglomerados de aproximadamente 12 viviendas, para finalmente, seleccionar un conglomerado de 12 viviendas con muestreo aleatorio simple.

Estrato de localidades de nueva creación.

- En la primera etapa se seleccionaron como unidades primarias, m_j localidades con probabilidad proporcional a su tamaño.
- En la segunda etapa, dado que no existen mapas de manzanas disponibles para estas localidades, se construyeron en oficina pseudo-manzanas que estuvieron constituidas por 20 viviendas de modo aproximado. Mediante un muestreo sistemático, se seleccionaron tres pseudo-manzanas por localidad y, por último, se seleccionaron en campo 12 viviendas en cada pseudo-manzana mediante un muestreo sistemático.

Finalmente, una vez seleccionada una vivienda a través de cualquiera de los tres procedimientos descritos con anterioridad, y siempre que la composición del hogar lo permitió, se seleccionó mediante el uso de muestreo aleatorio simple a un adolescente con edad entre 12 a 17 años y a un adulto con edad entre 18 y 65 años. La selección del adolescente y del adulto se realizó mediante una rutina informática que se ejecutaba automáticamente una vez concluido el cuestionario de hogar.

Muestra réplica

Al iniciar la encuesta se generó una muestra réplica de la ENA 2011; esto es, el programa de cómputo usado para seleccionar la muestra se ejecutó dos veces, la primera vez para seleccionar una muestra llamada muestra-ENA 2011 y la segunda vez para seleccionar una muestra llamada muestra-ENA 2011-réplica. El propósito de generar la muestra réplica fue el de tener un conjunto de UPM seleccionadas probabilísticamente que pudieran ser añadidas a la muestra original cuando por razones de inseguridad para el entrevistador o por la negativa de grupos poblacionales a permitir realizar los listados de viviendas, no fuera posible acceder a alguna UPM de la muestra ENA 2011.

Logística en campo

La ENA 2011 estableció el siguiente procedimiento para su ejecución en campo:

- Durante la visita a campo el equipo de trabajo procedió en un primer momento a elaborar los croquis y listados de viviendas en las manzanas seleccionadas y efectuó la selección probabilística de viviendas. Posteriormente se aplicó el cuestionario de hogar y se llevó a cabo la selección aleatoria del adulto y/o adolescente. Finalmente, se procedió a la aplicación del cuestionario individual a los residentes del hogar seleccionados. Adicionalmente, los supervisores verificaron los motivos de la no respuesta.

Cuestionarios de recolección de información

Los cuestionarios se diseñaron tomando como base el cuestionario de la ENA 2008 y se programaron para su captura simultánea en una plataforma electrónica que fue instalada en computadoras portátiles para su aplicación a través de entrevistas cara a cara. El cuestionario de hogar incluyó información referente a las características de la vivienda y sus residentes habituales, e integró el algoritmo de selección de individuos en el hogar a partir del listado de integrantes. El cuestionario individual recabó información sobre los individuos seleccionados en cada uno de los grupos de edad de interés.

Cuestionario de hogar

El informante adecuado para el cuestionario del hogar fue el jefe de hogar, ama de casa u otro miembro de la familia de 18 años o más, sin impedimentos para poder responder y que conociera las características de la vivienda y sus residentes habituales.

Los temas del cuestionario de hogar se pueden clasificar en tres rubros principales:

- Datos de identificación y de control. Se registró información referente a la ubicación de cada vivienda seleccionada: entidad, municipio, localidad, AGEB, manzana, número de vivienda, domicilio y el registro de hasta cuatro visitas del entrevistador por informante.
- Características de la vivienda: total de cuartos, disponibilidad de cocina exclusiva y número de focos.
- Características de los miembros del hogar. Se identificó el número de miembros del hogar y para cada uno se registró la siguiente información: nombre (listado de personas), edad, fecha de nacimiento, sexo, parentesco y verificación de residencia.

Cuestionario individual

El informante adecuado fue el individuo seleccionado aleatoriamente en los grupos de edad antes mencionados. Se administró un cuestionario individual por informante seleccionado, esto es, una persona entre 12 y 17 años y/o entre 18 y 65 años de edad, cumplidos al momento de la visita. El cuestionario individual recabó información sobre los siguientes temas:

- Datos sociodemográficos del informante: sexo, edad, estado civil, escolaridad, datos sobre sus hijos, ocupación e ingreso familiar.
- Consumo de tabaco
- Tolerancia social
- Percepción de riesgo
- Consumo de drogas (médicas e ilegales)
- Dependencia al consumo de drogas
- Consumo de alcohol
- Dependencia al consumo de alcohol
- Consumo de alcohol y drogas en periodos establecidos
- Tratamiento por consumo de alcohol o drogas
- Escala de salud mental K6
- Embarazo
- Violencia por parte de la pareja
- Conducta antisocial, inseguridad y delincuencia
- Percepción social de la comunidad en relación al uso de drogas
- Conocimientos sobre el VIH/SIDA
- Migración hacia los Estados Unidos

Programación de los instrumentos

Para la aplicación de la ENA 2011, se desarrollaron aplicaciones informáticas de los instrumentos: hogar e individual. Cada una de las aplicaciones se elaboró para incluir los pases y validaciones especificados por los responsables técnicos de los mismos. Se trata de instrumentos complejos, que requieren la aplicación de diversos filtros de acuerdo a la información que se va recabando.

Las aplicaciones se programaron para asegurar que la información se guardara de forma continua (para evitar que ante fallas de energía se perdiera la información recolectada hasta ese momento), y amigables para el usuario (el entrevistador). Los sistemas incorporaron la selección de individuos en el instrumento de

hogar, y utilidades para registro de supervisión, generación de comprobantes de la realización de las entrevistas, y empaquetado de la información para su envío al servidor. Los archivos de datos se protegieron con contraseñas seguras para evitar su alteración o lectura durante el tránsito en la red.

Sistema de Seguimiento

Programado de forma congruente con las aplicaciones de los instrumentos, el sistema de seguimiento se generó como una herramienta tanto para monitorear el avance operativo, como para monitorear la calidad de la información recolectada. El sistema de seguimiento se alimenta directamente de los datos recolectados en las aplicaciones en campo, permitiendo de forma simultánea generar reportes sobre el avance en la cobertura, y el comportamiento de indicadores seleccionados de los instrumentos.

Levantamiento de la ENA 2011

La capacitación del personal operativo se llevó a cabo en la Ciudad de México del 1 al 10 de junio de 2011 con un día de prueba de campo. Se contó con la participación de un total de 173 personas que incluye a coordinadores, supervisores, entrevistadores y el personal de apoyo en informática.

La capacitación referente a la logística de campo (incluyendo elaboración de croquis y selección de viviendas), tabaquismo y los aspectos éticos estuvieron a cargo del personal del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en tanto que los temas sobre el consumo de alcohol y drogas fueron impartidos por investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" (INPRFM). Adicionalmente, derivado del clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país y con la finalidad de proteger al personal operativo, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal quien participó con la impartición de un taller sobre la identificación de situaciones de riesgo y prevención del delito de alto impacto.

El operativo de la ENA 2011 se desarrolló entre el 13 de junio al 29 de agosto de forma simultánea en las 32 entidades federativas. Los equipos de campo se integraron por un coordinador estatal, un supervisor, un grupo de encuestadores y una persona de apoyo en informática. Para cada vivienda seleccionada se programaron hasta 4 visitas en horarios y días diferentes incluyendo fines de semana, para incrementar la probabilidad de encontrar a los ocupantes. La encuesta fue aplicada con captura simultánea de datos, es decir, utilizando una aplicación informática y computadoras portátiles en campo para las entrevistas.

El diseño consideró la entrevista de un adulto de entre 18 y 65 años y de un adolescente entre los 12 y 17 años, por hogar. La aplicación informática de la encuesta fue programada para realizar una selección aleatoria del o los individuo/s a entrevistar a partir del listado de integrantes obtenido en el cuestionario básico de hogar.

Supervisión del operativo

La estructura del equipo de campo se integró con un coordinador nacional, un sub-coordinador nacional, 12 coordinadores de campo, 23 supervisores, 25 técnicos en informática y 111 entrevistadores. Los coordinadores estatales y los supervisores fueron los encargados de supervisar directamente las entrevistas y de verificar la correcta ubicación de las viviendas.

El trabajo de supervisión consideró dos fases:

Planeación y Organización. En esta etapa el supervisor de campo agrupó zonas o áreas de trabajo colindantes entre sí para optimizar el tiempo de levantamiento y asignó las cargas de trabajo a cada entrevistador que tuvo a su cargo.

Supervisión en Campo. Durante el levantamiento de la información, el supervisor retroalimentó a los entrevistadores en las dudas o problemas surgidos durante el desarrollo de las actividades, así como respecto a los lineamientos de la capacitación. De igual forma, verificó que los individuos y hogares entrevistados fueran los seleccionados, observó directamente 1 de cada 5 entrevistas en su área de responsabilidad y confirmó el 100% de los códigos de no respuesta.

Adicionalmente, dos equipos de supervisión que no forman parte de la estructura operativa de la encuesta del INSP, y un equipo de supervisión organizado por personal del INPRFM monitorearon regularmente las actividades en los estados y a partir de los reportes sobre la aplicación de los instrumentos o actividades del operativo se acordaron estrategias de atención. Los coordinadores estatales informaron sobre el desempeño de cada entrevistador, las áreas de riesgo identificadas y verificaron las causas de no entrevista.

Consideraciones Éticas

El protocolo de la encuesta fue evaluado y aprobado por las Comisiones de Investigación y Ética tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. A todos los participantes les fue leída una carta de consentimiento informado y se recabó información sólo de quienes aceptaron participar. En el caso de los menores de edad, se solicitó a los padres o tutores su autorización para que sus hijos (as) fueran invitados (as) a participar en la encuesta, cuando accedieron firmaron una carta de consentimiento y, posteriormente, se buscó el asentimiento del menor. Durante la lectura de las cartas de consentimiento y asentimiento se hizo énfasis en los objetivos de la encuesta, el tipo de información que se buscaba recolectar, el carácter voluntario de la participación, así como en el carácter confidencial de la información.

Tasa de Respuesta

La no respuesta ocurre cuando resulta imposible conocer el atributo de interés *Y* en un hogar o en una persona seleccionada en la muestra. En la ENA 2011, la tasa de respuesta global en los hogares seleccionados es el producto de la tasa de respuesta colectiva y la tasa de respuesta en los hogares contactados. La “*respuesta colectiva*” se deriva del no acceso a las áreas seleccionadas por motivos de inseguridad o por ser áreas de acceso restringido por los habitantes y, se calculó como el porcentaje de viviendas asignadas en oficina para las que fue posible construir un croquis y visitarlas. La tasa de respuesta en los hogares contactados es el cociente entre el número de entrevistas completas y el total de cuestionarios obtenibles (después de eliminar a las viviendas no entrevistables, es decir, las viviendas deshabitadas, de uso temporal y las no localizadas).

El cuadro 4 muestra que el 95.8% del total de viviendas seleccionadas en la muestra original pudieron ser visitadas, lo cual resulta en una tasa de *no respuesta colectiva* del 4.2%.

La tasa de respuesta global en los hogares seleccionados indica que en el país el 83.3% aceptó participar. La región Occidental presentó la tasa de respuesta del cuestionario de hogar más alta (95.6%), mientras que la Ciudad de México la menor (77.3%). (Cuadro 5).

Se aclara que la diferencia en el total de viviendas referido en la tabla 3 y 4 es explicado, principalmente, porque cuando se identificó una vivienda deshabitada, se añadió a la muestra la vivienda contigua a la derecha.

Cuadro 4. Tasa de respuesta colectiva en la muestra original. ENA 2011*

Región	Viviendas en la muestra	% de viviendas no visitadas por motivos de inseguridad	% de viviendas con acceso restringido	% de viviendas visitadas
Noroccidental	2,016	1.8	1.8	96.4
Norcentral	3,528	4.3	4.1	91.7
Nororiental	2,016	3.6	2.1	94.3
Occidental	2,016	0.0	0.0	100.0
Ciudad de México	2,016	1.8	1.2	97.0
Centro	2,016	0.0	8.9	91.1
Centro Sur	2,025	0.0	0.0	100.0
Sur	2,058	0.0	0.7	99.3
Total	17,691	1.7	2.5	95.8

*Datos muestrales

Cuadro 5. Tasa de respuesta global en los hogares seleccionados. ENA 2011*

Región	Total de viviendas *	Entrevistas completas	Viviendas no habitadas	Tasa de respuesta en los hogares contactados**	% viviendas visitadas (respuesta colectiva)	Tasa de respuesta global
Noroccidental	1,998	1,745	46	89.4	96.4	86.2
Norcentral	3,570	2,741	245	82.4	91.7	75.6
Nororiental	2,018	1,624	85	84.0	94.3	79.2
Centro Norte	2,087	1,963	33	95.6	100	95.6
Ciudad de México	2,178	1,530	198	77.3	97	75.0
Centro	1,916	1,646	80	89.7	91.1	81.7
Centro Sur	2,094	1,832	54	89.8	100	89.8
Sur	2,148	1,899	46	90.3	99.3	89.7
Total	18,009	14,980	787	87.0	95.8	83.3

*Datos muestrales

**En el cálculo se excluyen las viviendas deshabitadas del total de viviendas

En el país la tasa de respuesta en los adolescentes entre 12 y 17 años fue del 86.5%, en los adultos entre 18 y 65 años del 88.5% y en la población total de seleccionados del 88.0%. (Cuadro 6)

Cuadro 6. Tasa de respuesta en las personas seleccionadas, según grupo de edad

Región	Grupos de edad				
	12-17		18-65		12-65
	%	N	%	N	%
Noroccidental	90.7	508	91.9	1,620	91.6
Norcentral	85.9	870	89.0	2,507	88.2
Nororiental	77.6	469	77.7	1,423	77.6
Occidental	90.6	488	95.0	1,731	94.0
Distrito Federal	80.1	306	85.9	1,322	84.8
Centro	88.0	490	86.5	1,503	86.9
Centro Sur	88.4	588	88.1	1,648	88.2
Sur	87.7	610	90.9	1,747	90.1
Total	86.5	4,329	88.5	13,501	88.0

Por otra parte, la tasa global de respuesta considera la información obtenida en los hogares e individuos seleccionados (cuadro 7). A nivel nacional la participación fue del 73.3%. Las regiones Noroccidental, Occidental, Centro Sur y Sur registraron una tasa global de respuesta superior al 75%.

Cuadro 7. Tasa de respuesta global*

Región	Hogar	Individuos 12-65 años	Total
Noroccidental	86.2	91.6	79.0
Norcentral	75.6	88.2	66.7
Nororiental	79.2	77.6	61.5
Occidental	95.6	94.0	89.9
Distrito Federal	75.0	84.8	63.6
Centro	81.7	86.9	71.0
Centro Sur	89.8	88.2	79.2
Sur	89.7	90.1	80.8
Total	83.3	88.0	73.3

*Datos muestrales

ENCUESTA NACIONAL
de adicciones 2011



Resultados principales:
Drogas

Contenido

Resultados Principales: Drogas	25
1. Población general de 12 a 65 años	26
2. Población adolescente 12 a 17 años	35
3. Población adulta de 18 a 65 años	42
4. Uso de servicios de la población usuaria de drogas de 12 a 65 años	53

Resultados principales: drogas

El documento actual presenta resultados por grupos de edad y sexo para las diversas regiones como se ha dividido el país en las anteriores Encuestas Nacionales de Adicciones (ENAs 1988, 1993, 1998, 2002, 2008, 2011), con el fin de poder presentar las tendencias en el consumo de drogas.

Estas encuestas incluyen a la población que vive en hogares con edad entre 12 y los 65 años. Es importante considerar que las ENAs de 1988, 1993 y 1998 fueron encuestas solo con población urbana; en tanto, las encuestas del 2002, 2008 y 2011 incluyen también a la población rural. Por ello, cuando se toman las comparaciones entre todas las encuestas se analiza solo a la población urbana.

En cuanto a la regionalización del país empleada en las encuestas, la ENA del 2002 permite aproximarse a resultados nacionales y de tres regiones del país (Norte, Centro y Sur), la encuesta del 2008, permite tener representación estatal, por lo cual es posible adicionar estados para tener representaciones regionales como la del 2002, o como la regionalización de la ENA 2011, en la que se estratificó para 8 regiones del país, tomando el modelo de la encuesta de 1993.

Al considerar estos aspectos, en este reporte, se presentan tendencias a nivel nacional, para 3 y para 8 regiones, dependiendo de las encuestas que se consideren en el cuadro de interés. La interpretación de la significancia en los cambios en el consumo se hace para las encuestas de 2008 a 2011. Los cuadros incluyen los intervalos de confianza, se recomienda precaución en la interpretación cuando éstos incluyen el valor de cero, en este sentido, le pedimos al lector que en la sección de metodología lea la nota de precisión de las estimaciones derivadas de este estudio.


1. Población general de 12 a 65 años¹

a) Tendencias nacionales del consumo de drogas en el último año.

En el cuadro 1 se presentan los resultados nacionales para la población total de 12 a 65 años. Respecto al consumo de cualquier droga en el último año, la prevalencia pasó de 1.6% a 1.8%, incremento que no es estadísticamente significativo. Asimismo, el consumo de drogas ilegales es de 1.5% muy similar al encontrado en 2008.

Con relación a las drogas específicas (Cuadro 1, Gráfica 1), la marihuana se mantiene como la de mayor consumo con una prevalencia del 1.2%, y con relación al 2008, no hubo un incremento estadísticamente significativo en la población general, pero sí en los hombres en quienes el consumo pasó de 1.7% a 2.2%. La siguiente droga de mayor prevalencia es la cocaína con un 0.5%, similar al 2008. El consumo en el último año de las demás drogas sigue siendo mínimo, abajo del 0.2%.

Por otra parte, la prevalencia de dependencia al consumo de drogas en esta población durante el último año es del 0.7%, muy similar a la que se tenía en el 2008. En términos del crecimiento poblacional, se han agregado 100,000 personas como dependientes en este período (pasa de 450,000 en el 2008 a 550,000 en el 2011). Y son los hombres los más afectados en la dependencia al consumo de drogas (1.3%), en comparación con las mujeres (0.2%).



Cuadro 1: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año,
Población Total de 12 a 65 años¹.

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002 %	2008 %	2011 %	2011 IC 95%
Total				
Mariguana	0.6	1.0	1.2	0.957-1.461
Cocaína**	0.3	0.4	0.5	0.351-0.643
Crack	***	0.1	0.1	0.033-0.193
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.010-0.146
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.049-0.194
Estimulantes tipo anfetamínico	***	0.1	0.2	0.068-0.233
Cualquier droga ilegal	0.8	1.4	1.5	1.229-1.782
Cualquier droga	1.3	1.6	1.8	1.529-2.120
Hombres				
Mariguana	1.2	1.7	2.2 ²	1.717-2.657
Cocaína**	0.7	0.8	0.9	0.636-1.211
Crack	***	0.2	0.2	0.055-0.379
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.005-0.275
Inhalables	0.2	0.2	0.2	0.066-0.336
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.2	0.2	0.103-0.346
Cualquier droga ilegal	1.7	2.3	2.6	2.126-3.147
Cualquier droga	2.2	2.5	3.0	2.435-3.516
Mujeres				
Mariguana	0.1	0.4	0.3	0.084-0.502
Cocaína**	***	0.1	0.1	0.027-0.169
Crack	--	***	***	---
Alucinógenos	***	***	***	---
Inhalables	***	***	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	0.1	0.1	---
Cualquier droga ilegal	0.1	0.5	0.4	0.200-0.692
Cualquier droga	0.5	0.8	0.7	0.470-1.023

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

¹ Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar el consumo de la sustancia

² Las cifras en rojo indican que hubo un incremento estadísticamente significativo y las que están en verde que hubo un decremento estadísticamente significativo.

Al precisar la información de prevalencias por sexo, los resultados son muy similares, se observa una tendencia al incremento en los hombres, que pasa de 2.5% a 3.0%, pero que no alcanza a ser significativa. El consumo en las mujeres se mantiene en 0.7%. Las drogas de preferencia siguen siendo la mariguana (2.2% hombres con un incremento significativo, y 0.3% mujeres) y la cocaína en los hombres (0.9%).

Los datos para la población urbana (Cuadro 2, Gráfica 2), que representa el 77.8% de la población del país y que permite comparar las tendencias desde 1988, muestran una prevalencia del consumo de cualquier droga del 2% en 2011, con un crecimiento no significativo entre las encuestas del 2008 y del 2011.


Cuadro 2: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Urbana de 12 a 65 años

	Encuestas Nacionales de Adicciones					IC 95%
	1988	1998	2002	2008	2011	
Total	%	%	%	%	%	IC 95%
Mariguana	1.2	1.0	0.6	1.2	1.4	1.066-1.680
Cocaína**	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.361-0.704
Alucinógenos	0.1	***	***	0.1	0.1	0.012-0.186
Inhalables	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.049-0.228
Cualquier Droga Ilegal	1.4	1.2	0.9	1.6	1.7	1.341-2.005
Cualquier Droga	2.1	1.8	1.4	1.9	2.0	1.688-2.399
Hombres						
Mariguana	2.4	2.2	1.3	2.0	2.5	1.930-3.071
Cocaína**	0.4	0.9	0.8	0.8	1.0	0.639-1.314
Alucinógenos	0.2	0.1	***	0.1	0.2	0.006-0.355
Inhalables	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.057-0.392
Cualquier Droga Ilegal	2.7	2.6	1.9	2.6	2.9	2.307-3.525
Cualquier Droga	3.3	3.2	2.4	2.8	3.3	2.673-3.971
Mujeres						
Mariguana	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3	0.075-0.597
Cocaína**	--	0.1	0.1	0.2	0.1	0.034-0.214
Alucinógenos	--	***	***	***	***	---
Inhalables	0.1	0.1	--	0.1	0.1	---
Cualquier Droga Ilegal	0.2	0.2	0.1	0.7	0.5	0.222-0.838
Cualquier Droga	0.9	0.7	0.6	1.0	0.9	0.523-1.212

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.


** Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1



En esta población, las prevalencias más elevadas siguen siendo para el consumo de la marihuana (1.4%) y de la cocaína (0.5%). Por sexo, tampoco hubo incrementos estadísticamente significativos; el consumo en los hombres pasó de 2.8% a 3.3% y el de las mujeres se mantuvo en 0.9%.

En cuanto a las variaciones en edad de inicio del consumo de drogas, el promedio es de 18.8 años (Gráfica 3), en promedio, los hombres se inician casi dos años antes que las mujeres, lo cual se ha mantenido desde el 2008.




b) Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año³.

Al analizar los datos de las regiones globales del país Norte, Centro y Sur, que incluyen población urbana y rural (Cuadro 3 y Gráfica 4), tampoco se observan crecimientos estadísticamente significativos en ellas.

Las tendencias globales a nivel regional indican que entre las encuestas de 2002, 2008 y 2011, el consumo de drogas no ha tenido un crecimiento estadísticamente significativo.

Al analizar las variaciones regionales en la encuesta del 2011, se observa que la región Norte tiene las prevalencias más altas de consumo de cualquier droga (2.8%) y de cualquier droga ilegal (2.3%), en comparación con la región Centro (1.7% y 1.3% respectivamente) y la región Sur (1.2% y 1.1%, respectivamente).

Por tipo de droga, la marihuana es la droga que más se consume en todas las regiones y en segundo lugar está la cocaína. Es importante mencionar que en la región Centro, junto con la cocaína, los inhalables son la segunda droga de preferencia. Un dato que llama la atención es que en la región Sur (0.6%) el consumo de cocaína está ligeramente arriba de la región Centro (0.2%).



Por otra parte, la tendencia de 2002 a 2011 muestra que la dependencia únicamente incrementó de manera significativa en la región Norte, que pasó de 0.9% a 1.1%. Asimismo, al interior de las regiones en la encuesta del 2011, se observa que esta región es la que tiene el mayor índice de dependencia en comparación con la región Centro y Sur (Cuadro 4, Gráfica 5). Por sexo, los hombres quienes presentan los porcentajes más altos de dependencia en todas las regiones y especialmente en la región Norte (1.9%),

³ Si bien se presenta la interpretación de las prevalencias, se conmina al lector a considerar que la precisión es mínima para valores menores al 2% a nivel regional.

mientras que en las mujeres la prevalencia es muy similar y se mantiene estable con relación a las encuestas anteriores.

Cuadro 3: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 12-65 años.

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002	2008	2011	
Nacional	%	%	%	IC 95%
Mariguana	0.6	1.0	1.2	0.957-1.461
Cocaína**	0.3	0.4	0.5	0.351-0.643
Crack	***	0.1	0.1	0.033-0.193
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.010-0.146
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.049-0.194
Estimulantes tipo anfetamínico	***	0.1	0.2	0.068-0.233
Drogas ilegales	0.8	1.4	1.5	1.229-1.782
Cualquier droga	1.3	1.6	1.8	1.529-2.120
Región Norte				
Mariguana	1.2	1.6	1.8	1.344-2.247
Cocaína**	0.9	0.7	1.0	0.613-1.352
Crack	0.1	0.2	0.1	0.007-0.247
Alucinógenos	***	0.1	0.1	---
Inhalables	***	0.2	0.1	0.002-0.173
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.3	0.4	0.182-0.645
Drogas ilegales	1.8	2.2	2.3	1.788-2.863
Cualquier droga	2.2	2.4	2.8	2.183-3.320
Región Centro				
Mariguana	0.4	0.9	1.2	0.771-1.565
Cocaína**	0.1	0.3	0.2	0.094-0.347
Crack	***	0.1	0.1	0.004-0.144
Alucinógenos	***	0.1	0.1	0.004-0.126
Inhalables	0.1	0.1	0.2	0.030-0.284
Estimulantes tipo anfetamínico	***	***	0.1	---
Drogas ilegales	0.6	1.2	1.3	0.925-1.751
Cualquier droga	1.2	1.4	1.7	1.244-2.144
Región Sur				
Mariguana	0.4	0.6	0.7	0.313-1.157
Cocaína**	0.3	0.4	0.6	0.210-0.909
Crack	--	***	0.2	---
Alucinógenos	--	***	0.1	---
Inhalables	--	0.1	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	0.1	--	---
Drogas ilegales	0.5	1.0	1.1	0.560-1.541
Cualquier droga	0.7	1.2	1.2	0.701-1.699

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.


**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Cuadro 4: Tendencias regionales de la Dependencia a Drogas en Población Total de 12-65 años

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002	2008	2011	IC 95%
Total	%	%	%	
Región Norte	0.9	0.7	1.1	0.721-1.411
Región Centro	0.4	0.5	0.6	0.294-0.929
Región Sur	0.1	0.5	0.5	0.135-0.871
Nacional	0.4	0.6	0.7	0.492-0.897
Hombres				
Región Norte	1.6	1.4	1.9	1.252-2.557
Región Centro	0.8	1.0	1.1	0.437-1.698
Región Sur	0.1	0.8	1.0	0.232-1.743
Nacional	0.8	1.1	1.3	0.857-1.658
Mujeres				
Región Norte	0.3	0.2	0.2	---
Región Centro	0.1	0.2	0.2	0.005-0.377
Región Sur	0.1	0.2	0.1	---
Nacional	0.1	0.2	0.2	0.052-0.283

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.



Al considerar ahora las 8 regiones en las que se dividió el país en la ENA 2011 (Cuadro 5), se encuentra que para la población total, hay incremento en el consumo de cualquier droga en la región Occidental, en donde pasa de 1.1% a 2.0%. En cuanto a las drogas ilegales, también se encuentra un incremento estadísticamente significativo en esta región, al pasar de 0.9% a 1.5%.

Cuadro 5: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 12 a 65 años.

	ENA 2008		ENA 2011			
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Total						
Norcentral	2.5	2.3	2.0	1.321-2.773	1.6	0.926-2.320
Noroccidental	2.8	2.5	2.9	2.055-3.773	2.8	1.945-3.660
Nororiental	2.0	1.8	3.1	1.966-4.275	2.4	1.348-3.474
Occidental	1.1	0.9	2.0	1.365-2.627	1.5	0.921-2.014
Centro	1.3	1.2	1.5	0.837-2.131	1.2	0.591-1.784
Ciudad de México	2.2	1.8	2.1	1.186-2.976	1.7	0.874-2.575
Centro Sur	1.3	1.0	1.5	0.717-2.200	1.3	0.604-2.069
Sur	1.1	0.8	0.8	0.311-1.194	0.6	0.145-0.963
Nacional	1.6	1.4	1.8	1.529-2.120	1.5	1.229-1.782
Hombres						
Norcentral	3.9	3.7	3.2	1.765-4.610	3.0	1.588-4.340
Noroccidental	4.2	4.1	5.3	3.557-7.034	5.3	3.557-7.034
Nororiental	3.7	3.5	5.3	3.132-7.520	4.5	2.424-6.630
Occidental	1.6	1.5	3.2	2.018-4.316	2.7	1.619-3.811
Centro	1.9	1.9	2.1	1.000-3.223	1.7	0.684-2.670
Ciudad de México	2.9	2.6	3.3	1.694-4.923	2.6	1.141-4.115
Centro Sur	2.2	1.9	2.7	1.270-4.228	2.7	1.270-4.228
Sur	1.5	1.3	1.0	0.224-1.767	0.9	0.102-1.603
Nacional	2.5	2.3	3.0	2.435-3.516	2.6	2.126-3.147
Mujeres						
Norcentral	1.2	1.0	1.0	0.403-1.501	0.3	---
Noroccidental	1.3	1.0	0.5	0.031-0.984	0.3	---
Nororiental	0.4	0.3	1.0	0.119-1.835	0.4	---
Occidental	0.6	0.3	0.9	0.238-1.541	0.3	---
Centro	0.8	0.5	0.9	0.170-1.650	0.7	0.031-1.448
Ciudad de México	1.5	1.1	1.0	0.030-1.902	0.9	---
Centro Sur	0.6	0.2	0.3	---	0.1	---
Sur	0.7	0.3	0.5	0.064-0.976	0.3	---
Nacional	0.8	0.5	0.7	0.470-1.023	0.4	0.200-0.692

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

Al analizar los datos según sexo, en los hombres de la región Occidental, se encuentran incrementos estadísticamente significativos para cualquier droga (de 1.6% a 3.2%) y para cualquier droga ilegal (de 1.5% a 2.7%). En las mujeres, se registran decrementos en el consumo de cualquier droga en la región Noroccidental (1.3% a 0.5%).

Por tipo de droga y en la población total (Cuadro 6), la marihuana se incrementa en forma significativa en la región Occidental, donde pasa de 0.7% a 1.3%; en tanto decrementa en la región Norcentral (de 1.7% a 1.0%).

Cuadro 6: Tendencias regionales del Consumo de Marihuana y Cocaína en el Último Año en Población Total de 12 a 65 años.

	ENA 2008		ENA 2011			
	Marihuana %	Cocaína %	Marihuana %	Marihuana IC 95%	Cocaína %	Cocaína IC 95%
Total						
Norcentral	1.7	1.0	1.0	0.495-1.532	0.8	0.207-1.330
Noroccidental	1.9	0.7	2.3	1.548-3.005	1.0	0.363-1.686
Nororiental	1.4	0.6	1.9	1.031-2.839	1.1	0.452-1.751
Occidental	0.7	0.2	1.3	0.784-1.812	0.5	0.154-0.810
Centro	0.8	0.4	1.0	0.450-1.594	0.2	---
Ciudad de México	1.7	0.3	1.5	0.700-2.380	0.1	---
Centro Sur	0.7	0.5	0.9	0.228-1.481	0.8	0.262-1.329
Sur	0.6	0.3	0.5	0.138-0.918	0.2	---
Nacional	1.0	0.4	1.2	0.957-1.461	0.5	0.351-0.643
Hombres						
Norcentral	2.8	1.5	1.7	0.753-2.744	1.3	0.257-2.429
Noroccidental	3.0	1.2	4.3	2.817-5.775	2.0	0.722-3.356
Nororiental	2.6	1.1	3.8	1.999-5.619	2.2	0.895-3.574
Occidental	1.2	0.4	2.5	1.471-3.576	0.7	0.144-1.227
Centro	1.3	0.6	1.7	0.659-2.643	0.2	---
Ciudad de México	2.5	0.6	2.4	0.911-3.841	0.2	---
Centro Sur	1.2	0.9	1.8	0.488-3.105	1.6	0.543-2.681
Sur	1.0	0.5	0.8	0.053-1.545	0.2	---
Nacional	1.7	0.8	2.2	1.717-2.657	0.9	0.636-1.211
Mujeres						
Norcentral	0.6	0.5	0.3	---	0.2	---
Noroccidental	0.7	0.2	0.2	---	--	---
Nororiental	0.2	0.1	0.1	---	--	---
Occidental	0.2	--	0.1	---	0.3	---
Centro	0.3	0.2	0.4	---	0.1	---
Ciudad de México	1.0	--	0.8	---	0.1	---
Centro Sur	0.1	0.1	--	---	0.1	---
Sur	0.2	0.1	0.3	---	0.1	---
Nacional	0.4	0.1	0.3	0.084-0.502	0.1	0.027-0.169

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

Para los hombres, se encuentran incrementos significativos a nivel nacional (1.7% a 2.2%) y en la región Occidental (1.2% a 2.5%) y, decremanta en la región Norcentral, que pasa de 2.8% a 1.7%. En la población femenina, el consumo de marihuana se mantiene estable con respecto a la encuesta anterior. El consumo de cocaína en la población total (Cuadro 6), registra decrementos que no alcanzan a ser significativos en la región Centro y en la Ciudad de México (de 0.4% a 0.2% y de 0.3% a 0.1%, respectivamente). En la población masculina se observa lo mismo, de manera que en las regiones Centro y Ciudad de México pasó de 0.6% a 0.2%; en tanto que en la región Sur pasó de 0.5% a 0.2%. En las mujeres, el consumo de esta droga se mantuvo estable.


El consumo de crack e inhalables se mantuvo igual a nivel nacional y regional. El consumo de heroína y de estimulantes de tipo anfetamínico, se mantuvo estable en todo el país.

2. Población adolescente de 12 a 17 años

a) Tendencias nacionales del consumo de drogas en el último año.

En el cuadro 7 se presentan los resultados nacionales en población de 12 a 17 años, del consumo de drogas en México.

En general, las prevalencias de consumo de drogas en el último año son bajas, el consumo de cualquier droga es de 1.6% y de 1.5% para cualquier droga ilegal, con relación al 2008, las prevalencias se mantienen iguales.



Como en la población adulta, en los adolescentes (Cuadro 7, Gráfica 6) se observa que el consumo de marihuana es el más prevalente (1.3%), le sigue la cocaína (0.4%) y los inhalables (0.3%). En todos los casos,

las prevalencias se mantienen iguales con relación al 2008.


Para los hombres, se encuentra una situación similar, el mayor consumo es de marihuana (2%), le siguen los inhalables (0.6%) y finalmente la cocaína (0.4%); no obstante, ninguno de los incrementos es estadísticamente significativo. Lo mismo ocurre con las mujeres, aunque sus prevalencias son menores a las mostradas por los hombres.

Cuadro 7: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 12 a 17 años.

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002	2008	2011	
	%	%	%	IC 95%
Total				
Mariguana	0.5	1.2	1.3	0.816-1.835
Cocaína**	0.2	0.4	0.4	0.160-0.641
Cualquier droga ilegal	0.7	1.5	1.5	1.001-2.081
Cualquier droga	0.8	1.7	1.6	1.093-2.188
Hombres				
Mariguana	0.9	1.7	2.0	1.111-2.927
Cocaína**	0.3	0.6	0.4	0.097-0.667
Cualquier droga ilegal	1.3	2.1	2.2	1.233-3.072
Cualquier droga	1.4	2.1	2.2	1.233-3.072
Mujeres				
Mariguana	0.1	0.6	0.6	0.176-1.050
Cocaína**	0.1	0.2	0.4	0.053-0.787
Cualquier droga ilegal	0.2	0.9	0.9	0.376-1.451
Cualquier droga	0.3	1.3	1.1	0.545-1.683

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.



Al considerar solo a la población urbana (Cuadro 8, Gráfica 7), se encontró una situación similar, aunque en este caso, la prevalencia del consumo de cualquier droga es mayor, alcanza un 2% y es igual que el reportado en el 2008. En el caso de cualquier droga ilegal, la prevalencia es de 1.9%, similar a la del 2008.

Las prevalencias de consumo más altas siguen siendo la marihuana (1.6%), la cocaína (0.5%) y los inhalables (0.4%). Si bien se muestra cierto crecimiento con relación al 2008 en estas drogas, este incremento no es estadísticamente significativo.

Cuadro 8: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Urbana de 12 a 17 años.

	Encuestas Nacionales de Adicciones					
	1988	1998	2002	2008	2011	
	%	%	%	%	%	IC 95%
Total						
Mariguana	1.2	0.9	0.7	1.3	1.6	0.974-2.318
Cocaína**	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.218-0.872
Cualquier Droga Ilegal	1.6	1.3	0.9	1.7	1.9	1.225-2.654
Cualquier Droga	1.9	1.6	1.0	2.0	2.0	1.283-2.726
Hombres						
Mariguana	1.8	1.6	1.2	1.9	2.6	1.345-3.757
Cocaína**	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.131-0.905
Cualquier Droga Ilegal	2.4	2.1	1.7	2.3	2.7	1.511-3.954
Cualquier Droga	2.7	2.7	1.7	2.4	2.7	1.511-3.954
Mujeres						
Mariguana	0.5	0.3	0.1	0.8	0.7	0.165-1.258
Cocaína**	--	0.1	0.1	0.1	0.6	0.073-1.073
Cualquier Droga Ilegal	0.7	0.5	0.1	1.1	1.1	0.427-1.815
Cualquier Droga	1.0	0.5	0.3	1.5	1.3	0.530-1.975

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.

** Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack.

b) Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año.

Al segmentar los datos por regiones, el tamaño de muestra resulta muy pequeño y el margen de error de las estimaciones es alto, por esta razón, en esta sección no se presentan datos por sexo, ya que la precisión es baja. Así, al analizar los datos de las 3 regiones globales del país (Cuadro 9 y Gráfica 8), para incluir a las encuestas del 2002 al 2008, tampoco se observan crecimientos estadísticamente significativos.

De esta forma, la región Norte presenta las prevalencias más altas, especialmente en comparación con la región Sur. En términos del crecimiento con relación al 2008, se observan crecimientos en el consumo de cualquier droga, en drogas ilegales, como la marihuana y cocaína; no obstante, conforme los intervalos de


confianza, los incrementos observados no son estadísticamente significativos.

Cuadro 9: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 12-17 años.

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002	2008	2011	IC 95%
Nacional	%	%	%	IC 95%
Mariguana	0.5	1.2	1.3	0.816-1.835
Cocaína**	0.2	0.4	0.4	0.160-0.641
Drogas ilegales	0.7	1.5	1.5	1.001-2.081
Cualquier droga	0.8	1.7	1.6	1.093-2.188
Región Norte				
Mariguana	0.8	1.4	2.2	1.095-3.341
Cocaína**	0.4	0.2	0.5	---
Drogas ilegales	1.3	1.7	2.6	1.371-3.882
Cualquier droga	1.3	1.8	2.9	1.606-4.191
Región Centro				
Mariguana	0.5	1.2	1.2	0.408-2.075
Cocaína**	0.1	0.4	0.4	0.030-0.721
Drogas ilegales	0.7	1.6	1.4	0.553-2.247
Cualquier droga	0.9	1.8	1.4	0.553-2.247
Región Sur				
Mariguana	0.2	0.9	0.7	0.139-1.314
Cocaína**	0.1	0.4	0.4	---
Drogas ilegales	0.3	1.2	0.9	0.213-1.544
Cualquier droga	0.4	1.5	1.0	0.313-1.686

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.



Al tomar en cuenta a las 8 regiones que se trabajaron en la ENA 2011 (Cuadro 10), en la región Centro Sur se muestra una disminución de 1.6% a 0.5% en el consumo de cualquier droga. En las demás regiones del país se observa que la prevalencia se mantiene similar a la del 2008.

Cuadro 10: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 12 a 17 años.

Región	ENA 2008		ENA 2011			
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	2.0	2.0	1.5	0.353-2.599	1.2	0.145-2.267
Noroccidental	1.8	1.7	2.3	0.536-4.082	2.3	0.536-4.082
Nororiental	1.7	1.5	4.5	1.623-7.462	4.0	1.202-6.839
Occidental	1.2	1.0	1.6	0.357-2.846	1.6	0.357-2.846
Centro	1.6	1.5	1.1	0.071-2.109	1.1	0.071-2.109
Ciudad de México	4.0	3.1	2.6	---	2.6	---
Centro Sur	1.6	1.2	0.5	0.006-0.983	0.4	---
Sur	1.2	1.1	1.9	0.231-3.547	1.8	0.123-3.421
Nacional	1.7	1.5	1.6	1.093-2.188	1.5	1.001-2.081

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

En cuanto a la marihuana y la cocaína (Cuadro 11), no se registran incrementos significativos en la población adolescente, de hecho, en la mayoría de las regiones el consumo de ambas sustancias se mantuvo estable, con excepción de las región Norcentral en donde se presenta un decremento en el consumo de marihuana (1.7% a 0.8%). .

El consumo de crack detectado, fue prácticamente nulo en la población adolescente, muy similar a lo que ocurrió en el 2008, donde la prevalencia nacional del último año fue de 0.1%. En el caso de los inhalables, el consumo también es bajo, pero es importante notar que en las regiones Noroccidental, en la ciudad de México y en la región Sur, donde antes se presentaba un consumo mínimo, ahora se encuentran prevalencias de 0.5%.

El consumo de heroína en población adolescente que vive en sus hogares, es mínimo en todo el país y muy similar a lo reportado en la encuesta del 2008, en donde la prevalencia nacional era menor al 0.1%. Por lo

que respecta a los estimulantes tipo anfetamínico, en la población adolescente se detecta actualmente una prevalencia importante en la región Nororiental (0.9%), mientras que en 2008 el consumo fue mínimo.

Cuadro 11: Tendencias regionales del Consumo de Marihuana y Cocaína en el Último Año en Población Total de 12 a 17 años.

Región	ENA 2008		ENA 2011			
	Marihuana %	Cocaína %	Marihuana %	IC 95%	Cocaína %	IC 95%
Norcentral	1.7	0.1	0.8	0.023-1.550	0.3	---
Noroccidental	1.5	0.1	2.3	0.536-4.082	--	---
Nororiental	1.1	0.5	3.2	0.784-5.714	1.0	---
Occidental	0.7	0.1	1.4	0.203-2.559	0.8	---
Centro	1.0	0.5	1.0	0.013-2.036	0.3	---
Ciudad de México	2.8	0.2	2.1	---	0.3	---
Centro Sur	1.0	0.5	0.2	---	0.2	---
Sur	0.8	0.3	1.6	0.126-3.130	0.8	---
Nacional	1.2	0.4	1.3	0.816-1.835	0.4	0.160-0.641

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

c) ¿Quiénes son los jóvenes que consumen drogas? ¿Cuál ha sido la cobertura de prevención en la población adolescente?

Las principales acciones de prevención en nuestro país, se han dirigido a la población adolescente, con objeto de protegerla del consumo de drogas. Se preguntó a la población entrevistada si ha estado expuesta a algún programa de prevención, de manera que el 64.1% de los hombres y el 70% de las mujeres contestaron afirmativamente a esta pregunta, lo que representa un incremento en los últimos 3 años, del 14% en la cobertura preventiva. Aspecto que muy probablemente ha ayudado a contener el consumo en esta población. Esta prevención la han recibido principalmente en la escuela (89%), seguida por quienes la han recibido en una Unidad o Centro de Salud (5.5%) y en su comunidad (2.3%).

La relación entre haber recibido este tipo de intervenciones preventivas con el consumo de drogas en el último año, se muestra en el cuadro 12a. Aquellos que han recibido prevención reportan también menor consumo de drogas; esta relación es más aparente en la población total, en donde la proporción de quienes han recibido prevención es de 1.2% y quienes no la han recibido es de 2.6%.

En el cuadro 12b se muestra un análisis con mayor detalle de la relación entre la prevención y el consumo de drogas, así como con otros factores asociados con la aplicación de una regresión logística multivariada⁴, en donde se indica que, el no haber recibido prevención incrementa la probabilidad de consumir drogas, tanto en los hombres como en las mujeres.

Cuadro 12a: Exposición a la prevención y consumo de drogas en el último año en Población Total de 12 a 17 años.

	Expuesto a prevención			No Expuesto a prevención		
	N	%	IC 95%	N	%	IC 95%
Hombres	74806	1.7	0.535-2.893	71750	2.9	1.482-4.392
Mujeres	32384	0.7	0.148-1.239	41476	2.1	0.688-3.540
Total	107190	1.2	0.547-1.827	113226	2.6	1.522-3.618

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Cuadro 12b: Factores asociados al consumo de drogas en adolescentes de 12-17 años.

VARIABLES	Hombres			Mujeres		
	OR	p	IC 95%	OR	p	IC 95%
No expuesto a la prevención	7.82	<0.001	3.427-17.828	4.80	0.006	1.583-14.531
Expuesto a drogas	21.68	<0.001	8.139-57.773	23.74	<0.001	9.234-61.009
No estudia	5.15	<0.001	2.211-12.007	1.21	0.701	0.454-3.234
No trabaja	1.70	0.237	0.705-4.106	1.23	0.777	0.291-5.205
Tolerancia del mejor amigo a drogas	2.62	0.027	1.116-6.135	1.38	0.567	0.460-4.124
Baja percepción de riesgo de drogas	3.40	0.002	1.561-7.411	0.87	0.781	0.337-2.265
Región Sur	1.00					
Región Norcentral	1.16	0.850	0.245-5.515	0.38	0.210	0.084-1.725
Región Noroccidental	1.42	0.625	0.350-5.732	0.13	0.086	0.013-1.330
Región Nororiental	1.07	0.933	0.238-4.771	2.18	0.306	0.490-9.689
Región Occidental	0.61	0.510	0.137-2.684	0.64	0.568	0.139-2.949
Región Centro	0.42	0.270	0.089-1.966	0.75	0.696	0.175-3.199
Ciudad de México	0.84	0.853	0.134-5.280	0.97	0.972	0.174-5.392
Región Centro Sur	0.33	0.207	0.058-1.853	1.76	0.418	0.447-6.942

OR Riesgo relativo.

⁴ El análisis considera el diseño de muestra del estudio e incluye a la región como variable, con objeto de controlar las variaciones de consumo en el país.

Adicional al efecto de la prevención recibida, en los hombres se encuentra que el haber estado expuesto a drogas (que se la hayan ofrecido regalada o comprada), que ya no esté estudiando, que su percepción de riesgo sobre el consumo de drogas sea bajo, o que haya tolerancia ante el consumo de drogas de su mejor amigo, son factores adicionales que predicen su posible consumo.

Para las mujeres, se adiciona como predictor del consumo, el que le hayan ofrecido, regalada o comprada alguna droga.


En este contexto, los resultados indican que la prevención ha ayudado a evitar que se consuman drogas, señalando también que deben incrementarse las opciones y programas de prevención fuera del ámbito escolar.

3. Población adulta de 18 a 65 años

a) Tendencias nacionales del consumo de drogas en el último año.

En el cuadro 13 se presentan los resultados nacionales en población de 18 a 34 años y, en el cuadro 14 los relativos a la cohorte de 35 a 65 años.

En el grupo de 18 a 34 años es en donde se encuentran las prevalencias más altas de consumo. La prevalencia de consumo global fue de 2.8% y no representó un incremento estadísticamente significativo con relación al 2008 (2.2%). De nuevo, la marihuana (1.9%) y la cocaína (0.8%) son las drogas de mayor consumo, en tanto que las demás drogas tienen prevalencias debajo de 0.2% (Gráfica 9).



Al analizarlo según sexo, los hombres presentan la prevalencia más alta para el consumo de cualquier droga, con un incremento estadísticamente significativo pasando de 3.4% en 2008 a 4.7% en 2011.

En las mujeres de este grupo de edad, el consumo de cualquier droga se mantuvo estable en 1.1%, con consumos bajos de mariguana y de otras drogas.

Cuadro 13: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 18 a 34 años

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002 %	2008 %	2011 %	2011 IC 95%
Total				
Mariguana	1.0	1.4	1.9	1.295-2.423
Cocaína**	0.6	0.7	0.8	0.476-1.106
Crack	***	0.2	0.2	0.041-0.423
Alucinógenos	***	0.1	0.2	---
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.018-0.270
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.2	0.2	0.064-0.313
Cualquier droga ilegal	1.4	2.0	2.3	1.681-2.907
Cualquier droga	1.9	2.2	2.8	2.164-3.479
Hombres				
Mariguana	2.2	2.4	3.4	2.344-4.411
Cocaína**	1.3	1.3	1.6	0.949-2.241
Crack	0.1	0.4	0.4	0.051-0.825
Alucinógenos	***	0.1	0.3	---
Inhalables	0.1	0.2	0.2	0.009-0.425
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.3	0.4	0.123-0.637
Cualquier droga ilegal	3.0	3.3	4.1	3.011-5.279
Cualquier droga	3.6	3.4	4.7	3.472-5.865
Mujeres				
Mariguana	0.2	0.5	0.4	---
Cocaína**	***	0.2	***	---
Crack	--	0.1	***	---
Alucinógenos	***	***	--	---
Inhalables	--	***	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	0.1	***	---
Cualquier droga ilegal	0.2	0.8	0.6	0.045-1.081
Cualquier droga	0.7	1.0	1.1	0.497-1.690

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Para el subgrupo de 35 a 65 años (Cuadro 14, Gráfica 10) el consumo permanece sin cambios, con una prevalencia del 1.7% para los hombres y de 0.3% para las mujeres. El consumo de marihuana en esta población tiene una prevalencia del 0.6%.


Cuadro 14: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 35 a 65 años.

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002 %	2008 %	2011 %	IC 95%
Total				
Mariguana	0.2	0.6	0.6	0.352-0.779
Cocaína**	0.2	0.2	0.3	0.132-0.398
Crack	--	***	0.1	---
Alucinógenos	***	***	***	---
Inhalables	0.1	0.1	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	***	0.1	---
Cualquier droga ilegal	0.3	0.8	0.8	0.507-1.025
Cualquier droga	0.9	1.0	1.0	0.693-1.267
Hombres				
Mariguana	0.5	1.1	1.1	0.702-1.583
Cocaína**	0.4	0.4	0.5	0.249-0.793
Crack	--	0.1	0.1	---
Alucinógenos	***	0.1	***	---
Inhalables	0.2	0.1	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	0.1	0.1	---
Cualquier droga ilegal	0.7	1.4	1.4	0.953-1.900
Cualquier droga	1.4	1.7	1.7	1.206-2.262
Mujeres				
Mariguana	***	0.1	***	---
Cocaína**	***	***	***	---
Crack	--	***	--	---
Alucinógenos	--	***	--	---
Inhalables	--	0.1	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	***	0.1	---
Cualquier droga ilegal	***	0.1	0.2	---
Cualquier droga	0.5	0.4	0.3	0.029-0.566

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1



Al considerar solo a la población urbana (Cuadro 15, Gráfica 11), se encontró que el consumo de cualquier droga es de 3.1% y de drogas ilegales de 2.5%, manteniéndose estable con relación al 2008.

Cuadro 15: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Urbana de 18 a 34 años


	Encuestas Nacionales de Adicciones					
	1988	1998	2002	2008	2011	
Total	%	%	%	%	%	IC 95%
Mariguana	1.9	1.6	1.1	1.6	2.1	1.406-2.778
Cocaína**	0.2	0.7	0.7	0.8	0.8	0.449-1.190
Alucinógenos	0.2	0.1	***	0.1	0.2	---
Inhalables	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.008-0.321
Cualquier Droga Ilegal	2.1	1.8	1.5	2.3	2.5	1.781-3.251
Cualquier Droga	2.9	2.5	2.1	2.5	3.1	2.332-3.918
Hombres						
Mariguana	3.8	3.6	2.3	2.7	3.8	2.549-5.050
Cocaína**	0.5	1.5	1.6	1.4	1.7	0.888-2.421
Alucinógenos	0.4	0.2	***	0.2	0.4	---
Inhalables	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	---
Cualquier Droga Ilegal	4.3	4.1	3.3	3.8	4.5	3.162-5.861
Cualquier Droga	5.0	4.6	3.9	3.9	5.1	3.674-6.543
Mujeres						
Mariguana	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	---
Cocaína**	--	0.2	0.1	0.3	***	---
Alucinógenos	--	--	***	***	--	---
Inhalables	***	***	--	***	0.1	---
Cualquier Droga Ilegal	0.1	0.2	0.1	1.0	0.7	0.020-1.331
Cualquier Droga	1.0	1.0	0.9	1.3	1.3	0.546-2.046

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.

** Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Gráfica 11. Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Urbana de 18 a 34 años por sexo




Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.

En los hombres la prevalencia es mas alta (5.1% cualquier droga y 4.5% drogas ilegales), que en las mujeres (1.3% y 0.7%) y, en ambos casos, la marihuana es la de mayor consumo en la población.

En la misma población urbana, pero con las personas de 35 a 65 años (Cuadro 16, Gráfica 12), se encuentra que el consumo se mantiene en 1.1%, en la población total, con 1.9% para hombres y 0.4% para mujeres, con el consumo más alto de marihuana en los hombres, con una prevalencia del 1.3%.

Gráfica 12. Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año. Población Urbana de 35 a 65 años por sexo



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.

Cuadro 16: Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Urbana de 35 a 65 años

	Encuestas Nacionales de Adicciones					IC 95%
	1988	1998	2002	2008	2011	
Total	%	%	%	%	%	
Mariguana	0.3	0.4	0.1	0.6	0.6	0.376-0.892
Cocaína**	***	0.2	0.1	0.2	0.3	0.121-0.422
Alucinógenos	--	--	--	***	***	---
Inhalables	***	--	0.1	0.1	***	---
Cualquier Droga Ilegal	0.3	0.5	0.3	0.8	0.8	0.517-1.134
Cualquier Droga	1.0	1.1	0.9	1.2	1.1	0.748-1.436
Hombres						
Mariguana	0.7	1.0	0.2	1.2	1.3	0.754-1.831
Cocaína**	***	0.5	0.2	0.4	0.5	0.224-0.844
Alucinógenos	--	--	--	0.1	***	---
Inhalables	***	--	0.3	0.2	0.1	---
Cualquier Droga Ilegal	0.7	1.1	0.6	1.6	1.5	0.963-2.091
Cualquier Droga	1.3	1.9	1.4	1.9	1.9	1.279-2.553
Mujeres						
Mariguana	--	--	***	0.1	0.1	---
Cocaína**	--	--	***	***	***	---
Alucinógenos	--	--	--	--	--	---
Inhalables	***	--	--	0.1	--	---
Cualquier Droga Ilegal	***	--	***	0.2	0.2	---
Cualquier Droga	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.036-0.697

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.

** Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

b) Tendencias regionales del consumo de drogas en el último año.

Al analizar los resultados conforme las tendencias regionales, en la población total de 18 a 34 años, las prevalencias del consumo de drogas se han mantenido sin cambios estadísticamente significativos (Cuadro 17, Gráfica 13).

Se observa que el consumo de cualquier droga pasó de 2.2% a 2.8%, pero el cambio no es estadísticamente significativo. Dicho cambio se muestra en las tres regiones, de manera que en la región Sur se presenta el menor cambio (1.6% a 1.9%).

Cuadro 17: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 18-34 años.


	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002	2008	2011	IC 95%
Nacional	%	%	%	IC 95%
Mariguana	1.0	1.4	1.9	1.295-2.423
Cocaína**	0.6	0.7	0.8	0.476-1.106
Crack	***	0.2	0.2	0.041-0.423
Alucinógenos	***	0.1	0.2	---
Inhalables	0.1	0.1	0.1	0.018-0.270
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	0.2	0.2	0.064-0.313
Drogas ilegales	1.4	2.0	2.3	1.681-2.907
Cualquier droga	1.9	2.2	2.8	2.164-3.479
Región Norte				
Mariguana	2.4	1.9	2.4	1.521-3.374
Cocaína**	1.7	1.2	1.4	0.671-2.187
Crack	0.2	0.3	0.1	---
Alucinógenos	***	0.1	0.1	---
Inhalables	***	0.1	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.5	0.6	0.117-0.988
Drogas ilegales	3.3	2.8	3.2	2.043-4.310
Cualquier droga	3.9	2.9	4.0	2.771-5.179
Región Centro				
Mariguana	0.6	1.4	2.0	1.044-2.908
Cocaína**	0.2	0.5	0.4	0.086-0.648
Crack	***	0.2	0.2	0.009-0.362
Alucinógenos	***	0.1	0.1	---
Inhalables	0.1	0.1	0.2	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	***	0.1	---
Drogas ilegales	0.9	1.9	2.2	1.246-3.145
Cualquier droga	1.4	2.1	2.8	1.715-3.787
Región Sur				
Mariguana	0.5	1.0	1.1	0.194-1.994
Cocaína**	0.3	0.6	1.0	0.195-1.774
Crack	--	***	0.4	---
Alucinógenos	--	***	0.3	---
Inhalables	--	0.1	0.2	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	0.1	--	---
Drogas ilegales	0.5	1.5	1.7	0.594-2.719
Cualquier droga	1.1	1.6	1.9	0.791-2.965

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1


Gráfica 13. Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 18-34 años



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

Situación similar ocurre en la población de 35 a 65 años, en donde la prevalencia se mantiene en 1% y es en la región norte donde la prevalencia es mayor (1.6%) (Cuadro 18, Gráfica 14).

Gráfica 14. Tendencias del Consumo de Drogas en el Último Año. Población Total de 35-65 años



Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

Cuadro 18: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 35-65 años.

	Encuestas Nacionales de Adicciones			
	2002	2008	2011	IC 95%
Nacional	%	%	%	
Mariguana	0.2	0.6	0.6	0.352-0.779
Cocaína**	0.2	0.2	0.2	0.132-0.398
Crack	--	***	***	---
Alucinógenos	***	***	***	---
Inhalables	0.1	0.1	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	***	0.1	---
Drogas ilegales	0.3	0.8	0.8	0.507-1.025
Cualquier droga	0.9	1.0	1.0	0.693-1.267
Región Norte				
Mariguana	0.3	1.5	1.1	0.573-1.530
Cocaína**	0.3	0.5	0.8	0.330-1.222
Crack	--	0.1	0.2	---
Alucinógenos	--	0.1	--	---
Inhalables	--	0.2	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	0.1	0.3	---
Drogas ilegales	0.4	1.8	1.4	0.909-1.987
Cualquier droga	0.9	2.2	1.6	1.046-2.143
Región Centro				
Mariguana	0.1	0.3	0.4	0.166-0.650
Cocaína**	***	0.1	***	---
Crack	--	***	--	---
Alucinógenos	***	***	***	---
Inhalables	0.2	0.1	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	***	0.1	---
Drogas ilegales	0.2	0.4	0.5	0.194-0.879
Cualquier droga	1.1	0.5	0.8	0.432-1.256
Región Sur				
Mariguana	0.5	0.1	0.4	---
Cocaína**	0.5	0.1	0.2	---
Crack	--	***	--	---
Alucinógenos	--	--	--	---
Inhalables	--	***	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	--	***	--	---
Drogas ilegales	0.5	0.3	0.5	---
Cualquier droga	0.6	0.8	0.6	0.074-1.201

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

El consumo de cualquier droga se mantiene en 0.8% en la región Centro y en 0.6% en la región Sur. En todas las regiones, el consumo de marihuana es el mayor y se encuentra entre el 0.4% y el 1.1%.

Considerando ahora la distribución de 8 regiones (Cuadro 19), los resultados indican que en la región Nororiental hubo un incremento significativo en el consumo de cualquier droga en la población de 18 a 34 años (de 2.1% a 4.6%), en tanto, en la población de 35 a 65 años hubo un incremento en la región Occidental, donde el consumo de cualquier droga pasó de 0.4% a 1.6%, mientras que el consumo de cualquier droga ilegal pasó de 0.2% a 0.9%. Las demás regiones permanecieron sin cambios. Es importante mencionar que en la región Norcentral hubo decrementos para cualquier droga (2.2% a 1.3%), y para drogas ilegales (de 1.8% a 1.1%).

Cuadro 19: Tendencias regionales del Consumo de Drogas en el Último Año en Población Total de 18 a 65 años.

	ENA 2008		ENA 2011			
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
18 a 34 años						
Región						
Norcentral	3.1	2.9	3.1	1.430-4.796	2.4	0.779-4.048
Noroccidental	3.6	3.6	4.0	2.314-5.697	3.7	2.064-5.391
Nororiental	2.1	2.0	4.6	2.105-7.021	3.2	0.959-5.495
Occidental	1.8	1.4	2.6	1.354-3.859	2.0	0.861-3.085
Centro	2.1	1.9	2.5	1.026-4.056	2.0	0.571-3.330
Ciudad de México	2.7	2.4	3.8	1.784-5.746	3.4	1.516-5.378
Centro Sur	1.8	1.7	2.7	0.955-4.350	2.4	0.735-4.060
Sur	1.3	1.2	0.6	---	0.5	---
Nacional	2.2	2.0	2.8	2.164-3.479	2.3	1.681-2.907
35-65 años						
Región						
Norcentral	2.2	1.8	1.3	0.652-1.989	1.1	0.449-1.715
Noroccidental	2.4	1.8	2.1	1.085-3.196	2.1	1.085-3.196
Nororiental	2.0	1.8	1.3	0.345-2.275	1.1	0.165-2.032
Occidental	0.4	0.2	1.6	0.768-2.375	0.9	0.359-1.505
Centro	0.4	0.3	0.7	0.063-1.240	0.5	---
Ciudad de México	1.2	0.9	0.7	0.033-1.300	0.2	---
Centro Sur	0.7	0.4	0.8	---	0.8	---
Sur	0.9	0.2	0.4	---	0.1	---
Nacional	1.0	0.8	1.0	0.693-1.267	0.8	0.507-1.025

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

En cuanto al consumo de drogas específicas, la cocaína permaneció sin cambios significativos en la población de 18 a 65 años (Cuadro 20) en todas las regiones, con los mayores consumos en la parte Norte del país. En relación al consumo de marihuana, la población de 35 a 65 años de la región Occidental presenta un incremento significativo de 0.2% a 0.9% . En esta misma población, hubo una disminución en la región Nororiental (de 1.7% a 0.7%). En cuanto a los inhalables y el crack, su consumo es mínimo en todas las regiones, donde el mayor consumo de crack es de 0.8% y para inhalables es de 0.5%, ambos en la región Norcentral. Misma situación ocurre con la heroína y los estimulantes de tipo anfetamínico, donde la primera presenta su mayor valor en la región Norcentral y la segunda en la región Noroccidental.

Cuadro 20: Tendencias regionales del Consumo de Marihuana y Cocaína en el Último Año en Población Total de 18 a 65 años.

	ENA 2008		ENA 2011			
	Mariguana	Cocaína	Mariguana		Cocaína	
	%	%	%	IC 95%	%	IC 95%
18 a 34 años						
Región						
Norcentral	2.1	1.5	1.4	0.270-2.531	1.2	---
Noroccidental	2.5	1.1	2.9	1.483-4.328	1.4	0.133-2.663
Nororiental	1.2	1.0	2.8	0.908-4.662	1.6	0.274-2.924
Occidental	1.2	0.4	1.6	0.600-2.694	0.8	0.071-1.460
Centro	1.2	0.6	1.8	0.434-3.150	0.3	---
Ciudad de México	2.4	0.5	3.1	1.215-5.052	0.1	---
Centro Sur	1.0	0.8	1.5	0.089-2.878	1.6	0.325-2.873
Sur	0.9	0.4	0.5	---	--	---
Nacional	1.4	0.7	1.9	1.295-2.423	0.8	0.476-1.106
35-65 años						
Región						
Norcentral	1.3	0.8	0.8	0.214-1.301	0.5	---
Noroccidental	1.4	0.5	1.7	0.692-2.690	1.1	0.223-1.900
Nororiental	1.7	0.3	0.7	---	0.7	---
Occidental	0.2	--	0.9	0.359-1.505	0.1	---
Centro	0.2	0.1	0.3	---	--	---
Ciudad de México	0.7	0.1	0.2	---	0.1	---
Centro Sur	0.2	0.1	0.6	---	0.3	---
Sur	0.1	0.1	0.1	---	--	---
Nacional	0.6	0.2	0.6	0.352-0.779	0.3	0.132-0.398

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

4. Uso de servicios de la población usuaria de drogas de 12 a 65 años.

De los usuarios de drogas en el último año (Cuadro 21), el 9.4% ha recibido tratamiento en ese mismo periodo (10.3% hombres y 6.1% mujeres). Si se considera a las personas que tienen dependencia a drogas en el último año, es el 18.4% de esta población que ha asistido a tratamiento (19.8% hombres y 8.9% de las mujeres).

Al evaluar cómo ha sido el tratamiento recibido por la población con dependencia a drogas (Cuadro 22), se encuentra que la mayoría ha recibido tratamiento completo (35.0%) o parcial con algún profesionalista (22.1%), esto último debido principalmente porque la persona no continuó asistiendo. En el caso de las mujeres, la mayoría indicó asistir a un tratamiento completo con un profesionalista. El dato mismo de que hay pocas mujeres que asisten a este tipo de tratamiento, debe dirigir la atención para conocer qué está pasando con esta población y a dónde se están dirigiendo en busca de solucionar su problemática del consumo de drogas.

Cuadro 21: Usuarios que han recibido tratamiento

Sexo/Edad	Consumidores del último año			Dependientes a drogas en el último año		
	N	%	IC 95%	N	%	IC 95%
Total	136 900	9.4	5.519-13.327	101 965	18.4	8.775-28.089
Hombres	118 113	10.3	5.715-14.900	95 840	19.8	9.048-30.530
Mujeres	18 787	6.1	---	6 125	8.9	---

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Cuadro 22: Tipo de tratamiento recibido por las personas con dependencia a drogas

Tratamiento	Total			Hombres			Mujeres		
	N	%	IC 95 %	N	%	IC 95 %	N	%	IC 95 %
Completo con profesionalista	35 700	35.0	4.415-65.610	29 575	30.9	---	6 125	100.0	---
Parcial con profesionalista	22 554	22.1	3.616-40.624	22 554	23.5	3.711-43.355	--	--	---
Autoayuda/ Ayuda mutua	15 159	14.9	---	15 159	15.8	---	--	--	---
Otro tipo	28 551	28.0	1.582-54.420	28 551	29.8	1.956-57.625	--	--	---

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

En relación al tipo de profesionista con el que han asistido a tratamiento, los hombres mencionan principalmente a algún especialista (70.2%), a un grupo de autoayuda o ayuda mutua (53.8%), al psicólogo (45.1%) o al psiquiatra (40.1%). En el caso de las mujeres, es muy pequeña la muestra que ha asistido a tratamiento.

ENCUESTA NACIONAL de adicciones 2011



Drogas: Conclusiones

Conclusiones

Capítulo Drogas

El objetivo de la encuesta fue conocer si se modificó y en ese caso, cómo se modificó, el consumo de sustancias entre 2008 y 2011. Para evaluar las tendencias, la epidemiología cuenta con dos indicadores: *la prevalencia actual*, que se refiere a la proporción de personas que presentan la condición bajo estudio en los treinta días previos al momento de la entrevista y *la prevalencia anual*, que mide la presencia de la condición bajo estudio, en este caso, la proporción de personas que han consumido sustancias o presentado síntomas o diagnóstico de dependencia durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

La encuesta también reporta la prevalencia acumulada del consumo, es decir, el porcentaje de la población que ha usado drogas alguna vez en su vida. Cabe resaltar que la mayor parte de la población que forma parte de la prevalencia acumulada ya no consume drogas, pero es un indicador útil para conocer las diferencias del problema a lo largo de varias generaciones, aunque no es el ideal para conocer las diferencias en la proporción que usa drogas en dos periodos de tiempo.

Dado el objetivo de esta encuesta, el tiempo transcurrido entre los dos estudios y el alcance del tamaño de muestra utilizado, se optó por reportar la prevalencia anual; es decir, las similitudes y las diferencias de la proporción de la población que reportó haber consumido una o más drogas en el año previo a la realización de las encuestas de 2008 y de 2011.

Este reporte ha considerado también la regionalización de las diferentes encuestas para reportar las tendencias observadas a partir de la primera encuesta nacional, realizada en 1988. En los anexos estadísticos el lector podrá encontrar datos adicionales que se han reportado en encuestas previas.

La encuesta reporta datos para el *consumo de cualquier droga*, que incluye drogas de uso médico consumidas fuera de prescripción y tienen potencial de dependencia; *consumo de cualquier droga ilegal* y prevalencia por *tipo de droga*. En el caso de drogas ilegales los datos se reportan para el consumo de marihuana, cocaína (en cualquiera de sus presentaciones y de manera independiente su forma fumada conocida como crack), alucinógenos, inhalables y estimulantes tipo anfetamínico.

Prevalencia nacional

La tendencia al crecimiento que se observó entre 2002 y 2008 parece haberse detenido en los siguientes tres años de 2008 a 2011, no se observan cambios significativos en la proporción de personas que reportan consumo de cualquier droga en el último año; el consumo de drogas ilegales es muy similar en las dos mediciones. Tampoco se aprecian diferencias en el consumo por tipo de droga. La marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo y representa el 80% del consumo total de drogas. La cocaína sigue apareciendo en segundo lugar con un usuario de cocaína por cada 2.4 usuarios de marihuana. Uno de cada cinco usuarios de cocaína la consumen en forma de piedra o crack.

¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres?

Cuando se analizan las prevalencias por sexo, se encuentra un aumento en el consumo de marihuana en los hombres. El consumo en las mujeres se mantiene estable.

Los hombres siguen teniendo las cifras más altas de consumo, por cada mujer que reportó consumo de cualquier droga hay 4.2 hombres que lo reportaron.

La droga de preferencia en hombres y mujeres sigue siendo la marihuana, en los hombres la cocaína ocupa el segundo lugar y en las mujeres el consumo de cocaína muestra cifras similares a las reportadas para estimulantes tipo anfetamínico, droga que en los hombres ocupa el tercer lugar en la preferencia de consumo.

Cuando sólo se incluye la población urbana, los resultados son muy similares, con índices de consumo ligeramente más altos que los observados en las zonas rurales.

¿Se modifica la edad de inicio?

La edad promedio para el inicio en el consumo de drogas disminuyó entre 2002 y 2008, en las mujeres pasó de 23.6 años a 20.1 años; en tanto que en los hombres pasó de 19.8 años a 18.3 años. En cuanto a los resultados de la presente encuesta, la edad de inicio se mantiene estable, en 20 años para las mujeres y 18 años en los hombres.

¿Varían las tendencias en las regiones Norte, Centro y Sur del país?

En ambas mediciones la Región Norte tiene las prevalencias más altas, le sigue la Región Centro y es la Región Sur la que continúa teniendo las cifras más bajas de consumo. Por cada usuario en las Regiones Centro y Sur del país hay 1.6 y 2.3 usuarios, respectivamente, en la Región Norte. En las tres regiones, la marihuana es la droga de preferencia.

En cuanto a la cocaína, los datos muestran una tendencia que se observa desde 2002: el mayor índice de consumo de esta droga se da en la Región Sur en comparación con la Región Centro y, aunque se mantiene en los límites de los intervalos de confianza de las estimaciones, esta tendencia debe mantenerse bajo vigilancia. Asimismo, la diferencia entre el consumo de marihuana y cocaína en la Región Sur, es menor de la que se observa en otras regiones, con un usuario de cocaína por cada 1.2 usuarios de marihuana, mientras que la media nacional es de 1 por cada 2.4.

¿Hay variaciones en los índices de dependencia?

El índice de dependencia no presentó cambios significativos; sin embargo, cuando el análisis se hace por regiones del país, se observa un incremento de las personas que han desarrollado esta condición en la Región Norte del país.

¿Qué nos dicen los datos cuando se analizan 8 regiones?

El diseño de las encuestas de 2008 y 2011 permite dividir al país en 8 regiones, analizar sus prevalencias y comparar las tendencias. Los datos muestran que la Región Noroccidental (*Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa*), es la que tiene las prevalencias más elevadas de consumo de drogas ilegales (2.8%), seguida muy de cerca por la Región Nororiental (*Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí*) (2.4%). Estas dos regiones tienen cifras de prevalencia anuales significativamente más altas que la media nacional. El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de México (1.7%), con cifras muy similares a las de la Región Norcentral (*Chihuahua, Coahuila y Durango*) (1.6%) y Occidental (*Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco*) (1.5%); le siguen las Regiones Centro Sur (*Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero*) (1.3%), Centro (*Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala*) (1.2%) y la Región Sur (*Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán*) (0.6%), que tiene las prevalencias más bajas, menos de la mitad de la media nacional (1.5%).

En la Región Occidental se observaron aumentos significativos en el consumo de cualquier droga y de drogas ilegales, comparadas con las cifras de consumo reportadas en 2008. Esta tendencia significativa hacia el crecimiento se observa sólo en los hombres.

¿Hay variaciones por tipo de droga?

Este aumento en el consumo de drogas en la Región Occidental, se debe principalmente al incremento significativo en el consumo de marihuana, en los hombres de esta Región.

En contraste, hay un decremento en el consumo de marihuana en la Región Norcentral, en las cifras totales y en específico en los hombres.

El consumo de cocaína en la población total registra decrementos que no alcanzan a ser significativos, tanto en los hombres como en las mujeres. En las mujeres, el consumo de esta droga se mantuvo estable.

Por otro lado, el consumo de crack, de inhalables, de heroína y de estimulantes de tipo anfetamínico, se mantuvo estable.

¿Qué nos dicen los datos sobre la población adolescente entre 12 y 17 años?

El consumo de drogas en adolescentes es bajo y no hay cambios en relación con el 2008.

La marihuana es la droga de preferencia igual que en la población total; en este grupo hay 3.3 usuarios de marihuana por cada uno de cocaína (la media para la población total es de 2.4 usuarios de marihuana por cada uno de cocaína).

Es importante notar que el consumo de marihuana, en los hombres adolescentes de 12 a 17 años, es similar al reportado en la población total de 12 a 65 años; no obstante el consumo de cocaína cuenta con 2.25 usuarios en la población total por cada uno en la población adolescente.

En las mujeres adolescentes, consistentemente con lo observado en 2008, el consumo de marihuana y de cocaína es mayor al reportado por las mujeres adultas, lo que refleja su incorporación más reciente en el mercado de consumo.

El consumo de marihuana en hombres adolescentes es 3.3 veces más frecuente que en las mujeres, pero el consumo de cocaína en hombres y mujeres adolescentes es similar.

Como se ha observado históricamente, los inhalables ocupan un lugar importante en las preferencias de este grupo de edad, la cual no se observa en la población total. En este grupo, el consumo de cocaína e inhalables es muy similar, cuando en la población adulta el consumo de inhalables con fines de intoxicación es cinco veces menos frecuente que el consumo de cocaína.

¿Varían las tendencias en las regiones Norte, Centro y Sur del país?

Los datos indican que los índices de consumo en los adolescentes de estas tres regiones se mantiene estable. La Región Norte es la que sigue presentando las prevalencias más altas.

¿Esta tendencia es similar cuando se divide al país en 8 regiones?

Los datos muestran que el consumo se mantiene estable, en el consumo de cualquier droga ilegal y en las drogas médicas usadas fuera de prescripción (uso de cualquier droga).

Se detecta una prevalencia importante de consumo de estimulantes tipo anfetamínico en la Región Nororiental, cuando en 2008 el consumo fue mínimo; muy similar al índice de consumo de cocaína en población adolescente de esa región.

¿Qué pasa en los adultos jóvenes?

En el grupo de 18 a 34 años es en donde se encuentran las prevalencias más altas de consumo, sin incremento estadísticamente significativo con relación al 2008. La marihuana y la cocaína son las drogas de mayor consumo, con 2.4 usuarios de marihuana por cada uno que reporta haber consumido cocaína en el año previo al estudio. El consumo de otras drogas, es cuatro veces inferior al reportado para cocaína.

Al analizarlo según sexo, los hombres presentan la prevalencia más alta para el consumo de cualquier droga, con un incremento estadísticamente significativo de 2008 a 2011. En las mujeres de este grupo de edad, el consumo de cualquier droga se mantuvo bajo y estable.

¿Cómo se compara el consumo con la población entre 35 y 65 años?

Para el subgrupo de 35 a 65 años, el consumo permanece sin cambios entre las dos mediciones (2008 y 2011). Los índices de consumo en este grupo de edad, son significativamente menores que los observados para la población adulta joven, con índices de consumo de marihuana hasta 3.2 veces menor y de cocaína 2.7 veces menor.

En este grupo de edad hay mayor diferencia en los índices de consumo entre hombres y mujeres; en el grupo de 18 a 34 años hay 4.3 hombres que reportan haber usado drogas en el año previo, en comparación con 5.7 hombres por cada mujer en este grupo. La menor diferencia se observa entre los adolescentes con sólo dos hombres por cada mujer.

¿Cómo se comporta el fenómeno por regiones?

Cuando se analizan los datos para tres regiones: Norte, Centro y Sur, se encuentra un consumo estable en el grupo de 18 a 34 años en las diferentes regiones analizadas.

En el grupo de 35 a 65 años hay un decremento significativo del consumo de cualquier droga en la Región Norte.

Cuando se divide al país en ocho regiones, los resultados indican que en la Región Nororiental hubo un incremento significativo en el consumo de cualquier droga en la población de 18 a 34 años, así como en el consumo de cualquier droga y cualquier droga ilegal en la Región Occidental, en el grupo de 35 a 65 años.

¿Cuál ha sido la cobertura de prevención en la población adolescente?

El 64.1% de los hombres y el 70% de las mujeres reportaron haber estado expuestos a un programa de prevención, principalmente en la escuela. Aquellos que han recibido prevención reportan también menor consumo de drogas.

Los análisis de regresión logística múltiple muestran que el no haber recibido prevención y una mayor exposición a drogas, incrementan la probabilidad de consumirlas, tanto en los hombres como en las mujeres.

Haber estado expuesto a drogas (que se la hayan ofrecido regalada o comprada), no estar estudiando, una baja percepción de riesgo sobre el consumo de drogas, o una alta tolerancia ante el consumo de drogas de su mejor amigo, son factores que predicen el consumo, principalmente en los hombres.

¿Qué nos dicen los datos sobre el uso de servicios?

Los datos muestran que casi una de cada 5 personas con dependencia a drogas en el último año, ha asistido a tratamiento. El rezago es mayor para las mujeres, con 2.2 hombres con dependencia que ha recibido ayuda por cada mujer.

Una tercera parte ha recibido tratamiento completo y un 22% ha recibido tratamiento parcial.

En relación al tipo de profesionista con el que han asistido a tratamiento, entre los hombres destacan los grupos de autoayuda o ayuda mutua, seguidos los psiquiatras y por los psicólogos. En total, la proporción que ha recibido tratamiento de un profesionista es superior a la población que sólo ha participado en grupos de autoayuda o ayuda mutua.

Para concluir, en México, como en el resto del mundo, el consumo de drogas muestra periodos de aumento y periodos de decremento. Hacia el año de 2008 se encontraron crecimientos significativos en el consumo en comparación con lo que ocurría 6 años antes; en los tres años siguientes el consumo se ha estabilizado, *no hay cambios* significativos en los índices de consumo en el último año, en la población total estudiada.

Cuando los datos se analizan por sexo, encontramos un incremento en el consumo de *mariguana* en los hombres. Al analizar los datos por regiones, este aumento se manifiesta en la Región Occidental.

En los hombres y en las mujeres el consumo de cocaína se mantuvo estable. Por otro lado, en la Región Norte del país, se encuentra un crecimiento significativo entre quienes han desarrollado dependencia al consumo de drogas.

El consumo en *adolescentes* no se modificó, pero en las *mujeres*, consistentemente con lo observado en 2008, el consumo de mariguana y de cocaína, es mayor al observado para las mujeres adultas, lo que refleja su incorporación más reciente en el mercado de consumo.

Los datos muestran la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas, si bien el consumo en general se ha estabilizado, es importante ampliar la política de prevención y tratamiento y dirigir más acciones hacia la población adulta joven.

ENCUESTA NACIONAL
de adicciones 2011



Glosario de Términos de Drogas

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Drogas

Consumo de cualquier droga. Se refiere al uso de una o más sustancias médicas e ilegales.

Consumo experimental. Es cuando una persona reporta haber usado una o más sustancias, de una a cinco veces máximo.

Consumo en los últimos 12 meses. Se refiere al uso de alguna sustancia en los últimos 12 meses; también se le conoce como prevalencia anual.

Consumo en los últimos 30 días. Se refiere al uso de alguna sustancia en los últimos 30 días; también se le conoce como prevalencia actual o mensual.

Consumo regular. Es cuando una persona reporta haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones.

Cualquier droga regalada o comprada. Se refiere al ofrecimiento de cualquier droga, sea regalada o para su compra, independientemente de que estas se consuman o no.

Dependencia a drogas. Es cuando una persona reporta haber tenido tres o más síntomas de dependencia asociados a su consumo de drogas.

Dependencia dado el abuso. Se refiere a las personas que reportaron haber usado una o más sustancias en más de cinco ocasiones y además presentan dependencia a las drogas.

Drogas ilegales. En este grupo se incluyen las siguientes sustancias: marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína y estimulantes tipo anfetamínico (metanfetaminas).

Drogas Médicas. En este grupo se incluyen aquellas sustancias que se prescriben médicamente, como los opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. Para considerar que el consumo de estas sustancias es con el fin de intoxicarse, el uso debe ser fuera de prescripción o por mayor tiempo o cantidad al indicado por el médico.

Incidencia acumulada. Se refiere a la prevalencia global de consumo o prevalencia alguna vez en la vida.

Índice de exposición a drogas. Es la oportunidad que tiene una persona de usar alguna droga debido a que se la han ofrecido regalada o comprada.

Marihuana regalada o comprada. Se refiere al ofrecimiento de marihuana regalada o para su compra, independientemente de que esta se consuma o no.

Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas. Esta variable permite conocer las necesidades en cada grupo de la población, en términos de prevención, prevención especializada o remisión a tratamiento. Se consideran cuatro valores, donde el de mayor problema es la dependencia a las drogas, el segundo valor es el de uso sin dependencia, seguido por exposición a drogas sin consumo y finalmente el no consumo.

Otra droga regalada o comprada. Se refiere al ofrecimiento de cualquier droga, sin incluir marihuana, sea regalada o para su compra, independientemente de que estas se consuman o no.

Percepción de riesgo al consumo. Grado de peligrosidad que el individuo atribuye a las consecuencias negativas de consumir drogas o alcohol.

Remisión dado el abuso. Se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido al abuso en el consumo de drogas.

Remisión dada la dependencia. Se refiere a las personas que asisten a tratamiento debido a su dependencia a las drogas.

Remisión por uso de drogas. Se refiere a la asistencia de una persona a tratamiento debido al consumo de drogas.

Tolerancia social. Se refiere a la aceptación o rechazo hacia el consumo de drogas o alcohol por parte de la familia, los amigos, la pareja o el entorno social.

Tratamiento completo con profesionalista. Se refiere al tratamiento que ha terminado o continúa recibiendo un usuario de drogas o alcohol, por parte de alguno de los siguientes profesionales de la salud: psiquiatra, médico familiar o de cabecera, algún otro médico como cardiólogo, ginecólogo, etc., psicólogo, trabajadora social en un centro de tratamiento, enfermera, terapeuta u otro profesional de la salud en un centro de salud. Para cumplir este criterio, es necesario haber asistido a 7 o más sesiones, cada una con una duración de 16 minutos o más para la consulta con el psiquiatra y el médico familiar y de 31 minutos o más con el resto de los profesionales.

Tratamiento parcial con profesionalista. Se refiere al tratamiento recibido por un usuario de drogas o alcohol sin que necesariamente siga en tratamiento o lo haya completado, por parte de alguno de los siguientes profesionales: psiquiatra, médico familiar o de cabecera, algún otro médico como cardiólogo, ginecólogo, etc., psicólogo, trabajadora social en un centro de tratamiento, enfermera, terapeuta u otro profesional de la salud en un centro de salud; además de haberlo consultado 7 o más sesiones, cada una con una duración de 16 minutos o más para la consulta con el psiquiatra y el médico familiar y de 31 minutos o más con el resto de los profesionales.

Uso dada la oportunidad. Se refiere a las personas que consumen drogas y que reportaron el ofrecimiento previo de alguna sustancia regalada o comprada.

ENCUESTA NACIONAL de adicciones 2011



Referencias

Referencias

1. Chávez, J., Villatoro, J., Robles, L., Bretón, M., Sánchez, V., Gutiérrez, M. et. al. (2010). *Encuesta escolar sobre adicciones en el Estado de Jalisco*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México, D.F.
2. Gutiérrez López, A.D., Castillo Franco, P.I. (2010). *Tendencias del consumo alguna vez en la vida de drogas en Centros de Integración Juvenil. Segundo semestre de 2004-Primer semestre de 2009*. Archivo electrónico. Centros de Integración Juvenil, A. C., Dirección de Investigación y Enseñanza, Subdirección de Investigación, Informe de Investigación 10-01e, México.
3. Martín del Campo, R., Villatoro, J., Mosqueda, M., Gaytán, F., López, MA., García, P., et al (2009). *Encuesta del Estado de México Sobre el Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en Estudiantes, 2009*. Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Toluca, Estado de México.
4. Observatorio de Argentina. SEDRONAR. Observatorio Argentino de Drogas. *Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas 2010 Disponible en: <http://www.observatorio.gov.ar/>*.
5. Observatorio de Chile, Ministerio de Salud Pública - Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes CONACE. Observatorio Chileno de Drogas, 2010. *"Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población General, 2010"* Disponible en: <http://www.senda.gob.cl/observatorio/>
6. Observatorio de Colombia. Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección social y Dirección Nacional de Estupefacientes. *Estudio Nacional de consumo de Drogas en Colombia, 2008. Disponible en: <http://odc.dne.gov.co/>*
7. Observatorio de Perú. DEVIDA. *"III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población General de Perú 2006"*. Disponible en: <http://www.opd.gob.pe/>
8. Observatorio de Costa Rica. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Organización de los Estados Americanos. *Encuesta Nacional Sobre el Consumo de Drogas, 2006. Disponible en: http://www.icd.go.cr/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=9*
9. Observatorio de Uruguay. Junta Nacional de Drogas. Observatorio Uruguayo de Drogas. Organización de los Estados Americanos. Oficina de Drogas y Delito. *Cuarta Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, 2006. Disponible en: <http://www.infodrogas.gub.uy/>*
10. Observatorio de México. Consejo Nacional Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud. *Encuesta Nacional de Adicciones, 2008. Disponible en: http://www.conadic.salud.gob.mx/publicaciones/observatorio_2003.html*
11. Oficina contra la Droga y el Delito & Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2008). *Primer Estudio Comparativo sobre Consumo de Drogas y Factores Asociados en Población de 15 a 64 años, 2008*.
12. Organización Panamericana de la Salud & Instituto Nacional de Salud Pública (MX) (2010). *Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos México 2009*. Instituto Nacional de Salud Pública, coeditado con la Organización Panamericana de la Salud. México.

13. Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D. & Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. (2010). *Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas"*. Tendencias en el área metropolitana No. 49, Noviembre de 2010. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
14. Reynales-Shigematsu, L.M., Valdés-Salgado, R., Rodríguez-Bolaños, R., Lazcano-Ponce, E. & Hernández-Ávila, M. (2009). *Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes en México. Análisis descriptivo 2003, 2005, 2006, 2008* Instituto Nacional de Salud Pública México. México.
15. Rojas, E., Fleiz, C., Villatoro, J., Gutiérrez, ML. & Medina-Mora, ME (2009) *Tendencias del consumo de Drogas de 1998 a 2005 en tres ciudades de la zona norte de México: Ciudad Juárez, Monterrey y Tijuana*. *Salud Mental*, 32 (4):13-19
16. Sistema Nacional de Encuestas de Salud. (1990). *Encuesta Nacional de Adicciones (Drogas)*. Dirección de Epidemiología, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Secretaría de Salud.
17. Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología (1994). *Encuesta Nacional de Adicciones 1993 (ENA-93)*. México, D.F.: SSA.
18. Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, Instituto Mexicano de Psiquiatría, Dirección General de Epidemiología, Consejo Nacional Contra las Adicciones (1999). *Tercera Encuesta Nacional de Adicciones*. México.
19. Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cravioto, P., Fleiz, C., Galván, F., Rojas, E. et al (2003). *Encuesta Nacional de Adicciones 2002, Capítulo de Drogas*. Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, INPRFM, Dirección General de Epidemiología, DGE, Instituto Nacional Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México.
20. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Instituto Nacional de Salud Pública (2009). *Publicación Especial. Encuesta Nacional de Adicciones. Reporte de Resultados Nacionales*. Vol. 1:pp173.
21. Secretaría de Salud & Dirección General de Epidemiología (2009). *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, Reporte Nacional 2008*. Secretaría de Salud. México Consultado: 29 de julio de 2010. En: http://www.dgepi.salud.gob.mx/sis/SISVEA%202008/sisvea_2008_index.html.
22. United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, *World Drug Report 2010* (United Nations Publication, Sales No. E.10.XI.13). Consultado: 27 de Julio de 2010, http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf.
23. Villatoro, J., Gutiérrez, M., Quiroz, N., Juárez, F. & Medina-Mora, M.E. (2007). *Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en estudiantes de Nuevo León, 2006*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México.
24. Villatoro, J., Gutiérrez, M.L., Quiroz, N., Moreno, M., Gaytán, L., Gaytán F. et al (2009). *Encuesta de estudiantes de la Ciudad de México 2006. Prevalencias y evolución del consumo de drogas*. *Salud Mental*; 32(4): 287-297.

25. Villatoro, J., Gaytán, F., Moreno, M., Gutiérrez, ML., Oliva, N., Bretón, M., et al. (2011). *Tendencias del uso de Drogas en la Ciudad de México: Encuesta de Estudiantes del 2009*. *Salud Mental* 2011; 34(2):81-94.

ENCUESTA NACIONAL de adicciones 2011



Anexo 1: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones (SISVEA)

ANTECEDENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA¹

RESULTADOS REGIONALES

A continuación se presentan los resultados para los Centros de Tratamiento no Gubernamentales, derivados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. En los archivos que componen este anexo, se muestran las gráficas de los resultados aquí descritos.

a) Resultados en base a la droga con que iniciaron su consumo (Droga de Inicio)

Región Norcentral: En esta región, las tres primeras drogas son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Al interior de la región Coahuila y Durango tienen al alcohol como primera droga; sin embargo, en Chihuahua este lugar lo ocupa el tabaco, con incrementos de 2004 a la fecha.

Región Noroccidental: En la región, la primera droga es la marihuana, seguida del alcohol y el tabaco, cabe destacar que la presencia de cristal como droga de inicio se ha situado en cuarto lugar desde el año 2000 a la fecha. En los estados de esta región, Baja California tiene como principal droga a la marihuana, además, el cristal ha aumentado su porcentaje desde el año 2000 manteniéndose como la cuarta droga. Baja California Sur y Sinaloa tienen al alcohol como principal droga y, únicamente en Sonora el consumo de tabaco se ubica al en primer lugar. Con todo y ello el tabaco ha disminuido su porcentaje en todos los estados de la región.

Región Nororiental: En esta región, el alcohol ocupa el primer lugar, seguido de la marihuana y el tabaco. Al analizar los datos de esta región, San Luis Potosí y Tamaulipas tienen como segunda droga a la marihuana aunque ha disminuido desde 2006. En Nuevo León la segunda droga es el tabaco, que ha aumentado, seguido de la marihuana.

Región Occidental: El alcohol, el tabaco y la marihuana son las tres primeras drogas de inicio, mientras que la cocaína se sitúa en el cuarto lugar desde el año 2000. En todos los estados de la región, el alcohol ocupa el primer lugar, en Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Zacatecas el tabaco

¹ Agradecemos al SISVEA el facilitar la información aquí descrita, de manera especial al Mtro. Mario Cortés.

es la segunda droga. En tanto, en Colima la marihuana es la segunda droga. Finalmente, en Jalisco la cocaína ha presentado decrementos desde 2002 y actualmente es la quinta droga de inicio.

Región Centro: En la región, el alcohol ocupa el primer lugar, el segundo lugar lo ocupan los inhalables y el tercero la marihuana. En Puebla, Querétaro y Tlaxcala, la segunda droga es el tabaco. En el estado de Guanajuato los inhalables han presentado un decremento desde el 2006 y actualmente son la segunda droga de inicio. En el estado de México, Hidalgo y Morelos la marihuana es la segunda droga de inicio.

Ciudad de México: El alcohol se ha mantenido como primera droga de inicio desde el 2000, con porcentajes por arriba de las demás drogas, la segunda droga de inicio es el tabaco. Además, los inhalables han aumentado su porcentaje desde 2006 y actualmente son la tercera droga de inicio. La marihuana es la cuarta droga.

Región Centro Sur: El alcohol, la marihuana y el tabaco son las principales drogas de inicio. En esta región todos los estados tienen como primera droga al alcohol. La marihuana ocupa el segundo lugar en Oaxaca y Veracruz, mientras que en Guerrero y Michoacán, el tabaco ocupa el segundo lugar, seguido de la marihuana. En Veracruz, el tercer lugar lo tienen los inhalables.

Región Sur: Esta región tiene como principales drogas al alcohol, seguida del tabaco y la marihuana. Adicionalmente, la marihuana ocupa el segundo lugar en Quintana Roo y Tabasco, mientras que en Campeche, Chiapas y Yucatán el tabaco es la segunda droga.

b) Resultados en base a la droga que los llevó a solicitar tratamiento (Droga de Impacto)

Región Norcentral: En esta región, el alcohol es la principal droga de impacto, seguida de la heroína y la cocaína. En Coahuila, la segunda droga es la cocaína que se mantiene estable desde 2004, posteriormente aparece la marihuana con un incremento del 2006 a la fecha. En Durango la segunda droga de impacto es el cristal que mostró un decremento significativo a partir de 2006.

En Chihuahua la primera droga de impacto desde el 2000 es la heroína, la segunda droga es el alcohol y la tercera es la cocaína.

Región Noroccidental: En las tendencias generales de esta región, el cristal, la heroína y el alcohol son las tres primeras drogas de impacto. En todos los estados el cristal ocupa el primer lugar. En Baja California y Sonora la heroína ocupa el segundo lugar y el alcohol el tercero. Baja California Sur y Sinaloa reportan al alcohol como segunda droga, seguida de la cocaína.

Región Nororiental: Esta región reporta que el alcohol, el crack, la mariguana y la cocaína son las principales drogas por las que se acude a tratamiento. Nuevo León y Tamaulipas sitúan como primera droga el crack. En Nuevo León el alcohol ocupa el segundo lugar seguido de mariguana a diferencia de San Luis Potosí, donde el alcohol ocupa el primer lugar, la mariguana el segundo y los inhalables el tercero.

Región Occidental: Las primeras drogas de impacto en esta región son alcohol, mariguana y cocaína, esta última ha disminuido desde 2002. Al interior de la región, el alcohol ocupa el primer lugar en todos los estados. En Aguascalientes el segundo lugar lo ocupa el tabaco y el tercero la cocaína. En Colima el cristal ha presentado una disminución desde 2006 y actualmente ocupa el segundo lugar. En Jalisco y Nayarit, la mariguana y cocaína son las drogas de impacto predominantes. En tanto, en Zacatecas, el crack y la mariguana tienen un porcentaje similar.

Región Centro: El alcohol ocupa el primer lugar en toda la región. En el Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, los inhalables son la segunda droga. En Puebla esta posición la ocupa la mariguana con porcentajes muy similares a los inhalables y cocaína; mientras que en Morelos el crack ocupa el segundo lugar seguido de la cocaína y en Hidalgo la mariguana es la segunda droga, con porcentajes similares a los del crack.

Ciudad de México: El alcohol es la primera droga de impacto, el crack que ha disminuido desde 2006 a la fecha se presenta en segundo lugar, seguido de la cocaína que tuvo un decremento notable en 2002 y a la fecha se mantiene estable. Los inhalables aumentaron desde el 2000 y actualmente son la cuarta droga de impacto, seguidos de la mariguana y los tranquilizantes.

Región Centro Sur: En esta región, el alcohol, la mariguana, la cocaína y el crack son las primeras drogas. El alcohol es la primera droga de impacto en todos los estados de esta región. En

Guerrero, el segundo lugar lo ocupa el crack que ha disminuido desde 2004. La cocaína en Michoacán y Oaxaca, se ubican también en segundo lugar. En Veracruz, la marihuana ocupa el segundo lugar, seguido por la cocaína y el crack con una disminución del 2006 a la fecha.

Región Sur: En todos los estados de esta región, el alcohol ocupa el primer lugar. En Campeche, Quintana Roo y Tabasco el crack sigue siendo la segunda droga a pesar de registrar decrementos importantes, en tercer lugar aparece la marihuana. En el caso de Yucatán, el tabaco ocupa el segundo lugar, el crack, que años atrás estaba en primer lugar, actualmente se reporta como tercera droga de impacto. En Chiapas, la sustancia principal es el alcohol, con prevalencias muy por arriba de las demás sustancias.

c) Resultados en base a las drogas que han consumido los usuarios (Consumo alguna vez)

Región Norcentral: El alcohol es la primera droga de consumo en ésta región. La marihuana se ha mantenido estable y con una ligera disminución, siendo la segunda droga de preferencia. El consumo de heroína ha disminuido situándose la quinta droga de consumo mientras que el tabaco ocupa la cuarta posición. Al interior de la región, la cocaína presentó disminuciones en todos los estados; en Coahuila disminuyó considerablemente el uso de heroína, aunque el incremento se dio en alcohol e inhalables. En Durango, el consumo de cristal fue alto comparado con la prevalencia de otros estados, aunque en 2009 tuvo una disminución importante.

Región Noroccidental: En ésta región, la marihuana fue la principal droga que ha usado la población, seguida del alcohol y el cristal con porcentajes similares. Por estado, Baja California reporta como principal droga el cristal; en Baja California Sur, esta sustancia es la segunda droga de preferencia. En Sonora, la marihuana fue la sustancia de preferencia y en Sinaloa, el alcohol.

Región Nororiental: El alcohol es la principal droga de consumo, con una tendencia al incremento, seguido por la marihuana y la cocaína. El tabaco, en promedio es la cuarta droga de preferencia. Al interior de la región, el alcohol, la marihuana y la cocaína siguen siendo las principales drogas de consumo. Nuevo León registra como cuarta droga el crack y Tamaulipas al tabaco. Para San Luis Potosí, los inhalables ocuparon éste lugar.

Región Occidental: En ésta región, la principal droga de consumo es el alcohol, con porcentajes por arriba de las demás sustancias. En Colima y Jalisco, la marihuana es la segunda sustancia utilizada y en Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes lo fue el tabaco, aunque cabe destacar que en éste último estado, la prevalencia de tabaco es similar a la de cocaína.

Región Centro: En la región centro, el alcohol constituye la principal droga de consumo. La segunda es la marihuana, con prevalencias mucho más bajas que las del alcohol. En el Estado de México, Guanajuato y Querétaro, los inhalables son la tercer sustancia de preferencia. En Hidalgo y Morelos, éste lugar lo ocupa la cocaína, mientras que en Puebla y Tlaxcala, es el tabaco.


Ciudad de México: La principal droga reportada en esta región es el alcohol, a éste le sigue la marihuana, el tabaco y los inhalables. La marihuana ha mantenido un comportamiento estable al igual que el tabaco; los inhalables registraron un aumento en su prevalencia.

Región Centro Sur: La principal droga consumida en la región es el alcohol, seguida de la marihuana, cocaína y tabaco. Al analizar las tendencias por estados, este comportamiento es similar en Guerrero y Michoacán. Guerrero presentan aumentos en el consumo de alcohol y tabaco, mientras que en Michoacán el cristal, aunque no está dentro de las principales drogas de consumo, en 2009 tuvo una importante disminución. Para Oaxaca, la principal sustancia utilizada es el alcohol, y con porcentajes más bajos a éste, la marihuana. Finalmente, en Veracruz el alcohol es el más consumido, y los inhalables, aunque es la cuarta sustancia, tiene mayor prevalencia que en los demás estados.

Región Sur: En la región Sur, el alcohol constituye la principal droga de consumo, con porcentajes altos. Le siguen la marihuana, tabaco, cocaína y crack, éstas últimas con prevalencias cercanas entre sí. Éste patrón se observa similar en todos los estados, con excepción de Chiapas. La marihuana es la segunda droga de preferencia en casi todos los estados excepto Yucatán, en donde el tabaco el que ocupa éste lugar. Es importante mencionar que en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, el crack tuvo una disminución notable, en el caso de de los tres primeros estados, de ser la tercera droga de preferencia pasó al cuarto lugar, y en Quintana Roo, de la primera posición se colocó en la tercera. Para éste último estado, el uso de alcohol, marihuana, inhalables y tabaco ha registrado aumentos.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Norcentral



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Coahuila



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Chihuahua



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Durango



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Noroccidental



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Baja California



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Baja California Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Sinaloa




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Centro Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Guerrero



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Michoacán



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Oaxaca



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Veracruz



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Campeche



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Chiapas




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE INICIO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Norcentral



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Coahuila



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Chihuahua



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Durango



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Noroccidental



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Baja California



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Baja California Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Sinaloa




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Estado de México



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Guanajuato



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Hidalgo



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Morelos




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Centro Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Guerrero



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Michoacán



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Oaxaca




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Quintana Roo



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Tabasco



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS DE DROGA DE IMPACTO PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Yucatán



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Norcentral



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Coahuila



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Chihuahua



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Durango



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Noroccidental



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Baja California



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Baja California Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Sinaloa



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Sonora



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Nororiental



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Nuevo León



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


San Luis Potosí



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Tamaulipas



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Occidental



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Aguascalientes



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Colima




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Estado de México



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Guanajuato



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Hidalgo



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Morelos




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"




Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.


"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Centro Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Guerrero



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Michoacán



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Oaxaca



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Veracruz



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Región Sur



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Campeche



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Chiapas



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Quintana Roo



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"


Tabasco



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

"TENDENCIAS EN EL CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ACUDE A CENTROS DE TRATAMIENTO"

Yucatán



Fuente: SISVEA -Centros de Tratamiento No Gubernamentales, 2000-2009.

ANEXO 2 Panorama Internacional del Consumo de Drogas

Metodología World Drug Report 2011

Diseño Muestral


Para estimar el nivel de uso de drogas a nivel mundial, se realizaron los siguientes pasos:

- Identificación de fuentes disponibles.
- Obtención de las cifras principales sobre el uso de drogas en todos los países con datos disponibles (prevalencia anual de consumo de drogas en población general entre 15 y 64 años)
- Estandarización de los datos existentes, en el caso de que estos referan población diferente a la usada por el *World Drug Report*
- Ajustes a los indicadores nacionales para estimar la prevalencia anual de aquellos países en los que estén disponibles prevalencias de consumo alguna vez en la vida y/o último mes.

100


Prevalencias de consumo de drogas en distintos países de Europa y su comparación con México 2008-2011

Prevalencia anual de consumo de marihuana. Población 15-64 años




102

Prevalencia anual de consumo de cocaína. Población 15-64 años




103

Prevalencia anual de consumo de anfetaminas. Población 15-64 años



104

Prevalencia anual de consumo de éxtasis. Población 15-64 años




105

Prevalencias de consumo de drogas en distintos países de América y su comparación con México 2008

Prevalencia anual de consumo de marihuana.


Población 15-64 años



107

Prevalencia anual de consumo de cocaína.


Población 15-64 años



108

Prevalencia anual de consumo de anfetaminas.


Población 15-64 años



109

Prevalencia anual de consumo de éxtasis.

Población 15-64 años



110

Bloque 1: Tendencias de los indicadores de la sección de drogas

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por sexo y grupos de edad:

Percepción de la población sobre los usuarios de drogas, incidencia acumulada del consumo de drogas, prevalencia del consumo de drogas en el último año y en el último mes, indicadores sociodemográficos y su relación con el consumo de drogas, exposición a la oportunidad de consumir marihuana y alguna otra droga, población de 12 a 17 años expuesta a la prevención, inyección de drogas, creencias sobre la evolución del consumo de drogas, consecuencias sociales y de salud del uso de drogas, mecanismos involucrados en la oportunidad de consumo, edad de inicio, factores sociodemográficos asociados con el uso de drogas, trayectorias del uso de drogas, necesidades de atención de la población por el consumo de drogas. Asimismo, se presenta la comparación de estos indicadores con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Percepción de los usuarios de drogas según sexo, población de 12 a 65 años

Cuadro TD1

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:												
Enferma	20 744 564	58.2	23 223 996	58.8	43 968 560	58.5	19 704 766	51.2	21 273 423	51.7	40 978 189	51.5
Débil	11 263 857	31.6	11 712 836	29.7	22 976 693	30.6	10 532 618	27.4	10 365 654	25.2	20 898 272	26.2
Independiente	3 813 908	10.7	3 576 854	9.1	7 390 762	9.8	3 081 747	8.0	2 822 104	6.9	5 903 851	7.4
Egoísta	4 708 911	13.2	5 214 642	13.2	9 923 553	13.2	3 879 281	10.1	4 047 264	9.8	7 926 545	10.0
Que necesita ayuda	20 745 550	58.2	24 615 185	62.3	45 360 735	60.4	23 806 138	61.8	27 051 535	65.8	50 857 674	63.9
Delincuente	7 040 719	19.8	7 337 873	18.6	14 378 592	19.1	6 421 743	16.7	6 418 734	15.6	12 840 477	16.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

Percepción de los usuarios de drogas según edad, población de 12 a 65 años

Cuadro TD2

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25		26-34		35-65		12-25		26-34		35-65	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:												
Enferma	15 848 585	54.7	9 390 136	59.9	18 729 839	61.5	13 269 166	44.6	8 262 453	53.7	19 446 570	56.4
Débil	8 753 263	30.2	4 707 593	30.0	9 515 837	31.2	7 037 635	23.7	4 350 589	28.3	9 510 048	27.6
Independiente	3 075 875	10.6	1 371 604	8.7	2 943 283	9.7	2 135 749	7.2	1 072 904	7.0	2 695 197	7.8
Egoísta	3 905 015	13.5	1 970 177	12.6	4 048 361	13.3	2 892 070	9.7	1 575 641	10.2	3 458 834	10.0
Que necesita ayuda	17 949 467	61.9	9 188 944	58.6	18 222 324	59.8	19 500 078	65.5	9 857 422	64.1	21 500 174	62.4
Delincuente	5 373 403	18.5	2 962 569	18.9	6 042 620	19.8	4 695 321	15.8	2 513 658	16.3	5 631 498	16.3

Porcentajes obtenidos según edad.

Percepción de los usuarios de drogas según edad, población masculina

Cuadro TD3

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25		26-34		35-65		12-25		26-34		35-65	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:												
Enferma	7 762 649	55.4	4 250 567	58.4	8 731 348	60.9	6 662 198	44.5	3 859 345	54.0	9 183 223	56.1
Débil	4 346 105	31.0	2 144 581	29.5	4 773 171	33.3	3 643 616	24.3	2 122 978	29.7	4 766 024	29.1
Independiente	1 579 898	11.3	722 049	9.9	1 511 961	10.5	1 183 004	7.9	581 176	8.1	1 317 567	8.0
Egoísta	1 898 869	13.6	873 347	12.0	1 936 695	13.5	1 537 580	10.3	701 789	9.8	1 639 912	10.0
Que necesita ayuda	8 091 494	57.8	4 202 457	57.7	8 451 599	58.9	9 421 616	62.9	4 436 109	62.1	9 948 414	60.7
Delincuente	2 826 752	20.2	1 370 488	18.8	2 843 479	19.8	2 722 384	18.2	1 096 040	15.3	2 603 318	15.9

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Percepción de los usuarios de drogas según edad, población femenina

Cuadro TD4

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25		26-34		35-65		12-25		26-34		35-65	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Un adicto es una persona:												
Enferma	8 085 936	54.0	5 139 569	61.1	9 998 491	62.0	6 606 969	44.7	4 403 108	53.4	10 263 347	56.7
Débil	4 407 158	29.4	2 563 012	30.5	4 742 666	29.4	3 394 018	23.0	2 227 611	27.0	4 744 025	26.2
Independiente	1 495 977	10.0	649 555	7.7	1 431 322	8.9	952 745	6.4	491 728	6.0	1 377 631	7.6
Egoísta	2 006 146	13.4	1 096 830	13.0	2 111 666	13.1	1 354 490	9.2	873 852	10.6	1 818 923	10.0
Que necesita ayuda	9 857 973	65.8	4 986 487	59.3	9 770 725	60.6	10 078 462	68.2	5 421 313	65.8	11 551 760	63.8
Delincuente	2 546 651	17.0	1 592 081	18.9	3 199 141	19.9	1 972 937	13.4	1 417 618	17.2	3 028 180	16.7

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Incidencia acumulada del consumo de cualquier droga en la población total

Cuadro TD5

Sexo/Edad	ENA 2008						ENA 2011					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	248 263	3.7	238 187	3.5	28 325	.4	275 103	4.0	267 150	3.9	19 657	.3
18-34	1 793 831	12.1	1 738 836	11.8	227 029	1.5	2 827 338	18.5	2 726 918	17.8	324 184	2.1
35-65	1 252 544	8.6	1 186 619	8.2	202 816	1.4	1 905 053	11.6	1 824 765	11.1	346 985	2.1
Subtotal	3 294 638	9.1	3 163 642	8.8	458 170	1.3	5 007 493	13.0	4 818 833	12.5	690 826	1.8
Mujeres												
12-17	142 238	2.1	110 984	1.6	38 996	.6	172 053	2.6	127 885	1.9	51 024	.8
18-34	526 556	3.3	451 759	2.8	112 431	.7	755 409	4.6	643 738	3.9	223 172	1.4
35-65	334 480	2.1	193 522	1.2	161 521	1.0	300 325	1.7	154 886	.9	148 732	.8
Subtotal	1 003 274	2.6	756 265	1.9	312 948	.8	1 227 788	3.0	926 509	2.3	422 928	1.0
Total	4 297 912	5.7	3 919 907	5.2	771 118	1.0	6 235 281	7.8	5 745 342	7.2	1 113 753	1.4

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Consumo en el último año de cualquier droga en la población total

Cuadro TD6

Sexo/Edad	ENA 2008						ENA 2011					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	145 078	2.1	140 274	2.1	10 486	.2	146 556	2.2	146 556	2.2	11 705	.2
18-34	508 598	3.4	494 613	3.3	66 620	.5	715 280	4.7	635 084	4.1	100 819	.7
35-65	243 631	1.7	206 246	1.4	53 638	.4	284 024	1.7	233 650	1.4	93 996	.6
Subtotal	897 307	2.5	841 133	2.3	130 744	.4	1 145 859	3.0	1 015 290	2.6	206 520	.5
Mujeres												
12-17	89 245	1.3	64 319	.9	27 256	.4	73 860	1.1	60 556	.9	13 303	.2
18-34	165 581	1.0	122 643	.8	47 400	.3	179 208	1.1	92 262	.6	99 294	.6
35-65	69 424	.4	23 498	.1	51 020	.3	53 855	.3	30 576	.2	24 025	.1
Subtotal	324 250	.8	210 460	.5	125 676	.3	306 923	.7	183 395	.4	136 623	.3
Total	1 221 557	1.6	1 051 593	1.4	256 420	.3	1 452 782	1.8	1 198 685	1.5	343 143	.4

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Consumo en el último mes de cualquier droga en la población total

Cuadro TD7

Sexo/Edad	ENA 2008						ENA 2011					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
12-17	77 469	1.1	76 383	1.1	1 366	***	104 822	1.5	102 919	1.5	8 194	.1
18-34	344 639	2.3	326 352	2.2	43 322	.3	395 830	2.6	344 449	2.2	63 615	.4
35-65	173 894	1.2	163 117	1.1	20 324	.1	167 911	1.0	145 614	.9	43 490	.3
Subtotal	596 002	1.7	565 852	1.6	65 012	.2	668 562	1.7	592 983	1.5	115 299	.3
Mujeres												
12-17	43 395	.6	33 771	.5	11 045	.2	19 398	.3	15 297	.2	4 100	.1
18-34	70 924	.4	60 286	.4	10 638	.1	59 957	.4	29 554	.2	30 403	.2
35-65	38 658	.2	15 650	.1	23 185	.1	13 721	.1	747	***	13 721	.1
Subtotal	152 977	.4	109 707	.3	44 868	.1	93 076	.2	45 598	.1	48 224	.1
Total	748 979	1.0	675 559	.9	109 880	.1	761 638	1.0	638 581	.8	163 523	.2

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Consumo de drogas y su relación con diversos indicadores sociodemográficos
población de 12 a 25 años**

Cuadro TD8

	ENA 2008						ENA 2011					
	Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas		Cualquier Droga		Drogas Ilegales		Drogas Médicas	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Situación Escolar												
Estudia actualmente	439 729	3.0	397 761	2.8	64 528	.4	659 989	4.2	577 605	3.7	125 080	.8
No estudia	1 066 586	7.2	1 014 361	6.8	151 550	1.0	1 598 834	11.4	1 498 936	10.7	198 392	1.4
Situación Laboral												
Trabaja	847 719	8.2	813 200	7.9	106 691	1.0	1 380 910	12.9	1 297 339	12.1	179 747	1.7
Ama de casa	113 685	2.7	94 564	2.2	29 964	.7	194 020	4.0	168 393	3.5	28 307	.6
Desempleado	544 911	3.7	504 358	3.4	79 423	.5	683 893	4.8	610 809	4.3	115 417	.8

Porcentajes de consumo de drogas según las variables sociodemográficas indicadas.

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TD9

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	36 093 396		39 031 641		75 125 037		38 507 813		41 113 398		79 621 211	
Opiáceos	50 058	.1	56 942	.1	107 000	.1	92 170	.2	49 520	.1	141 690	.2
Tranquilizantes	269 043	.7	164 924	.4	433 967	.6	461 325	1.2	255 386	.6	716 710	.9
Sedantes	88 633	.2	45 674	.1	134 307	.2	84 204	.2	47 553	.1	131 757	.2
Anfetaminas o estimulantes	158 704	.4	67 040	.2	225 744	.3	250 156	.6	125 844	.3	376 000	.5
Mariguana	2 594 353	7.2	552 443	1.4	3 146 796	4.2	4 080 083	10.6	671 902	1.6	4 751 985	6.0
Cocaína**	1 496 144	4.1	282 153	.7	1 778 297	2.4	2 288 314	5.9	302 216	.7	2 590 530	3.3
Crack	370 825	1.0	75 995	.2	446 820	.6	752 870	2.0	55 302	.1	808 172	1.0
Alucinógenos	211 321	.6	54 403	.1	265 724	.4	435 235	1.1	120 697	.3	555 932	.7
Inhalables	460 718	1.3	73 079	.2	533 797	.7	595 632	1.5	131 494	.3	727 126	.9
Heroína opio	97 222	.3	9 717	***	106 939	.1	173 276	.4	5 404	***	178 680	.2
Estimulantes tipo anfetamínico	286 203	.8	81 433	.2	367 636	.5	482 653	1.3	168 717	.4	651 371	.8
Otras drogas	35 919	.1	11 702	***	47 621	.1	--	--	2 141	***	2 141	***
Cualquier droga	3 294 638	9.1	1 003 274	2.6	4 297 912	5.7	5 007 493	13.0	1 227 788	3.0	6 235 281	7.8
Drogas ilegales	3 163 642	8.8	756 265	1.9	3 919 907	5.2	4 818 833	12.5	926 509	2.3	5 745 342	7.2
Drogas médicas	458 170	1.3	312 948	.8	771 118	1.0	690 826	1.8	422 928	1.0	1 113 753	1.4

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo.

**Cocaína también incluye crack

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD9A

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	29 299 280		15 309 314		30 516 443		29 754 276		15 388 877		34 478 059	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	47 136	.2	16 811	.1	43 053	.1	65 599	.2	11 737	.1	64 354	.2
Tranquilizantes	124 111	.4	110 386	.7	199 470	.7	172 782	.6	240 404	1.6	303 524	.9
Sedantes	57 563	.2	34 797	.2	41 947	.1	58 525	.2	9 581	.1	63 651	.2
Anfetaminas o estimulantes	44 404	.2	59 095	.4	122 245	.4	85 754	.3	120 968	.8	169 278	.5
Mariguana	1 107 349	3.8	882 143	5.8	1 157 304	3.8	1 749 808	5.9	1 338 613	8.7	1 663 564	4.8
Cocaína**	646 013	2.2	584 050	3.8	548 234	1.8	793 175	2.7	947 925	6.2	849 429	2.5
Crack	216 229	.7	130 048	.8	100 543	.3	252 220	.8	352 048	2.3	203 905	.6
Alucinógenos	75 706	.3	100 441	.7	89 577	.3	203 909	.7	226 147	1.5	125 877	.4
Inhalables	207 913	.7	160 410	1.0	165 474	.5	328 504	1.1	212 536	1.4	186 086	.5
Heroína opio	31 222	.1	38 972	.3	36 745	.1	21 460	.1	80 961	.5	76 259	.2
Estimulantes tipo anfetamínico	166 246	.6	124 417	.8	76 973	.3	282 235	.9	234 571	1.5	134 564	.4
Otras drogas	17 427	.1	16 404	.1	13 790	***	2 141	***	--	--	--	--
Cualquier droga	1 506 315	5.1	1 204 573	7.9	1 587 024	5.2	2 258 824	7.6	1 771 079	11.5	2 205 378	6.4
Drogas ilegales	1 412 122	4.8	1 127 644	7.4	1 380 141	4.5	2 076 541	7.0	1 689 150	11.0	1 979 651	5.7
Drogas médicas	216 078	.7	190 703	1.2	364 337	1.2	323 472	1.1	294 565	1.9	495 716	1.4

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD9B

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	14 375 165		7 172 812		14 545 419		14 981 318		7 148 067		16 378 428	
Opiáceos	15 328	.1	15 098	.2	19 632	.1	30 706	.2	9 907	.1	51 557	.3
Tranquilizantes	81 049	.6	81 308	1.1	106 686	.7	70 636	.5	158 506	2.2	232 183	1.4
Sedantes	43 352	.3	21 438	.3	23 843	.2	14 600	.1	6 600	.1	63 004	.4
Anfetaminas o estimulantes	27 735	.2	43 894	.6	87 075	.6	54 865	.4	103 331	1.4	91 960	.6
Mariguana	874 456	6.1	719 866	10.0	1 000 031	6.9	1 361 082	9.1	1 174 145	16.4	1 544 857	9.4
Cocaína**	491 849	3.4	519 624	7.2	484 671	3.3	663 579	4.4	832 858	11.7	791 876	4.8
Crack	161 026	1.1	116 076	1.6	93 723	.6	222 040	1.5	330 259	4.6	200 571	1.2
Alucinógenos	64 402	.4	71 023	1.0	75 896	.5	119 388	.8	192 933	2.7	122 915	.8
Inhalables	172 137	1.2	143 515	2.0	145 066	1.0	222 581	1.5	201 027	2.8	172 025	1.1
Heroína opio	28 074	.2	37 694	.5	31 454	.2	16 638	.1	80 379	1.1	76 259	.5
Estimulantes tipo anfetamínico	112 916	.8	106 873	1.5	66 414	.5	204 124	1.4	167 303	2.3	111 226	.7
Otras drogas	10 873	.1	11 256	.2	13 790	.1	--	--	--	--	--	--
Cualquier droga	1 096 253	7.6	945 841	13.2	1 252 544	8.6	1 683 070	11.2	1 419 370	19.9	1 905 053	11.6
Drogas ilegales	1 067 164	7.4	909 859	12.7	1 186 619	8.2	1 599 774	10.7	1 394 294	19.5	1 824 765	11.1
Drogas médicas	122 840	.9	132 514	1.8	202 816	1.4	151 792	1.0	192 049	2.7	346 985	2.1

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD9C

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	14 924 115		8 136 502		15 971 024		14 772 957		8 240 810		18 099 630	
Opiáceos	31 808	.2	1 713	***	23 421	.1	34 894	.2	1 829	***	12 797	.1
Tranquilizantes	43 062	.3	29 078	.4	92 784	.6	102 146	.7	81 899	1.0	71 341	.4
Sedantes	14 211	.1	13 359	.2	18 104	.1	43 926	.3	2 981	***	646	***
Anfetaminas o estimulantes	16 669	.1	15 201	.2	35 170	.2	30 889	.2	17 637	.2	77 318	.4
Mariguana	232 893	1.6	162 277	2.0	157 273	1.0	388 726	2.6	164 469	2.0	118 707	.7
Cocaína**	154 164	1.0	64 426	.8	63 563	.4	129 596	.9	115 067	1.4	57 553	.3
Crack	55 203	.4	13 972	.2	6 820	***	30 180	.2	21 789	.3	3 334	***
Alucinógenos	11 304	.1	29 418	.4	13 681	.1	84 520	.6	33 214	.4	2 962	***
Inhalables	35 776	.2	16 895	.2	20 408	.1	105 924	.7	11 509	.1	14 061	.1
Heroína opio	3 148	***	1 278	***	5 291	***	4 822	***	582	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	53 330	.4	17 544	.2	10 559	.1	78 111	.5	67 269	.8	23 338	.1
Otras drogas	6 554	***	5 148	.1	--	--	2 141	***	--	--	--	--
Cualquier droga	410 062	2.7	258 732	3.2	334 480	2.1	575 753	3.9	351 709	4.3	300 325	1.7
Drogas ilegales	344 958	2.3	217 785	2.7	193 522	1.2	476 767	3.2	294 856	3.6	154 886	.9
Drogas médicas	93 238	.6	58 189	.7	161 521	1.0	171 679	1.2	102 516	1.2	148 732	.8

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD9D

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	16 426	.1	47 521	.2	43 053	.1	13 834	.1	63 502	.2	64 354	.2
Tranquilizantes	41 695	.3	192 802	.6	199 470	.7	58 252	.4	354 935	1.1	303 524	.9
Sedantes	12 791	.1	79 569	.3	41 947	.1	7 696	.1	60 411	.2	63 651	.2
Anfetaminas o estimulantes	9 972	.1	93 527	.3	122 245	.4	4 085	***	202 637	.6	169 278	.5
Mariguana	278 802	2.0	1 710 690	5.5	1 157 304	3.8	322 596	2.4	2 765 825	8.7	1 663 564	4.8
Cocaína**	112 407	.8	1 117 656	3.6	548 234	1.8	98 200	.7	1 642 901	5.2	849 429	2.5
Crack	30 445	.2	315 832	1.0	100 543	.3	14 954	.1	589 314	1.9	203 905	.6
Alucinógenos	17 690	.1	158 457	.5	89 577	.3	15 989	.1	414 066	1.3	125 877	.4
Inhalables	66 814	.5	301 509	1.0	165 474	.5	125 657	.9	415 383	1.3	186 086	.5
Heroína opio	10 297	.1	59 897	.2	36 745	.1	2 680	***	99 740	.3	76 259	.2
Estimulantes tipo anfetamínico	47 591	.3	243 072	.8	76 973	.3	38 484	.3	478 322	1.5	134 564	.4
Otras drogas	4 902	***	28 929	.1	13 790	***	--	--	2 141	***	--	--
Cualquier droga	390 501	2.9	2 320 387	7.5	1 587 024	5.2	447 156	3.3	3 582 747	11.3	2 205 378	6.4
Drogas ilegales	349 171	2.6	2 190 595	7.1	1 380 141	4.5	395 035	2.9	3 370 656	10.6	1 979 651	5.7
Drogas médicas	67 321	.5	339 460	1.1	364 337	1.2	70 682	.5	547 356	1.7	495 716	1.4

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TD9E

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	6 765 265		14 782 712		14 545 419		6 807 478		15 321 907		16 378 428	
Opiáceos	2 644	***	27 782	.2	19 632	.1	3 041	***	37 571	.2	51 557	.3
Tranquilizantes	17 356	.3	145 001	1.0	106 686	.7	16 616	.2	212 526	1.4	232 183	1.4
Sedantes	7 964	.1	56 826	.4	23 843	.2	6 292	.1	14 908	.1	63 004	.4
Anfetaminas o estimulantes	6 482	.1	65 147	.4	87 075	.6	--	--	158 196	1.0	91 960	.6
Mariguana	194 646	2.9	1 399 676	9.5	1 000 031	6.9	236 114	3.5	2 299 113	15.0	1 544 857	9.4
Cocaína**	81 915	1.2	929 558	6.3	484 671	3.3	51 643	.8	1 444 795	9.4	791 876	4.8
Crack	19 346	.3	257 756	1.7	93 723	.6	11 387	.2	540 911	3.5	200 571	1.2
Alucinógenos	11 691	.2	123 734	.8	75 896	.5	5 283	.1	307 038	2.0	122 915	.8
Inhalables	46 724	.7	268 928	1.8	145 066	1.0	72 356	1.1	351 252	2.3	172 025	1.1
Heroína opio	7 873	.1	57 895	.4	31 454	.2	--	--	97 017	.6	76 259	.5
Estimulantes tipo anfetamínico	29 221	.4	190 568	1.3	66 414	.5	21 543	.3	349 883	2.3	111 226	.7
Otras drogas	3 689	.1	18 440	.1	13 790	.1	--	--	--	--	--	--
Cualquier droga	248 263	3.7	1 793 831	12.1	1 252 544	8.6	275 103	4.0	2 827 338	18.5	1 905 053	11.6
Drogas ilegales	238 187	3.5	1 738 836	11.8	1 186 619	8.2	267 150	3.9	2 726 918	17.8	1 824 765	11.1
Drogas médicas	28 325	.4	227 029	1.5	202 816	1.4	19 657	.3	324 184	2.1	346 985	2.1

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población masculina según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Incidencia acumulada del consumo de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TD9F

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	6 903 019		16 157 598		15 971 024		6 630 096		16 383 671		18 099 630	
Opiáceos	13 782	.2	19 739	.1	23 421	.1	10 793	.2	25 930	.2	12 797	.1
Tranquilizantes	24 339	.4	47 801	.3	92 784	.6	41 636	.6	142 408	.9	71 341	.4
Sedantes	4 827	.1	22 743	.1	18 104	.1	1 404	***	45 503	.3	646	***
Anfetaminas o estimulantes	3 490	.1	28 380	.2	35 170	.2	4 085	.1	44 441	.3	77 318	.4
Mariguana	84 156	1.2	311 014	1.9	157 273	1.0	86 483	1.3	466 712	2.8	118 707	.7
Cocaína**	30 492	.4	188 098	1.2	63 563	.4	46 557	.7	198 106	1.2	57 553	.3
Crack	11 099	.2	58 076	.4	6 820	***	3 567	.1	48 402	.3	3 334	***
Alucinógenos	5 999	.1	34 723	.2	13 681	.1	10 706	.2	107 028	.7	2 962	***
Inhalables	20 090	.3	32 581	.2	20 408	.1	53 301	.8	64 131	.4	14 061	.1
Heroína opio	2 424	***	2 002	***	5 291	***	2 680	***	2 723	***	--	--
Estimulantes tipo anfetamínico	18 370	.3	52 504	.3	10 559	.1	16 941	.3	128 439	.8	23 338	.1
Otras drogas	1 213	***	10 489	.1	--	--	--	--	2 141	***	--	--
Cualquier droga	142 238	2.1	526 556	3.3	334 480	2.1	172 053	2.6	755 409	4.6	300 325	1.7
Drogas ilegales	110 984	1.6	451 759	2.8	193 522	1.2	127 885	1.9	643 738	3.9	154 886	.9
Drogas médicas	38 996	.6	112 431	.7	161 521	1.0	51 024	.8	223 172	1.4	148 732	.8

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos de la población femenina según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TD10

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
Drogas	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	10 560	***	33 739	.1	44 299	.1	--	--	4 769	***	4 769	***
Tranquilizantes	57 794	.2	58 627	.2	116 421	.2	118 642	.3	93 336	.2	211 978	.3
Sedantes	33 263	.1	16 256	***	49 519	.1	15 022	***	15 329	***	30 351	***
Anfetaminas o estimulantes	45 673	.1	22 506	.1	68 179	.1	75 057	.2	29 584	.1	104 641	.1
Mariguana	623 814	1.7	147 794	.4	771 608	1.0	842 039	2.2	120 421	.3	962 460	1.2
Cocaína**	274 843	.8	55 522	.1	330 365	.4	355 654	.9	40 252	.1	395 906	.5
Crack	83 285	.2	12 490	***	95 775	.1	83 586	.2	6 388	***	89 974	.1
Alucinógenos	30 983	.1	8 340	***	39 323	.1	53 812	.1	8 025	***	61 838	.1
Inhalables	75 059	.2	18 134	***	93 193	.1	77 369	.2	19 361	***	96 730	.1
Heroína opio	27 072	.1	4 712	***	31 784	***	10 694	***	--	--	10 694	***
Estimulantes tipo anfetamínico	59 165	.2	21 720	.1	80 885	.1	86 386	.2	33 451	.1	119 837	.2
Otras drogas	6 248	***	--	--	6 248	***	--	--	--	--	--	--
Cualquier droga	897 307	2.5	324 250	.8	1 221 557	1.6	1 145 859	3.0	306 923	.7	1 452 782	1.8
Drogas ilegales	841 133	2.3	210 460	.5	1 051 593	1.4	1 015 290	2.6	183 395	.4	1 198 685	1.5
Drogas médicas	130 744	.4	125 676	.3	256 420	.3	206 520	.5	136 623	.3	343 143	.4

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según sexo.

**Cocaína también incluye crack

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD10A

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	29 299 280		15 309 314		30 516 443		29 754 276		15 388 877		34 478 059	
Opiáceos	27 775	.1	1 131	***	15 393	.1	4 769	***	--	--	--	--
Tranquilizantes	39 352	.1	15 276	.1	61 793	.2	79 151	.3	49 471	.3	83 356	.2
Sedantes	23 496	.1	11 455	.1	14 568	***	12 887	***	2 981	***	14 482	***
Anfetaminas o estimulantes	29 894	.1	19 917	.1	18 368	.1	57 513	.2	19 294	.1	27 834	.1
Mariguana	441 679	1.5	153 105	1.0	176 824	.6	590 079	2.0	177 403	1.2	194 978	.6
Cocaína**	176 003	.6	96 669	.6	57 693	.2	213 647	.7	90 929	.6	91 330	.3
Crack	65 367	.2	15 423	.1	14 985	***	49 112	.2	24 436	.2	16 426	***
Alucinógenos	15 942	.1	15 105	.1	8 276	***	59 829	.2	--	--	2 009	***
Inhalables	51 585	.2	12 239	.1	29 369	.1	87 186	.3	3 050	***	6 495	***
Heroína opio	13 172	***	1 482	***	17 130	.1	4 861	***	--	--	5 833	***
Estimulantes tipo anfetamínico	49 187	.2	17 658	.1	14 040	***	64 898	.2	9 640	.1	45 299	.1
Otras drogas	2 550	***	--	--	3 698	***	--	--	--	--	--	--
Cualquier droga	647 688	2.2	260 814	1.7	313 055	1.0	815 621	2.7	299 282	1.9	337 878	1.0
Drogas ilegales	590 211	2.0	231 638	1.5	229 744	.8	701 866	2.4	232 593	1.5	264 226	.8
Drogas médicas	104 120	.4	47 642	.3	104 658	.3	153 375	.5	71 746	.5	118 021	.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TD10B

N por subgrupo Drogas	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opiáceos	11 900	.1	17 006	.1	15 393	.1	4 769	***	--	--	--	--
Tranquilizantes	24 925	.2	29 703	.1	61 793	.2	18 835	.1	109 787	.3	83 356	.2
Sedantes	670	***	34 281	.1	14 568	***	--	--	15 868	.1	14 482	***
Anfetaminas o estimulantes	4 263	***	45 548	.1	18 368	.1	1 404	***	75 403	.2	27 834	.1
Mariguana	160 934	1.2	433 850	1.4	176 824	.6	178 096	1.3	589 387	1.9	194 978	.6
Cocaína**	48 333	.4	224 339	.7	57 693	.2	53 833	.4	250 743	.8	91 330	.3
Crack	16 870	.1	63 920	.2	14 985	***	--	--	73 548	.2	16 426	***
Alucinógenos	5 114	***	25 933	.1	8 276	***	11 468	.1	48 361	.2	2 009	***
Inhalables	28 758	.2	35 066	.1	29 369	.1	44 615	.3	45 620	.1	6 495	***
Heroína opio	4 886	***	9 768	***	17 130	.1	--	--	4 861	***	5 833	***
Estimulantes tipo anfetamínico	20 085	.1	46 760	.2	14 040	***	14 732	.1	59 805	.2	45 299	.1
Otras drogas	--	--	2 550	***	3 698	***	--	--	--	--	--	--
Cualquier droga	234 323	1.7	674 179	2.2	313 055	1.0	220 416	1.6	894 488	2.8	337 878	1.0
Drogas ilegales	204 593	1.5	617 256	2.0	229 744	.8	207 113	1.5	727 346	2.3	264 226	.8
Drogas médicas	37 742	.3	114 020	.4	104 658	.3	25 008	.2	200 113	.6	118 021	.3

Porcentajes del consumo de sustancias obtenidos según edad.

**Cocaína también incluye crack.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD11

Sexo/Edad	ENA 2008				ENA 2011			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-17	822 454	12.2	328 659	4.9	1 329 561	19.5	550 464	8.1
18-34	5 036 271	34.1	1 980 578	13.4	6 660 964	43.5	2 800 340	18.3
35-65	3 987 669	27.4	1 436 843	9.9	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4
Subtotal	9 846 394	27.3	3 746 080	10.4	13 441 813	34.9	5 223 197	13.6
Mujeres								
12-17	411 501	6.0	141 974	2.1	796 894	12.0	211 318	3.2
18-34	1 489 335	9.2	527 790	3.3	2 080 602	12.7	558 342	3.4
35-65	742 599	4.6	242 775	1.5	672 641	3.7	120 695	.7
Subtotal	2 643 435	6.8	912 539	2.3	3 550 137	8.6	890 355	2.2
Total	12 489 829	16.6	4 658 619	6.2	16 991 950	21.3	6 113 552	7.7

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido marihuana regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD12

Sexo/Edad	ENA 2008				ENA 2011			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-25	3 305 923	23.0	1 346 512	9.4	4 994 872	33.3	2 133 507	14.2
26-34	2 552 802	35.6	962 725	13.4	2 995 653	41.9	1 217 297	17.0
35-65	3 987 669	27.4	1 436 843	9.9	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4
Subtotal	9 846 394	27.3	3 746 080	10.4	13 441 813	34.9	5 223 197	13.6
Mujeres								
12-25	1 288 023	8.6	468 536	3.1	2 143 319	14.5	576 149	3.9
26-34	612 813	7.5	201 228	2.5	734 178	8.9	193 511	2.3
35-65	742 599	4.6	242 775	1.5	672 641	3.7	120 695	.7
Subtotal	2 643 435	6.8	912 539	2.3	3 550 137	8.6	890 355	2.2
Total	12 489 829	16.6	4 658 619	6.2	16 991 950	21.3	6 113 552	7.7

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD13

Sexo/Edad	ENA 2008				ENA 2011			
	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada		Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-17	882 388	13.0	375 125	5.5	1 440 008	21.2	632 331	9.3
18-34	5 278 085	35.7	2 193 583	14.8	7 105 620	46.4	3 105 624	20.3
35-65	4 170 734	28.7	1 565 628	10.8	5 728 205	35.0	2 152 401	13.1
Subtotal	10 331 207	28.6	4 134 336	11.5	14 273 833	37.1	5 890 356	15.3
Mujeres								
12-17	474 717	6.9	161 394	2.3	846 317	12.8	232 214	3.5
18-34	1 709 673	10.6	601 301	3.7	2 415 836	14.7	699 169	4.3
35-65	789 123	4.9	268 988	1.7	744 447	4.1	139 970	.8
Subtotal	2 973 513	7.6	1 031 683	2.6	4 006 600	9.7	1 071 354	2.6
Total	13 304 720	17.7	5 166 019	6.9	18 280 433	23.0	6 961 710	8.7

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Población de 12 a 65 años que le han ofrecido alguna droga regalada o comprada
según sexo y edad**

Cuadro TD14

Sexo/Edad	ENA 2008				ENA 2011			
	Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada		Cualquier droga regalada		Cualquier droga comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres								
12-25	3 471 920	24.2	1 483 586	10.3	5 273 577	35.2	2 333 456	15.6
26-34	2 688 553	37.5	1 085 122	15.1	3 272 052	45.8	1 404 499	19.6
35-65	4 170 734	28.7	1 565 628	10.8	5 728 205	35.0	2 152 401	13.1
Subtotal	10 331 207	28.6	4 134 336	11.5	14 273 833	37.1	5 890 356	15.3
Mujeres								
12-25	1 488 069	10.0	533 608	3.6	2 401 734	16.3	689 282	4.7
26-34	696 321	8.6	229 087	2.8	860 420	10.4	242 101	2.9
35-65	789 123	4.9	268 988	1.7	744 447	4.1	139 970	.8
Subtotal	2 973 513	7.6	1 031 683	2.6	4 006 600	9.7	1 071 354	2.6
Total	13 304 720	17.7	5 166 019	6.9	18 280 433	23.0	6 961 710	8.7

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Exposición a drogas por características sociodemográficas, población de 12 a 17 años

Cuadro TD15

Características sociodemográficas	ENA 2008				ENA 2011			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	822 454	12.2	328 659	4.9	1 329 561	19.5	550 464	8.1
Mujeres	411 501	6.0	141 974	2.1	796 894	12.0	211 318	3.2
Situación Escolar								
Estudiante	825 882	7.6	311 480	2.9	1 533 019	14.0	557 179	5.1
No estudiante	408 073	14.5	159 153	5.7	593 436	23.8	204 603	8.2
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	157 909	4.1	57 950	1.5	191 512	6.1	56 881	1.8
Secundaria	668 613	9.1	267 063	3.7	1 131 974	14.9	352 504	4.6
Bachillerato o Equivalente	397 666	16.3	141 284	5.8	802 969	30.1	352 397	13.2

Porcentajes obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Exposición a drogas por características sociodemográficas, población de 18 a 25 años

Cuadro TD16

Características sociodemográficas	ENA 2008				ENA 2011			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	2 483 469	32.6	1 017 853	13.4	3 665 311	44.8	1 583 043	19.4
Mujeres	876 522	10.9	326 562	4.1	1 346 425	16.5	364 831	4.5
Situación Escolar								
Estudiante	935 714	26.0	363 369	10.1	1 621 060	34.2	710 113	15.0
No estudiante	2 424 277	20.1	981 046	8.2	3 390 676	29.3	1 237 761	10.7
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	408 737	15.2	172 226	6.4	316 045	17.7	102 438	5.7
Secundaria	1 033 327	20.2	458 399	9.0	1 365 060	27.7	597 498	12.1
Bachillerato o Equivalente	1 252 112	23.7	452 152	8.6	2 183 447	35.1	831 841	13.4
Licenciatura	648 539	25.9	256 585	10.3	1 127 556	34.8	406 223	12.5
Posgrado	8 190	21.2	2 135	5.5	9 874	21.5	9 874	21.5
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	2 197 159	26.2	903 124	10.8	3 239 691	38.7	1 360 623	16.3
Ama de casa	255 178	7.5	95 620	2.8	476 355	12.5	107 111	2.8
Desempleado	907 654	23.6	345 671	9.0	1 295 689	31.3	480 140	11.6
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 081 120	15.6	491 820	7.1	1 618 552	24.1	560 106	8.4
De 3 a 6 salarios mínimos	1 517 675	25.8	590 390	10.0	1 962 893	36.3	742 648	13.7
Más de 6 salarios mínimos	435 258	36.9	133 541	11.3	356 496	50.3	231 977	32.7

Porcentajes obtenidos para cada grupo sociodemográfico.

Exposición a drogas por características sociodemográficas, población de 26 a 34 años

Cuadro TD17

Características sociodemográficas	ENA 2008				ENA 2011			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	2 552 802	35.6	962 725	13.4	2 995 653	41.9	1 217 297	17.0
Mujeres	612 813	7.5	201 228	2.5	734 178	8.9	193 511	2.3
Situación Escolar								
Estudiante	124 029	23.7	28 797	5.5	188 412	25.9	40 898	5.6
No estudiante	3 041 586	20.6	1 135 156	7.7	3 541 419	24.2	1 369 909	9.3
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	649 401	14.7	228 024	5.2	645 558	20.8	264 025	8.5
Secundaria	1 106 624	21.4	432 768	8.4	1 379 941	25.5	437 267	8.1
Bachillerato o Equivalente	800 080	23.9	287 163	8.6	970 686	25.8	391 675	10.4
Licenciatura	528 840	24.2	183 415	8.4	688 262	25.7	298 800	11.2
Posgrado	50 366	37.1	21 608	15.9	37 990	13.8	18 145	6.6
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	2 707 590	25.8	970 013	9.3	3 107 306	31.7	1 189 533	12.1
Ama de casa	231 343	5.6	96 901	2.3	316 807	6.8	87 896	1.9
Desempleado	226 682	33.6	97 039	14.4	305 718	33.0	133 379	14.4
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 122 133	16.3	413 271	6.0	1 325 979	20.5	486 409	7.5
De 3 a 6 salarios mínimos	1 420 574	24.0	517 828	8.7	1 432 059	27.2	549 392	10.4
Más de 6 salarios mínimos	400 559	29.9	155 333	11.6	371 926	41.5	152 997	17.1
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	2 130 688	19.4	796 252	7.3	2 406 946	22.2	785 986	7.3
Separado/Viudo/Divorciado	111 243	15.1	30 526	4.1	166 126	23.1	84 366	11.7
Soltero	923 684	25.7	337 175	9.4	1 156 759	30.2	540 455	14.1

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo.

Exposición a drogas por características sociodemográficas, población de 35 a 65 años

Cuadro TD18

Características sociodemográficas	ENA 2008				ENA 2011			
	Mariguana regalada		Mariguana comprada		Mariguana regalada		Mariguana comprada	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo								
Hombres	3 987 669	27.4	1 436 843	9.9	5 451 288	33.3	1 872 394	11.4
Mujeres	742 599	4.6	242 775	1.5	672 641	3.7	120 695	.7
Situación Escolar								
Estudiante	127 149	26.7	52 350	11.0	189 963	24.7	49 045	6.4
No estudiante	4 603 119	15.3	1 627 268	5.4	5 933 966	17.6	1 944 043	5.8
Nivel de Escolaridad								
Ninguna/Primaria	1 705 716	11.2	537 851	3.5	1 907 872	14.8	634 345	4.9
Secundaria	1 314 861	17.3	542 343	7.1	1 795 378	19.4	498 249	5.4
Bachillerato o Equivalente	934 147	22.7	377 439	9.2	1 200 947	21.8	447 789	8.1
Licenciatura	702 016	22.1	195 208	6.2	930 474	20.5	333 351	7.4
Posgrado	57 967	21.5	16 892	6.3	134 164	18.8	33 786	4.7
Situación Laboral								
Trabaja actualmente	4 041 977	20.7	1 427 633	7.3	5 267 721	25.1	1 766 590	8.4
Ama de casa	271 339	3.1	88 372	1.0	217 517	2.1	37 720	.4
Desempleado	416 952	18.5	163 613	7.2	638 691	21.7	188 779	6.4
Nivel de Ingresos								
Hasta 2 salarios mínimos	1 687 613	11.7	497 086	3.4	2 158 408	14.1	742 480	4.9
De 3 a 6 salarios mínimos	2 025 686	18.6	793 107	7.3	2 657 135	22.9	841 431	7.3
Más de 6 salarios mínimos	611 808	24.4	249 720	10.0	546 064	26.4	202 989	9.8
Estado Civil								
Casado/Unión Libre	3 768 520	15.6	1 302 653	5.4	4 928 402	18.2	1 510 305	5.6
Separado/Viudo/Divorciado	444 261	12.9	164 750	4.8	597 006	15.9	179 328	4.8
Soltero	517 487	17.7	212 215	7.3	598 521	16.8	303 456	8.5

Porcentajes de exposición a drogas obtenidos para cada grupo.

Población de 12 a 17 años que ha sido expuesta a la prevención

Cuadro TD19

Sexo/Edad	ENA 2008 12 a 17 años						ENA 2011 12 a 17 años					
	Usuario experimental		Usuario regular		No usuario		Usuario experimental		Usuario regular		No usuario	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombres												
Con prevención	72 391	2.1	30 693	.9	3 309 718	97.0	107 864	2.5	37 303	.9	4 219 139	96.7
Sin prevención	80 727	2.4	64 452	1.9	3 207 284	95.7	73 810	3.0	56 126	2.3	2 313 236	94.7
Mujeres												
Con prevención	46 678	1.2	16 275	.4	3 939 764	98.4	66 390	1.4	8 945	.2	4 592 655	98.4
Sin prevención	43 544	1.5	35 741	1.2	2 821 017	97.3	78 874	4.0	17 845	.9	1 865 388	95.1
Total												
Con prevención	119 069	1.6	46 968	.6	7 249 482	97.8	174 254	1.9	46 248	.5	8 811 794	97.6
Sin prevención	124 271	2.0	100 193	1.6	6 028 301	96.4	152 683	3.5	73 971	1.7	4 178 625	94.9

Porcentajes obtenidos según sexo y exposición a la prevención.

Usuarios de 12 a 65 años que se ha inyectado algún tipo de droga ilegal según sexo

Cuadro TD20

Sexo/Edad	ENA 2008		ENA 2011	
	N	%	N	%
Hombres				
12-25	42 066	3.9	7 119	.4
26-34	25 476	2.8	77 637	5.6
35-65	31 450	2.7	48 911	2.7
Subtotal	98 992	3.1	133 667	2.8
Mujeres				
12-25	16 550	4.8	29 908	6.3
26-34	4 827	2.2	582	.2
35-65	8 260	4.3	--	--
Subtotal	29 637	3.9	30 490	3.3
Total	128 629	3.3	164 157	2.9

Porcentajes obtenidos de la población que usa drogas ilegales según sexo y edad.

**Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según sexo
población de 12 a 65 años**

Cuadro TD21

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	25 480 914	71.5	26 726 180	67.7	52 207 094	69.5	26 549 152	68.9	27 290 290	66.4	53 839 442	67.6
Sigue igual	7 919 294	22.2	10 371 172	26.3	18 290 466	24.3	8 126 462	21.1	10 174 158	24.7	18 300 620	23.0
Parece que va disminuyendo	2 223 560	6.2	2 403 992	6.1	4 627 552	6.2	3 832 199	10.0	3 648 950	8.9	7 481 149	9.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción sobre la evolución del consumo de drogas según edad
población de 12 a 65 años**

Cuadro TD22

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Creencias sobre la evolución del consumo de las drogas												
Ha incrementado el número de usuarios	19 327 940	66.7	11 194 109	71.4	21 685 045	71.2	19 170 686	64.4	10 410 676	67.7	24 258 080	70.4
Sigue igual	7 804 977	26.9	3 729 122	23.8	6 756 367	22.2	7 410 670	24.9	3 681 778	23.9	7 208 172	20.9
Parece que va disminuyendo	1 852 166	6.4	764 743	4.9	2 010 643	6.6	3 172 920	10.7	1 296 423	8.4	3 011 806	8.7

Porcentajes obtenidos según edad.

Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según sexo

Cuadro TD23

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:												
La violencia familiar y social	30 255 340	84.9	34 269 539	86.8	64 524 879	85.9	33 940 400	88.1	36 868 633	89.7	70 809 032	88.9
Los accidentes	30 546 645	85.7	34 323 634	86.9	64 870 279	86.3	34 382 310	89.3	36 552 393	88.9	70 934 704	89.1
Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA	30 983 312	87.0	35 258 562	89.3	66 241 874	88.2	35 585 240	92.4	38 667 289	94.1	74 252 529	93.3
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	25 770 511	72.3	27 846 887	70.5	53 617 398	71.4	31 563 893	82.0	33 296 148	81.0	64 860 042	81.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

Percepción de las consecuencias sociales y de salud del consumo de drogas y VIH según edad

Cuadro TD24

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
El consumo de drogas ilegales tiene relación con:												
La violencia familiar y social	24 486 595	84.5	13 710 163	87.4	26 328 121	86.5	25 506 843	85.7	13 922 372	90.5	31 379 818	91.0
Los accidentes	24 745 022	85.4	13 578 183	86.6	26 547 074	87.2	26 158 199	87.9	13 749 524	89.3	31 026 981	90.0
Si una persona se inyecta con una aguja usada puede adquirir el VIH/SIDA	25 670 799	88.6	14 051 018	89.6	26 520 057	87.1	27 719 570	93.2	14 497 130	94.2	32 035 830	92.9
Una persona que se ve sana puede estar infectada de VIH/SIDA	20 515 169	70.8	11 526 087	73.5	21 576 142	70.9	23 927 301	80.4	12 910 728	83.9	28 022 012	81.3

Porcentajes obtenidos según edad.

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas

Cuadro TD25

	ENA 2008				ENA 2011			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
N por subgrupo	29 299 280	15 309 314	30 516 443	75 125 037	29 754 276	15 388 877	34 478 059	79 621 211
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	82.1	77.1	83.0	81.5	72.7	71.9	80.2	75.8
Mariguana regalada	7.4	9.6	8.5	8.3	11.0	10.9	9.4	10.3
Otra droga regalada	1.0	1.0	.5	.8	1.4	2.1	.8	1.3
Mariguana comprada	2.7	2.7	2.6	2.7	4.7	2.7	2.9	3.5
Otra droga comprada	.4	.5	.2	.4	.6	.9	.6	.6
Mariguana y otra droga regalada	4.5	6.6	3.8	4.6	7.9	7.7	4.8	6.5
Mariguana y otra droga comprada	.6	.6	.4	.5	.5	1.0	.4	.6
Mariguana y otra droga regalada y comprada	1.2	2.0	.9	1.3	1.2	2.9	.9	1.4

Porcentajes obtenidos según edad.

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas, población masculina

Cuadro TD26

	ENA 2008				ENA 2011			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
N por subgrupo	14 375 165	7 172 812	14 545 419	36 093 396	14 981 318	7 148 067	16 378 428	38 507 813
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	74.6	61.0	70.1	70.1	62.5	52.1	63.2	60.9
Mariguana regalada	10.4	16.1	14.8	13.3	14.6	17.8	16.7	16.1
Otra droga regalada	.8	1.2	.8	.9	1.5	2.9	1.4	1.7
Mariguana comprada	4.2	4.7	4.5	4.4	7.2	5.3	5.6	6.2
Otra droga comprada	.6	.8	.4	.6	.8	1.3	1.0	1.0
Mariguana y otra droga regalada	6.6	11.6	7.0	7.7	10.5	13.5	9.3	10.5
Mariguana y otra droga comprada	.9	1.0	.7	.9	.9	1.4	.9	1.0
Mariguana y otra droga regalada y comprada	1.9	3.6	1.7	2.2	1.9	5.6	1.9	2.6

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Mecanismos involucrados en la oportunidad del consumo de drogas, población femenina

Cuadro TD27

	ENA 2008				ENA 2011			
	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total	12-25 años	26-34 años	35-65 años	Total
N por subgrupo	14 924 115	8 136 502	15 971 024	39 031 641	14 772 957	8 240 810	18 099 630	41 113 398
Exposición	%	%	%	%	%	%	%	%
Sin exposición	89.3	91.2	94.8	92.0	83.0	89.0	95.6	89.8
Mariguana regalada	4.5	3.9	2.7	3.7	7.3	4.9	2.7	4.8
Otra droga regalada	1.2	.9	.3	.7	1.4	1.3	.4	.9
Mariguana comprada	1.3	.9	.9	1.1	2.1	.5	.5	1.1
Otra droga comprada	.2	.2	.1	.2	.5	.5	.1	.3
Mariguana y otra droga regalada	2.5	2.3	.9	1.8	5.2	2.7	.7	2.7
Mariguana y otra droga comprada	.3	.1	--	.2	.1	.6	--	.1
Mariguana y otra droga regalada y comprada	.6	.5	.2	.4	.4	.5	.1	.3

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Exposición a la oportunidad de consumir drogas y su relación con el consumo

Cuadro TD28

N por subgrupo Exposición	ENA 2008						ENA 2011					
	Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga		Mariguana		Otras drogas		Cualquier droga	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sin exposición	179 436	.3	428 235	.7	548 432	.9	565 828	.9	671 457	1.1	992 063	1.6
Mariguana regalada	773 908	12.4	200 072	3.2	885 960	14.2	943 983	11.5	333 667	4.1	1 064 569	13.0
Otra droga regalada	12 614	2.1	147 510	24.3	155 015	25.5	86 907	8.4	226 126	21.7	251 333	24.2
Mariguana comprada	472 550	23.6	257 615	12.9	589 756	29.4	692 348	24.5	278 322	9.9	739 848	26.2
Otra droga comprada	48 515	18.3	79 786	30.2	93 298	35.3	79 589	15.5	172 638	33.6	191 279	37.2
Mariguana y otra droga regalada	1 062 456	30.4	963 333	27.6	1 317 019	37.7	1 662 114	32.1	1 542 471	29.8	2 131 113	41.1
Mariguana y otra droga comprada	126 279	33.7	113 945	30.4	163 896	43.7	134 742	30.3	148 407	33.3	214 174	48.1
Mariguana y otra droga regalada y comprada	471 038	49.4	485 120	50.9	544 536	57.1	586 474	53.0	560 530	50.6	650 901	58.8

Porcentajes de consumo de drogas para cada tipo de exposición.

Edad de inicio del consumo de drogas

Cuadro TD29

Drogas	ENA 2008				ENA 2011			
	17 años o menos %	18 a 25 años %	26 a 34 años %	35 años o más %	17 años o menos %	18 a 25 años %	26 a 34 años %	35 años o más %
Opiáceos	37.2	37.2	16.6	9.0	42.6	38.0	13.1	6.3
Tranquilizantes	35.7	37.1	13.8	13.4	30.5	46.8	9.0	13.8
Sedantes	50.9	29.9	15.7	3.5	48.8	42.7	8.6	--
Anfetaminas o estimulantes	27.1	35.9	21.8	15.2	15.6	60.7	17.5	6.2
Mariguana	55.7	38.5	4.4	1.3	57.6	36.1	4.1	2.1
Cocaína	36.4	48.5	11.8	3.3	38.8	47.2	10.1	3.9
Crack	42.2	41.9	13.2	2.7	39.9	49.4	7.2	3.6
Alucinógenos	32.3	53.1	10.9	3.7	29.0	63.4	4.5	3.1
Inhalables	63.3	33.8	2.2	.7	77.0	19.9	1.7	1.3
Heroína, opio	40.3	45.7	14.0	--	34.3	50.0	14.6	1.0
Estimulantes tipo anfetamínico	46.5	42.2	10.5	.8	25.1	62.2	7.5	5.1
Otras drogas	37.4	54.1	8.5	--	--	100.0	--	--
Cualquier droga	50.8	38.9	6.9	3.3	51.7	38.4	6.5	3.4

Porcentajes obtenidos de los usuarios de cada sustancia

Proporción de usuarios que reportó iniciar su consumo antes de los 18 años.

Cuadro TD30

N por subgrupo Cohorte	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana	Cocaína	Otras drogas	Mariguana	Cocaína	Otras drogas
	2 867 994	1 602 410	498 608	2 403 405	841 157	715 856
	%	%	%	%	%	%
Hombres						
18-25	67.9	54.3	57.7	71.2	61.8	46.0
26-34	51.2	26.2	35.4	55.4	38.4	36.6
35-65	42.8	20.4	35.7	44.6	12.0	29.3
Subtotal	52.5	32.1	41.4	55.7	35.4	36.8
Mujeres						
18-25	56.7	54.7	57.9	60.7	80.3	53.9
26-34	46.7	23.9	23.1	43.1	35.6	21.8
35-65	35.7	5.3	12.5	18.7	12.1	17.5
Subtotal	46.2	34.6	27.0	47.2	44.2	31.4
Total	51.5	32.4	37.3	54.5	36.3	35.2

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Factores sociodemográficos asociados con la primera oportunidad de usar drogas
y la transición al uso, abuso y dependencia en el consumo de sustancias
población de 12 a 25 años**

Cuadro TD31

Exposición	ENA 2008								ENA 2011							
	Oportunidad de usar		Experimentación dada la oportunidad		Abuso dada la oportunidad		Dependencia dado el abuso		Oportunidad de usar		Experimentación dada la oportunidad		Abuso dada la oportunidad		Dependencia dado el abuso	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexo																
Hombre	3 645 807	25.4	502 889	13.8	523 614	14.4	165 155	30.3	5 613 471	37.5	846 224	15.1	667 072	11.9	223 810	30.7
Mujer	1 591 718	10.7	205 267	12.9	154 474	9.7	26 313	15.8	2 505 974	17.0	356 610	14.2	136 102	5.4	33 219	22.8
Edad																
12-17	1 451 650	10.6	220 545	15.2	142 772	9.8	52 688	35.8	2 483 740	18.5	263 669	10.6	116 090	4.7	49 252	41.0
18-25	3 785 875	24.2	487 611	12.9	535 316	14.1	138 780	24.6	5 635 705	34.5	939 165	16.7	687 084	12.2	207 778	27.5
Situación Escolar																
Estudia actualmente	2 034 576	14.1	242 437	11.9	166 706	8.2	41 583	24.6	3 706 499	23.6	398 984	10.8	195 054	5.3	73 179	35.2
No estudia	3 202 949	21.6	465 719	14.5	511 382	16.0	149 885	27.6	4 412 946	31.4	803 850	18.2	608 120	13.8	183 850	27.5
Situación Laboral																
Trabaja	2 796 966	27.2	385 933	13.8	402 919	14.4	100 561	23.8	4 320 229	40.4	769 651	17.8	490 626	11.4	150 921	27.7
Ama de Casa	398 358	9.4	48 675	12.2	41 031	10.3	8 633	19.6	711 929	14.7	135 952	19.1	39 343	5.5	12 333	31.3
Desempleado	2 042 201	13.8	273 548	13.4	234 138	11.5	82 274	33.6	3 087 287	21.7	297 232	9.6	273 205	8.8	93 776	32.2
Intento suicida																
Con intento	163 416	52.5	46 337	28.4	28 611	17.5	15 538	54.3	279 518	49.0	106 398	38.1	20 919	7.5	--	--
Sin intento	4 965 631	17.3	697 929	14.1	636 345	12.8	179 204	26.9	7 839 927	26.9	1 096 436	14.0	782 254	10.0	257 029	30.6

Porcentajes obtenidos para cada grupo definido en los renglones

Trayectorias del consumo de drogas según cohorte de nacimiento

Cuadro TD32

N por subgrupo	ENA 2008					ENA 2011				
	Cohorte según fecha de nacimiento									
	84-96	72-83	57-71	43-56	Total	87-99	75-86	60-74	46-59	Total
	27 436 011	20 310 249	18 191 312	9 187 465	75 125 037	27 941 884	20 309 423	19 718 435	11 651 470	79 621 211
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Oportunidad de uso	17.3	22.8	18.7	12.7	18.5	26.9	27.5	23.1	14.1	24.2
Uso de cualquier droga	4.9	7.7	5.7	3.6	5.7	7.3	10.9	8.0	3.5	7.8
Abuso de cualquier droga	2.2	3.9	3.0	1.5	2.8	2.8	5.2	3.1	1.4	3.3
Dependencia a una o más drogas ilícitas	.7	.7	.4	.2	.6	1.2	.8	.3	--	.7
Remisión por uso de drogas	.4	.5	.4	.1	.4	.3	.6	.4	.2	.4
Uso dada la oportunidad	26.3	29.5	26.1	21.6	26.9	24.3	33.8	27.2	17.7	27.2
Abuso dado el uso	45.7	50.3	52.6	42.5	48.8	38.7	47.5	39.3	41.7	42.2
Dependencia dado el abuso	27.8	16.3	14.5	8.5	18.7	32.1	12.8	9.2	1.0	17.0
Remisión dado el abuso	15.3	12.4	11.8	4.1	12.5	9.6	9.3	12.4	2.8	9.7
Remisión dada la dependencia	32.7	33.8	35.5	23.6	33.3	10.4	27.6	37.4	--	18.4
Población total	36.5	27.0	24.2	12.2	100.0	35.1	25.5	24.8	14.6	100.0

Porcentajes obtenidos de cada grupo generacional.

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
población de 12 a 65 años**

Cuadro TD33

	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dependencia	365 899	1.0	62 920	.2	428 819	.6	484 308	1.3	68 883	.2	553 191	.7
Uso sin dependencia	2 928 739	8.1	940 354	2.4	3 869 093	5.2	4 523 185	11.7	1 158 905	2.8	5 682 090	7.1
Exposición a drogas sin consumo	7 770 235	21.5	2 413 829	6.2	10 184 064	13.6	10 667 937	27.7	3 372 253	8.2	14 040 190	17.6
No consumo	25 028 523	69.3	35 614 538	91.2	60 643 061	80.7	22 832 383	59.3	36 513 358	88.8	59 345 740	74.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
población de 12 a 17 años**

Cuadro TD34

	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dependencia	51 807	.8	20 293	.3	72 100	.5	73 299	1.1	10 447	.2	83 746	.6
Uso sin dependencia	196 456	2.9	121 945	1.8	318 401	2.3	201 803	3.0	161 607	2.4	363 410	2.7
Exposición a drogas sin consumo	718 031	10.6	370 302	5.4	1 088 333	8.0	1 355 423	19.9	748 559	11.3	2 103 981	15.7
No consumo	5 798 971	85.7	6 390 479	92.6	12 189 450	89.2	5 176 953	76.0	5 709 485	86.1	10 886 437	81.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
población de 18 a 34 años**

Cuadro TD35

	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dependencia	216 384	1.5	30 656	.2	247 040	.8	325 349	2.1	53 156	.3	378 505	1.2
Uso sin dependencia	1 577 447	10.7	495 900	3.1	2 073 347	6.7	2 501 989	16.3	702 253	4.3	3 204 241	10.1
Exposición a drogas sin consumo	3 820 816	25.8	1 407 763	8.7	5 228 579	16.9	4 910 466	32.0	1 900 674	11.6	6 811 139	21.5
No consumo	9 168 065	62.0	14 223 279	88.0	23 391 344	75.6	7 584 103	49.5	13 727 589	83.8	21 311 692	67.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Necesidades de atención de la población por el consumo de drogas
población de 35 a 65 años**

Cuadro TD36

	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dependencia	97 708	.7	11 971	.1	109 679	.4	85 660	.5	5 280	***	90 939	.3
Uso sin dependencia	1 154 836	7.9	322 509	2.0	1 477 345	4.8	1 819 393	11.1	295 046	1.6	2 114 439	6.1
Exposición a drogas sin consumo	3 231 388	22.2	635 764	4.0	3 867 152	12.7	4 402 049	26.9	723 021	4.0	5 125 070	14.9
No consumo	10 061 487	69.2	15 000 780	93.9	25 062 267	82.1	10 071 327	61.5	17 076 285	94.3	27 147 611	78.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Bloque 2: Tendencias de los indicadores de la sección de drogas por región

En este bloque se presentan los indicadores de incidencia acumulada del consumo de drogas, prevalencia de consumo de drogas en el último año y en el último mes, reportados por región, sexo y grupos de edad. Asimismo, se presenta la comparación de estos indicadores con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD1

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	6.6	6.0	1.5	8.4	7.3	1.8
Noroccidental	7.5	7.1	1.0	9.2	9.0	1.3
Nororiental	6.3	5.8	1.1	9.6	8.9	2.3
Occidental	5.5	5.1	1.0	10.3	9.2	1.8
Centro	5.3	4.8	.7	6.6	6.2	1.2
Ciudad de México	8.5	7.8	1.9	8.8	7.9	1.5
Centro Sur	4.2	3.5	1.0	7.5	6.8	1.1
Sur	4.9	4.3	1.0	5.3	5.0	.9
Nacional	5.7	5.2	1.0	7.8	7.2	1.4

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD2

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	10.6	10.1	2.2	13.6	13.0	2.0
Noroccidental	11.1	10.8	1.2	16.5	16.3	2.0
Nororiental	10.8	10.6	1.3	15.5	15.0	3.2
Occidental	8.5	8.2	1.1	17.2	16.5	1.7
Centro	8.4	8.1	.8	10.6	10.1	1.7
Ciudad de México	12.6	12.2	2.6	12.6	11.9	1.5
Centro Sur	7.1	6.5	1.3	13.6	13.0	1.5
Sur	7.9	7.6	.8	9.3	9.1	1.0
Nacional	9.1	8.8	1.3	13.0	12.5	1.8

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD3

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.7	2.1	.9	3.5	1.9	1.7
Noroccidental	3.8	3.5	.8	1.9	1.5	.5
Nororiental	1.9	1.2	.8	3.8	3.0	1.4
Occidental	2.7	2.1	.8	3.8	2.4	1.8
Centro	2.4	1.9	.6	3.0	2.6	.8
Ciudad de México	4.9	3.9	1.3	5.4	4.3	1.4
Centro Sur	1.5	.9	.7	1.9	1.3	.7
Sur	2.0	1.1	1.1	1.5	1.0	.7
Nacional	2.6	1.9	.8	3.0	2.3	1.0

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD4

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.8	2.6	.7	3.0	2.6	.7
Noroccidental	2.5	2.4	.1	4.2	4.2	.2
Nororiental	2.2	2.0	.2	6.3	5.4	1.6
Occidental	2.2	2.0	.5	3.6	3.3	.5
Centro	2.9	2.6	.4	2.8	2.2	.6
Ciudad de México	8.1	7.2	1.3	4.9	4.9	--
Centro Sur	2.3	1.8	.6	2.4	2.2	.2
Sur	2.2	1.9	.4	2.2	2.1	.3
Nacional	2.9	2.6	.5	3.3	2.9	.5

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD5

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.3	7.8	1.6	12.2	10.6	2.6
Noroccidental	9.2	8.9	.8	11.5	11.1	1.4
Nororiental	8.4	7.9	1.3	13.1	12.7	2.9
Occidental	7.3	6.8	1.3	14.2	13.2	1.8
Centro	7.4	6.9	.8	11.3	10.7	2.0
Ciudad de México	11.1	10.7	2.2	13.4	12.9	1.5
Centro Sur	5.4	5.0	.9	10.1	9.2	1.1
Sur	5.5	5.2	.7	6.0	5.8	.7
Nacional	7.5	7.1	1.1	11.3	10.6	1.7

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD6

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	5.5	5.4	1.3	7.3	6.2	1.5
Noroccidental	5.3	5.3	.5	7.5	7.3	.7
Nororiental	5.8	5.4	.5	10.9	10.5	2.2
Occidental	4.4	4.2	.6	8.5	7.8	1.2
Centro	5.3	5.0	.7	7.9	7.1	1.3
Ciudad de México	8.8	8.0	1.2	8.0	7.7	.7
Centro Sur	3.7	3.3	.8	6.8	6.0	.7
Sur	4.1	3.8	.6	4.3	4.2	.4
Nacional	5.1	4.8	.7	7.6	7.0	1.1

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD7

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	8.9	7.8	1.5	13.8	12.4	3.1
Noroccidental	10.5	10.1	.8	13.3	12.8	1.8
Nororiental	8.1	7.8	1.9	11.8	10.8	3.2
Occidental	8.3	7.4	1.9	16.9	15.8	2.0
Centro	7.2	6.7	.7	10.3	10.1	2.0
Ciudad de México	12.9	12.9	3.2	16.3	15.7	1.8
Centro Sur	5.6	5.1	.9	9.6	9.1	1.0
Sur	5.1	4.8	.6	6.1	5.7	1.0
Nacional	7.9	7.4	1.2	11.5	11.0	1.9

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD8

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	6.4	5.7	1.8	7.2	6.3	1.6
Noroccidental	7.8	7.2	1.5	9.1	8.8	1.6
Nororiental	5.8	5.2	1.2	7.5	6.8	2.0
Occidental	5.2	4.7	.8	9.2	7.8	2.2
Centro	4.2	3.7	.7	3.8	3.5	.8
Ciudad de México	6.3	5.4	1.9	6.3	4.9	1.9
Centro Sur	4.0	3.1	1.3	7.4	6.7	1.4
Sur	5.6	4.4	1.6	6.0	5.4	1.3
Nacional	5.2	4.5	1.2	6.4	5.7	1.4

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD9

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %
Norcentral	4.8	3.6	.7	5.9	3.8	.7
Noroccidental	5.3	3.6	1.5	7.4	4.9	1.2
Nororiental	4.7	2.9	.3	7.4	4.7	1.1
Occidental	4.0	2.3	.5	6.8	4.0	.6
Centro	3.8	1.9	.4	5.2	2.4	1.2
Ciudad de México	6.6	3.1	.8	6.7	2.6	.5
Centro Sur	2.9	1.8	.2	5.7	3.5	.5
Sur	3.6	1.9	.2	4.6	2.2	.1
Nacional	4.2	2.4	.5	6.0	3.3	.8

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD10

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %
Norcentral	2.4	.6	.2	1.9	.6	.7
Noroccidental	1.9	.5	.7	4.2	--	--
Nororiental	1.5	.8	--	5.1	2.8	1.6
Occidental	1.7	.6	.3	2.3	1.2	.7
Centro	1.9	.8	.3	2.0	.3	--
Ciudad de México	5.9	1.0	1.4	2.9	.3	--
Centro Sur	1.5	1.3	.3	1.3	.7	--
Sur	1.6	.6	--	2.1	.8	.2
Nacional	2.0	.8	.3	2.4	.7	.3

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD11

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %
Norcentral	6.0	5.2	1.1	8.2	5.7	1.2
Noroccidental	6.5	4.8	2.2	9.1	5.7	1.8
Nororiental	6.2	4.5	.4	10.6	6.9	1.5
Occidental	5.1	3.6	1.1	9.6	6.5	.9
Centro	5.3	2.8	.6	8.9	4.7	2.6
Ciudad de México	9.3	5.2	1.5	11.2	5.0	1.2
Centro Sur	4.0	2.9	.3	7.6	5.2	.7
Sur	4.1	3.0	.3	5.3	3.1	.2
Nacional	5.5	3.6	.8	8.7	5.2	1.5

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD12

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %
Norcentral	4.8	3.3	.7	5.4	2.6	1.1
Noroccidental	3.8	2.4	1.3	6.5	2.4	.6
Nororiental	4.2	2.5	.3	9.4	4.9	2.1
Occidental	3.6	2.0	1.1	5.8	2.5	.9
Centro	3.7	2.2	.5	5.7	2.5	1.3
Ciudad de México	6.7	1.7	.9	6.4	1.6	.6
Centro Sur	2.6	2.1	.2	5.1	2.8	.4
Sur	3.0	1.8	.2	4.1	2.2	.3
Nacional	3.8	2.2	.6	5.9	2.7	.9

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD13

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %
Norcentral	5.1	4.9	1.1	8.3	7.5	.9
Noroccidental	7.4	5.6	2.5	10.3	7.5	2.7
Nororiental	6.1	5.1	.2	8.3	7.4	.4
Occidental	5.2	3.9	.4	10.9	10.4	.9
Centro	5.2	2.1	.5	8.7	4.9	2.8
Ciudad de México	11.2	8.2	2.3	13.4	7.2	1.3
Centro Sur	4.4	2.8	.5	6.7	5.9	.7
Sur	4.0	3.2	.2	4.9	2.9	--
Nacional	5.8	3.8	.8	8.7	6.2	1.5

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD14

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %	Mariguana %	Cocaína %	Estimulantes tipo anfetamínico %
Norcentral	4.7	3.2	.4	5.4	3.4	.4
Noroccidental	5.4	3.6	1.0	7.0	6.0	1.1
Nororiental	4.5	2.1	.4	5.4	3.3	.6
Occidental	3.9	1.8	.1	6.0	2.7	.2
Centro	3.2	1.4	.2	3.0	1.0	.4
Ciudad de México	4.5	1.9	--	4.3	1.4	.1
Centro Sur	2.5	1.0	.1	5.8	3.1	.4
Sur	4.0	1.3	.1	5.1	2.0	--
Nacional	3.8	1.8	.3	4.8	2.5	.4

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD15

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.5	2.3	.7	2.0	1.6	.6
Noroccidental	2.8	2.5	.3	2.9	2.8	.5
Nororiental	2.0	1.8	.2	3.1	2.4	1.2
Occidental	1.1	.9	.4	2.0	1.5	.6
Centro	1.3	1.2	.2	1.5	1.2	.3
Ciudad de México	2.2	1.8	.5	2.1	1.7	.4
Centro Sur	1.3	1.0	.4	1.5	1.3	.1
Sur	1.1	.8	.4	.8	.6	.2
Nacional	1.6	1.4	.3	1.8	1.5	.4

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD16

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	3.9	3.7	.9	3.2	3.0	.5
Noroccidental	4.2	4.1	.4	5.3	5.3	.8
Nororiental	3.7	3.5	.4	5.3	4.5	1.7
Occidental	1.6	1.5	.4	3.2	2.7	.7
Centro	1.9	1.9	.1	2.1	1.7	.4
Ciudad de México	2.9	2.6	.7	3.3	2.6	.7
Centro Sur	2.2	1.9	.5	2.7	2.7	--
Sur	1.5	1.3	.2	1.0	.9	.1
Nacional	2.5	2.3	.4	3.0	2.6	.5

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD17

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.2	1.0	.5	1.0	.3	.6
Noroccidental	1.3	1.0	.3	.5	.3	.2
Nororiental	.4	.3	.1	1.0	.4	.6
Occidental	.6	.3	.4	.9	.3	.6
Centro	.8	.5	.2	.9	.7	.3
Ciudad de México	1.5	1.1	.4	1.0	.9	.1
Centro Sur	.6	.2	.4	.3	.1	.2
Sur	.7	.3	.5	.5	.3	.3
Nacional	.8	.5	.3	.7	.4	.3

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD18

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.0	2.0	.5	1.5	1.2	.6
Noroccidental	1.8	1.7	.1	2.3	2.3	.2
Nororiental	1.7	1.5	.2	4.5	4.0	1.1
Occidental	1.2	1.0	.3	1.6	1.6	--
Centro	1.6	1.5	.2	1.1	1.1	--
Ciudad de México	4.0	3.1	.9	2.6	2.6	--
Centro Sur	1.6	1.2	.4	.5	.4	.1
Sur	1.2	1.1	.1	1.9	1.8	.1
Nacional	1.7	1.5	.3	1.6	1.5	.2

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD19

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	3.1	2.9	.4	3.1	2.4	.8
Noroccidental	3.6	3.6	.2	4.0	3.7	.4
Nororiental	2.1	2.0	.3	4.6	3.2	1.6
Occidental	1.8	1.4	.6	2.6	2.0	.9
Centro	2.1	1.9	.3	2.5	2.0	.7
Ciudad de México	2.7	2.4	.7	3.8	3.4	.3
Centro Sur	1.8	1.7	.5	2.7	2.4	.3
Sur	1.3	1.2	.1	.6	.5	.2
Nacional	2.2	2.0	.4	2.8	2.3	.6

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD20

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.9	2.9	.5	2.5	2.1	.6
Noroccidental	2.9	2.8	.2	3.5	3.3	.3
Nororiental	1.7	1.6	.1	5.7	4.6	1.7
Occidental	1.6	1.5	.3	2.0	1.7	.5
Centro	2.3	2.1	.3	2.7	2.1	.7
Ciudad de México	3.5	2.9	.8	3.6	3.3	.3
Centro Sur	2.0	1.7	.6	2.0	1.9	.1
Sur	1.5	1.4	.2	1.4	1.3	.1
Nacional	2.2	2.0	.4	2.7	2.4	.5

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD21

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.4	2.1	.3	2.8	1.9	.9
Noroccidental	3.4	3.4	.2	3.7	3.4	.4
Nororiental	2.4	2.3	.4	2.4	1.3	1.1
Occidental	1.7	.9	.9	3.1	2.3	.9
Centro	1.3	1.1	.2	1.1	.9	.2
Ciudad de México	2.2	2.2	.6	3.3	3.1	.2
Centro Sur	1.2	1.1	.2	1.9	1.4	.4
Sur	.7	.7	--	.3	--	.3
Nacional	1.7	1.5	.3	1.9	1.5	.5

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD22

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.2	1.8	1.0	1.3	1.1	.4
Noroccidental	2.4	1.8	.6	2.1	2.1	.8
Nororiental	2.0	1.8	.3	1.3	1.1	.8
Occidental	.4	.2	.1	1.6	.9	.6
Centro	.4	.3	.1	.7	.5	.1
Ciudad de México	1.2	.9	.3	.7	.2	.5
Centro Sur	.7	.4	.4	.8	.8	--
Sur	.9	.2	.7	.4	.1	.3
Nacional	1.0	.8	.3	1.0	.8	.3

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD23

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.7	1.0	1.0	.8
Noroccidental	1.9	.7	2.3	1.0
Nororiental	1.4	.6	1.9	1.1
Occidental	.7	.2	1.3	.5
Centro	.8	.4	1.0	.2
Ciudad de México	1.7	.3	1.5	.1
Centro Sur	.7	.5	.9	.8
Sur	.6	.3	.5	.2
Nacional	1.0	.4	1.2	.5

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD24

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	2.8	1.5	1.7	1.3
Noroccidental	3.0	1.2	4.3	2.0
Nororiental	2.6	1.1	3.8	2.2
Occidental	1.2	.4	2.5	.7
Centro	1.3	.6	1.7	.2
Ciudad de México	2.5	.6	2.4	.2
Centro Sur	1.2	.9	1.8	1.6
Sur	1.0	.5	.8	.2
Nacional	1.7	.8	2.2	.9

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD25

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	.6	.5	.3	.2
Noroccidental	.7	.2	.2	--
Nororiental	.2	.1	.1	--
Occidental	.2	--	.1	.3
Centro	.3	.2	.4	.1
Ciudad de México	1.0	--	.8	.1
Centro Sur	.1	.1	--	.1
Sur	.2	.1	.3	.1
Nacional	.4	.1	.3	.1

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años

Cuadro TRD26

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.7	.1	.8	.3
Noroccidental	1.5	.1	2.3	--
Nororiental	1.1	.5	3.2	1.0
Occidental	.7	.1	1.4	.8
Centro	1.0	.5	1.0	.3
Ciudad de México	2.8	.2	2.1	.3
Centro Sur	1.0	.5	.2	.2
Sur	.8	.3	1.6	.8
Nacional	1.2	.4	1.3	.4

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años

Cuadro TRD27

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	2.1	1.5	1.4	1.2
Noroccidental	2.5	1.1	2.9	1.4
Nororiental	1.2	1.0	2.8	1.6
Occidental	1.2	.4	1.6	.8
Centro	1.2	.6	1.8	.3
Ciudad de México	2.4	.5	3.1	.1
Centro Sur	1.0	.8	1.5	1.6
Sur	.9	.4	.5	--
Nacional	1.4	.7	1.9	.8

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años

Cuadro TRD28

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	2.4	1.2	1.4	.9
Noroccidental	2.3	.5	2.8	.7
Nororiental	1.3	.5	4.0	1.5
Occidental	1.1	.3	1.2	.7
Centro	1.4	.6	1.9	.4
Ciudad de México	2.7	.3	2.9	.1
Centro Sur	1.1	.9	1.4	1.2
Sur	1.0	.5	1.2	.4
Nacional	1.5	.6	2.0	.7

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años

Cuadro TRD29

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.2	1.0	.7	1.1
Noroccidental	1.9	1.3	2.5	1.7
Nororiental	1.0	1.5	1.0	1.3
Occidental	.9	.3	2.3	.9
Centro	.6	.5	.9	--
Ciudad de México	2.2	.6	2.8	.3
Centro Sur	.8	.3	.3	1.1
Sur	.7	.3	--	--
Nacional	1.0	.6	1.2	.6

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años

Cuadro TRD30

Región	ENA 2008		ENA 2011	
	Mariguana %	Cocaína %	Mariguana %	Cocaína %
Norcentral	1.3	.8	.8	.5
Noroccidental	1.4	.5	1.7	1.1
Nororiental	1.7	.3	.7	.7
Occidental	.2	--	.9	.1
Centro	.2	.1	.3	--
Ciudad de México	.7	.1	.2	.1
Centro Sur	.2	.1	.6	.3
Sur	.1	.1	.1	--
Nacional	.6	.2	.6	.3

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE DROGAS POR REGIÓN

Consumo de drogas en el último mes en la población de 12 a 65 años

Cuadro TRD31

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.4	1.2	.2	1.1	.9	.3
Noroccidental	1.9	1.7	.2	2.0	1.9	.4
Nororiental	1.6	1.6	.2	1.4	1.3	.3
Occidental	.7	.6	.1	1.3	.9	.5
Centro	.8	.7	.1	.6	.4	.1
Ciudad de México	1.5	1.3	.2	1.5	1.3	.2
Centro Sur	.7	.6	.2	.6	.5	.1
Sur	.5	.3	.1	.5	.4	***
Nacional	1.0	.9	.1	1.0	.8	.2

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Consumo de drogas en el último mes en la población masculina de 12 a 65 años

Cuadro TRD32

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	2.2	2.0	.3	1.9	1.8	.2
Noroccidental	3.1	3.0	.2	3.9	3.9	.7
Nororiental	3.0	2.9	.3	2.6	2.6	.4
Occidental	1.2	1.1	.2	2.3	1.8	.5
Centro	1.2	1.2	--	1.0	.7	.3
Ciudad de México	2.0	1.7	.2	2.4	2.0	.4
Centro Sur	1.3	1.2	.3	1.1	1.1	--
Sur	.7	.6	.1	.8	.8	--
Nacional	1.7	1.6	.2	1.7	1.5	.3

Consumo de drogas en el último mes en la población femenina de 12 a 65 años

Cuadro TRD33

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas	Cualquier droga	Drogas ilegales	Drogas médicas
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	.7	.5	.2	.4	***	.4
Noroccidental	.7	.5	.3	--	--	--
Nororiental	.3	.3	--	.1	--	.1
Occidental	.2	.1	--	.4	--	.4
Centro	.3	.2	.1	.2	.2	--
Ciudad de México	1.0	.9	.2	.6	.6	.1
Centro Sur	.2	.1	.1	.1	--	.1
Sur	.2	--	.2	.2	.1	***
Nacional	.4	.3	.1	.2	.1	.1

*** El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Bloque 3: Intervalos de confianza de drogas

En este bloque se presentan los indicadores de incidencia acumulada de consumo de drogas y la prevalencia de consumo en el último año por sustancia, con sus respectivos intervalos de confianza cruzados por sexo y grupos de edad, así como la prevalencia de consumo alguna vez y último año de sustancias considerando distintas regiones del país.

USO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA

El intervalo de confianza se interpreta de la siguiente forma. Si se quiere comparar el consumo de cocaína alguna vez entre hombres y mujeres, se hace lo siguiente:

Se busca el valor del consumo de cocaína alguna vez en el cuadro de POBLACIÓN MASCULINA que en este caso sería 5.9%; después se busca el dato de cocaína alguna vez en el cuadro de POBLACIÓN FEMENINA que es de 0.7%; de estos datos se elige el porcentaje más alto (POBLACIÓN MASCULINA) para considerar su columna de IC 95% (5.111-6.774); posteriormente se ubica si el valor más bajo (POBLACIÓN FEMENINA) está por arriba, por abajo o dentro de este Intervalo de Confianza.

Aquí se observa que el 0.7% está por debajo de los intervalos que van de 5.111-6.774; por lo que podemos decir con una confianza del 95% que el nivel de consumo de cocaína alguna vez es más alto en los hombres en comparación con las mujeres.

Los intervalos de confianza, también pueden servir para comparar los distintos grupos de edad o bien entre distintas sustancias.

Consumo de drogas en población de 12 a 65 años

Cuadro ICD1

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.098-0.258
Tranquilizantes	0.9	0.673-1.127
Sedantes	0.2	0.065-0.266
Anfetaminas	0.5	0.273-0.671
Mariguana	6.0	5.367-6.570
Cocaína	3.3	2.828-3.680
Crack	1.0	0.736-1.294
Alucinógenos	0.7	0.451-0.945
Inhalables	0.9	0.656-1.170
Heroína	0.2	0.055-0.394
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	0.551-1.085
Otra droga	***	---
Cualquier droga	7.8	7.168-8.495
Drogas Médicas	1.4	1.130-1.668
Drogas Ilegales	7.2	6.568-7.864
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.174-0.358
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.044-0.219
Mariguana	1.2	0.957-1.461
Cocaína	0.5	0.351-0.643
Crack	0.1	0.033-0.193
Alucinógenos	0.1	0.010-0.146
Inhalables	0.1	0.049-0.194
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.068-0.233
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.8	1.529-2.120
Drogas Médicas	0.4	0.298-0.564
Drogas Ilegales	1.5	1.229-1.782

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población masculina de 12 a 65 años

Cuadro ICD2

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.101-0.378
Tranquilizantes	1.2	0.780-1.616
Sedantes	0.2	0.078-0.360
Anfetaminas	0.6	0.268-1.032
Mariguana	10.6	9.499-11.692
Cocaína	5.9	5.111-6.774
Crack	2.0	1.390-2.521
Alucinógenos	1.1	0.671-1.589
Inhalables	1.5	1.040-2.053
Heroína	0.4	0.100-0.800
Estimulantes tipo anfetamínico	1.3	0.781-1.726
Otra droga	--	---
Cualquier droga	13.0	11.793-14.215
Drogas Médicas	1.8	1.317-2.271
Drogas Ilegales	12.5	11.308-13.720
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.3	0.164-0.452
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.2	0.031-0.359
Mariguana	2.2	1.717-2.657
Cocaína	0.9	0.636-1.211
Crack	0.2	0.055-0.379
Alucinógenos	0.1	0.005-0.275
Inhalables	0.2	0.066-0.336
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.103-0.346
Otra droga	--	---
Cualquier droga	3.0	2.435-3.516
Drogas Médicas	0.5	0.308-0.765
Drogas Ilegales	2.6	2.126-3.147

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población femenina de 12 a 65 años

Cuadro ICD3

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	0.036-0.205
Tranquilizantes	0.6	0.413-0.829
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.3	0.162-0.450
Mariguana	1.6	1.217-2.051
Cocaína	0.7	0.489-0.981
Crack	0.1	0.025-0.244
Alucinógenos	0.3	0.072-0.515
Inhalables	0.3	0.168-0.472
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.124-0.697
Otra droga	***	---
Cualquier droga	3.0	2.459-3.513
Drogas Médicas	1.0	0.743-1.315
Drogas Ilegales	2.3	1.760-2.747
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.110-0.344
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.004-0.139
Mariguana	0.3	0.084-0.502
Cocaína	0.1	0.027-0.169
Crack	***	---
Alucinógenos	***	---
Inhalables	***	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	0.7	0.470-1.023
Drogas Médicas	0.3	0.187-0.478
Drogas Ilegales	0.4	0.200-0.692

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población de 12 a 17 años

Cuadro ICD4

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.4	0.121-0.746
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	2.4	1.719-3.082
Cocaína	0.7	0.396-1.066
Crack	0.1	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.9	0.503-1.367
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.3	0.080-0.493
Otra droga	--	---
Cualquier droga	3.3	2.546-4.110
Drogas Médicas	0.5	0.196-0.856
Drogas Ilegales	2.9	2.208-3.672
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.1	0.020-0.260
Sedantes	--	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	1.3	0.816-1.835
Cocaína	0.4	0.160-0.641
Crack	--	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.3	0.032-0.632
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.6	1.093-2.188
Drogas Médicas	0.2	0.045-0.327
Drogas Ilegales	1.5	1.001-2.081

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población de 18 a 34 años

Cuadro ICDS

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.053-0.347
Tranquilizantes	1.1	0.635-1.604
Sedantes	0.2	---
Anfetaminas	0.6	0.186-1.093
Mariguana	8.7	7.541-9.906
Cocaína	5.2	4.278-6.085
Crack	1.9	1.197-2.521
Alucinógenos	1.3	0.718-1.894
Inhalables	1.3	0.736-1.885
Heroína	0.3	---
Estimulantes tipo anfetamínico	1.5	0.876-2.141
Otra droga	***	---
Cualquier droga	11.3	10.018-12.582
Drogas Médicas	1.7	1.159-2.294
Drogas Ilegales	10.6	9.364-11.898
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.3	0.170-0.523
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.2	0.032-0.443
Mariguana	1.9	1.295-2.423
Cocaína	0.8	0.476-1.106
Crack	0.2	0.041-0.423
Alucinógenos	0.2	---
Inhalables	0.1	0.018-0.270
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.064-0.313
Otra droga	--	---
Cualquier droga	2.8	2.164-3.479
Drogas Médicas	0.6	0.351-0.911
Drogas Ilegales	2.3	1.681-2.907

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población de 35 a 65 años

Cuadro ICD6

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.069-0.304
Tranquilizantes	0.9	0.617-1.143
Sedantes	0.2	0.043-0.326
Anfetaminas	0.5	0.292-0.690
Mariguana	4.8	4.141-5.509
Cocaína	2.5	1.983-2.945
Crack	0.6	0.372-0.811
Alucinógenos	0.4	0.184-0.546
Inhalables	0.5	0.314-0.765
Heroína	0.2	0.082-0.360
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.181-0.600
Otra droga	--	---
Cualquier droga	6.4	5.614-7.179
Drogas Médicas	1.4	1.094-1.781
Drogas Ilegales	5.7	4.988-6.496
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.2	0.112-0.371
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	0.010-0.151
Mariguana	0.6	0.352-0.779
Cocaína	0.3	0.132-0.398
Crack	***	---
Alucinógenos	***	---
Inhalables	***	---
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.0	0.693-1.267
Drogas Médicas	0.3	0.178-0.506
Drogas Ilegales	0.8	0.507-1.025

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población de 12 a 25 años

Cuadro ICD7

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.065-0.376
Tranquilizantes	0.6	0.341-0.821
Sedantes	0.2	---
Anfetaminas	0.3	0.065-0.512
Mariguana	5.9	4.905-6.857
Cocaína	2.7	2.020-3.311
Crack	0.8	0.484-1.211
Alucinógenos	0.7	0.314-1.056
Inhalables	1.1	0.709-1.499
Heroína	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.9	0.528-1.369
Otra droga	***	---
Cualquier droga	7.6	6.494-8.689
Drogas Médicas	1.1	0.701-1.474
Drogas Ilegales	7.0	5.936-8.022
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.102-0.430
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.2	---
Mariguana	2.0	1.417-2.550
Cocaína	0.7	0.405-1.031
Crack	0.2	---
Alucinógenos	0.2	0.020-0.383
Inhalables	0.3	0.104-0.482
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.2	0.074-0.362
Otra droga	--	---
Cualquier droga	2.7	2.091-3.391
Drogas Médicas	0.5	0.238-0.792
Drogas Ilegales	2.4	1.752-2.966

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población de 26 a 34 años

Cuadro ICD8

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	1.6	0.664-2.461
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.8	---
Mariguana	8.7	7.044-10.353
Cocaína	6.2	4.733-7.587
Crack	2.3	1.100-3.475
Alucinógenos	1.5	0.478-2.461
Inhalables	1.4	0.427-2.335
Heroína	0.5	---
Estimulantes tipo anfetamínico	1.5	0.475-2.573
Otra droga	--	---
Cualquier droga	11.5	9.733-13.285
Drogas Médicas	1.9	0.994-2.834
Drogas Ilegales	11.0	9.208-12.744
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.3	0.115-0.528
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	1.2	0.566-1.740
Cocaína	0.6	0.259-0.923
Crack	0.2	---
Alucinógenos	--	---
Inhalables	***	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.9	1.265-2.625
Drogas Médicas	0.5	0.217-0.716
Drogas Ilegales	1.5	0.872-2.151

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población masculina de 12 a 17 años

Cuadro ICD9

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.2	0.005-0.483
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	--	---
Mariguana	3.5	2.272-4.665
Cocaína	0.8	0.305-1.212
Crack	0.2	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	1.1	0.381-1.745
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.3	0.033-0.600
Otra droga	--	---
Cualquier droga	4.0	2.796-5.286
Drogas Médicas	0.3	0.034-0.543
Drogas Ilegales	3.9	2.688-5.161
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.2	---
Sedantes	--	---
Anfetaminas	--	---
Mariguana	2.0	1.111-2.927
Cocaína	0.4	0.097-0.667
Crack	--	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.6	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	2.2	1.233-3.072
Drogas Médicas	0.2	---
Drogas Ilegales	2.2	1.233-3.072

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población masculina de 18 a 34 años

Cuadro ICD10

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.004-0.487
Tranquilizantes	1.4	0.485-2.289
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	1.0	0.123-1.942
Mariguana	15.0	12.858-17.152
Cocaína	9.4	7.638-11.221
Crack	3.5	2.186-4.874
Alucinógenos	2.0	0.923-3.085
Inhalables	2.3	1.136-3.449
Heroína	0.6	---
Estimulantes tipo anfetamínico	2.3	1.162-3.405
Otra droga	--	---
Cualquier droga	18.5	16.112-20.794
Drogas Médicas	2.1	1.108-3.123
Drogas Ilegales	17.8	15.474-20.121
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.3	0.075-0.537
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.4	---
Mariguana	3.4	2.344-4.411
Cocaína	1.6	0.949-2.241
Crack	0.4	0.051-0.825
Alucinógenos	0.3	---
Inhalables	0.2	0.009-0.425
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.123-0.637
Otra droga	--	---
Cualquier droga	4.7	3.472-5.865
Drogas Médicas	0.7	0.208-1.108
Drogas Ilegales	4.1	3.011-5.279

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población masculina de 35 a 65 años

Cuadro ICD11

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.3	0.085-0.545
Tranquilizantes	1.4	0.915-1.920
Sedantes	0.4	0.087-0.682
Anfetaminas	0.6	0.265-0.858
Mariguana	9.4	8.045-10.820
Cocaína	4.8	3.864-5.806
Crack	1.2	0.768-1.682
Alucinógenos	0.8	0.370-1.131
Inhalables	1.1	0.604-1.497
Heroína	0.5	0.174-0.758
Estimulantes tipo anfetamínico	0.7	0.321-1.037
Otra droga	--	---
Cualquier droga	11.6	10.080-13.183
Drogas Médicas	2.1	1.493-2.744
Drogas Ilegales	11.1	9.617-12.666
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.4	0.123-0.610
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	1.1	0.702-1.583
Cocaína	0.5	0.249-0.793
Crack	0.1	---
Alucinógenos	***	---
Inhalables	***	---
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.7	1.206-2.262
Drogas Médicas	0.6	0.251-0.897
Drogas Ilegales	1.4	0.953-1.900

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población femenina de 12 a 17 años

Cuadro ICD12

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	---
Tranquilizantes	0.6	0.041-1.215
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	1.3	0.658-1.950
Cocaína	0.7	0.223-1.181
Crack	0.1	---
Alucinógenos	0.2	---
Inhalables	0.8	0.262-1.346
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.3	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	2.6	1.604-3.586
Drogas Médicas	0.8	0.152-1.387
Drogas Ilegales	1.9	1.130-2.728
Consumo último año		
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	0.1	---
Sedantes	--	---
Anfetaminas	***	---
Mariguana	0.6	0.176-1.050
Cocaína	0.4	0.053-0.787
Crack	--	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.1	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.1	0.545-1.683
Drogas Médicas	0.2	0.013-0.388
Drogas Ilegales	0.9	0.376-1.451

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población femenina de 18 a 34 años

Cuadro ICD13

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	---
Tranquilizantes	0.9	0.463-1.275
Sedantes	0.3	---
Anfetaminas	0.3	0.066-0.477
Mariguana	2.8	1.895-3.802
Cocaína	1.2	0.693-1.726
Crack	0.3	0.028-0.563
Alucinógenos	0.7	0.106-1.200
Inhalables	0.4	0.117-0.666
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	0.120-1.448
Otra droga	***	---
Cualquier droga	4.6	3.428-5.794
Drogas Médicas	1.4	0.795-1.929
Drogas Ilegales	3.9	2.790-5.068
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.4	0.120-0.648
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	0.4	---
Cocaína	***	---
Crack	***	---
Alucinógenos	--	---
Inhalables	0.1	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	***	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.1	0.497-1.690
Drogas Médicas	0.6	0.271-0.941
Drogas Ilegales	0.6	0.045-1.081

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población femenina de 35 a 65 años

Cuadro ICD14

Consumo alguna vez*	%	IC 95%
Cualquier droga	1.7	1.148-2.171
Drogas Médicas	0.8	0.482-1.162
Drogas Ilegales	0.9	0.469-1.242
Consumo último año*		
Cualquier droga	0.3	0.029-0.566
Drogas Médicas	0.1	0.021-0.245
Drogas Ilegales	0.2	---

*No se incluyen las drogas específicas ya que sus porcentajes son cero o cercanos a cero.

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Consumo de drogas en población masculina de 12 a 25 años

Cuadro ICD15

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	---
Tranquilizantes	0.5	0.189-0.754
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.4	---
Mariguana	9.1	7.366-10.804
Cocaína	4.4	3.243-5.616
Crack	1.5	0.789-2.175
Alucinógenos	0.8	0.229-1.365
Inhalables	1.5	0.786-2.185
Heroína	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	1.4	0.646-2.079
Otra droga	--	---
Cualquier droga	11.2	9.336-13.133
Drogas Médicas	1.0	0.483-1.544
Drogas Ilegales	10.7	8.822-12.535
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.3	0.034-0.487
Sedantes	***	---
Anfetaminas	0.3	---
Mariguana	3.2	2.251-4.207
Cocaína	1.2	0.619-1.776
Crack	0.3	---
Alucinógenos	0.3	---
Inhalables	0.5	0.116-0.790
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.4	0.103-0.620
Otra droga	--	---
Cualquier droga	4.1	2.961-5.195
Drogas Médicas	0.6	0.102-1.004
Drogas Ilegales	3.7	2.663-4.750

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Consumo de drogas en población masculina de 26 a 34 años

Cuadro ICD16

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.1	---
Tranquilizantes	2.2	0.376-4.059
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	1.4	---
Mariguana	16.4	13.146-19.706
Cocaína	11.7	8.734-14.569
Crack	4.6	2.121-7.119
Alucinógenos	2.7	0.718-4.680
Inhalables	2.8	0.782-4.843
Heroína	1.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	2.3	0.434-4.247
Otra droga	--	---
Cualquier droga	19.9	16.440-23.274
Drogas Médicas	2.7	0.821-4.553
Drogas Ilegales	19.5	16.097-22.915
Consumo último año		
Opiáceos	--	---
Tranquilizantes	0.3	0.029-0.517
Sedantes	--	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	2.4	1.154-3.634
Cocaína	1.3	0.559-1.985
Crack	0.3	---
Alucinógenos	--	---
Inhalables	***	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	3.5	2.132-4.889
Drogas Médicas	0.4	0.121-0.709
Drogas Ilegales	3.2	1.815-4.518

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta.

Consumo de drogas en población femenina de 12 a 25 años

Cuadro ICD17

Consumo alguna vez	%	IC 95%
Opiáceos	0.2	0.027-0.445
Tranquilizantes	0.7	0.295-1.088
Sedantes	0.3	---
Anfetaminas	0.2	0.046-0.372
Mariguana	2.6	1.690-3.572
Cocaína	0.9	0.418-1.337
Crack	0.2	---
Alucinógenos	0.6	0.088-1.056
Inhalables	0.7	0.344-1.090
Heroína	***	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.5	0.085-0.973
Otra droga	***	---
Cualquier droga	3.9	2.839-4.955
Drogas Médicas	1.2	0.590-1.734
Drogas Ilegales	3.2	2.241-4.213
Consumo último año		
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	0.3	0.033-0.510
Sedantes	0.1	---
Anfetaminas	0.1	---
Mariguana	0.7	0.147-1.292
Cocaína	0.2	0.047-0.416
Crack	***	---
Alucinógenos	0.1	---
Inhalables	0.1	---
Heroína	--	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.1	---
Otra droga	--	---
Cualquier droga	1.4	0.722-2.050
Drogas Médicas	0.5	0.163-0.792
Drogas Ilegales	1.0	0.378-1.606

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en población femenina de 26 a 34 años

Cuadro ICD18

Consumo alguna vez*	%	IC 95%
Opiáceos	***	---
Tranquilizantes	1.0	0.461-1.526
Anfetaminas	0.2	---
Mariguana	2.0	1.005-2.986
Cocaína	1.4	0.653-2.140
Crack	0.3	---
Alucinógenos	0.4	---
Inhalables	0.1	---
Estimulantes tipo anfetamínico	0.8	---
Cualquier droga	4.3	2.683-5.853
Drogas Médicas	1.2	0.641-1.847
Drogas Ilegales	3.6	2.027-5.129
Consumo último año*		
Cualquier droga	0.6	0.184-0.989
Drogas Médicas	0.5	0.122-0.899
Drogas Ilegales	0.1	---

*No se incluyen las drogas específicas ya que sus porcentajes son cero o cercanos a cero.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD19

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	8.4	7.119-9.727	7.3	6.090-8.590	1.8	1.242-2.419
Noroccidental	9.2	7.784-10.709	9.0	7.495-10.457	1.3	0.697-1.887
Nororiental	9.6	7.796-11.310	8.9	7.234-10.591	2.3	1.373-3.238
Occidental	10.3	8.339-12.227	9.2	7.316-11.148	1.8	1.116-2.392
Centro	6.6	5.108-8.169	6.2	4.709-7.697	1.2	0.560-1.919
Ciudad de México	8.8	7.082-10.535	7.9	6.196-9.631	1.5	0.786-2.204
Centro Sur	7.5	5.816-9.196	6.8	5.173-8.521	1.1	0.583-1.577
Sur	5.3	3.787-6.840	5.0	3.508-6.448	0.9	0.354-1.415
Nacional	7.8	7.168-8.495	7.2	6.568-7.864	1.4	1.130-1.668

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población masculina de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD20

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	13.6	11.116-15.985	13.0	10.572-15.401	2.0	1.080-2.864
Noroccidental	16.5	13.645-19.317	16.3	13.482-19.203	2.0	0.955-3.131
Nororiental	15.5	11.968-19.042	15.0	11.538-18.520	3.2	1.697-4.680
Occidental	17.2	13.818-20.502	16.5	13.183-19.809	1.7	0.841-2.606
Centro	10.6	7.823-13.353	10.1	7.316-12.848	1.7	0.438-3.015
Ciudad de México	12.6	9.638-15.568	11.9	9.006-14.854	1.5	0.609-2.487
Centro Sur	13.6	10.437-16.855	13.0	9.827-16.202	1.5	0.614-2.419
Sur	9.3	6.366-12.148	9.1	6.263-11.981	1.0	0.116-1.948
Nacional	13.0	11.793-14.215	12.5	11.308-13.720	1.8	1.317-2.271

**Incidencia acumulada del consumo de drogas en población femenina de 12 a 65 años
por región**

Cuadro ICD21

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	3.5	2.369-4.629	1.9	0.956-2.880	1.7	0.935-2.453
Noroccidental	1.9	1.056-2.818	1.5	0.781-2.285	0.5	---
Nororiental	3.8	2.121-5.417	3.0	1.371-4.563	1.4	0.362-2.532
Occidental	3.8	2.253-5.325	2.4	1.051-3.693	1.8	0.846-2.720
Centro	3.0	1.741-4.299	2.6	1.417-3.883	0.8	0.175-1.413
Ciudad de México	5.4	3.260-7.458	4.3	2.302-6.221	1.4	0.306-2.587
Centro Sur	1.9	1.096-2.775	1.3	0.575-1.928	0.7	0.137-1.231
Sur	1.5	0.665-2.412	1.0	0.275-1.748	0.7	0.181-1.307
Nacional	3.0	2.459-3.513	2.3	1.760-2.747	1.0	0.743-1.315

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 12 a 17 años por región

Cuadro ICD22

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	3.0	1.477-4.448	2.6	1.172-3.980	0.7	---
Noroccidental	4.2	1.804-6.539	4.2	1.804-6.539	0.2	---
Nororiental	6.3	3.151-9.514	5.4	2.355-8.451	1.6	0.113-3.141
Occidental	3.6	1.892-5.388	3.3	1.640-4.987	0.5	---
Centro	2.8	1.132-4.521	2.2	0.726-3.712	0.6	---
Ciudad de México	4.9	0.443-9.394	4.9	0.443-9.394	--	---
Centro Sur	2.4	1.053-3.803	2.2	0.845-3.515	0.2	---
Sur	2.2	0.481-3.863	2.1	0.372-3.739	0.3	---
Nacional	3.3	2.546-4.110	2.9	2.208-3.672	0.5	0.196-0.856

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 18 a 34 años por región

Cuadro ICD23

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	12.2	9.716-14.591	10.6	8.159-12.971	2.6	1.505-3.738
Noroccidental	11.5	8.965-14.012	11.1	8.520-13.637	1.4	0.465-2.339
Nororiental	13.1	9.660-16.628	12.7	9.256-16.071	2.9	1.044-4.736
Occidental	14.2	10.924-17.571	13.2	10.009-16.474	1.8	0.688-2.937
Centro	11.3	8.193-14.479	10.7	7.628-13.863	2.0	0.384-3.541
Ciudad de México	13.4	9.436-17.334	12.9	8.982-16.773	1.5	0.491-2.531
Centro Sur	10.1	7.004-13.133	9.2	6.219-12.262	1.1	0.186-1.989
Sur	6.0	3.877-8.176	5.8	3.668-7.975	0.7	0.150-1.273
Nacional	11.3	10.018-12.582	10.6	9.364-11.898	1.7	1.159-2.294

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 12 a 25 años por región

Cuadro ICD24

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	7.3	5.418-9.280	6.2	4.341-8.122	1.5	0.688-2.399
Noroccidental	7.5	5.162-9.834	7.3	4.986-9.650	0.7	0.062-1.292
Nororiental	10.9	7.260-14.504	10.5	6.847-14.106	2.2	0.654-3.688
Occidental	8.5	5.626-11.320	7.8	5.056-10.514	1.2	0.114-2.200
Centro	7.9	5.226-10.578	7.1	4.613-9.516	1.3	0.265-2.316
Ciudad de México	8.0	4.595-11.424	7.7	4.309-11.144	0.7	---
Centro Sur	6.8	4.167-9.338	6.0	3.479-8.572	0.7	0.080-1.375
Sur	4.3	2.378-6.137	4.2	2.275-6.034	0.4	---
Nacional	7.6	6.494-8.689	7.0	5.936-8.022	1.1	0.701-1.474

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 26 a 34 años por región

Cuadro ICD25

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	13.8	9.811-17.863	12.4	8.542-16.206	3.1	1.285-4.999
Noroccidental	13.3	9.823-16.859	12.8	9.255-16.375	1.8	0.314-3.347
Nororiental	11.8	7.508-16.140	10.8	6.722-14.953	3.2	1.130-5.278
Occidental	16.9	12.249-21.507	15.8	11.297-20.336	2.0	0.605-3.442
Centro	10.3	6.067-14.495	10.1	5.870-14.333	2.0	---
Ciudad de México	16.3	10.819-21.736	15.7	10.331-21.166	1.8	0.250-3.371
Centro Sur	9.6	5.674-13.460	9.1	5.276-12.975	1.0	---
Sur	6.1	2.887-9.221	5.7	2.568-8.888	1.0	0.105-1.910
Nacional	11.5	9.733-13.285	11.0	9.208-12.744	1.9	0.994-2.834

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 35 a 65 años por región

Cuadro ICD26

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	7.2	5.173-9.241	6.3	4.354-8.259	1.6	0.815-2.302
Noroccidental	9.1	7.190-10.948	8.8	6.933-10.719	1.6	0.554-2.650
Nororiental	7.5	4.993-9.938	6.8	4.406-9.160	2.0	0.827-3.215
Occidental	9.2	6.744-11.582	7.8	5.476-10.081	2.2	1.119-3.270
Centro	3.8	2.312-5.222	3.5	2.126-4.966	0.8	0.213-1.421
Ciudad de México	6.3	4.376-8.260	4.9	3.208-6.587	1.9	0.576-3.153
Centro Sur	7.4	5.214-9.532	6.7	4.542-8.835	1.4	0.563-2.303
Sur	6.0	3.512-8.479	5.4	2.970-7.874	1.3	0.140-2.516
Nacional	6.4	5.614-7.179	5.7	4.988-6.496	1.4	1.094-1.781

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD27

Región	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	5.9	4.807-7.022	3.8	2.825-4.843	0.7	0.217-1.281
Noroccidental	7.4	6.040-8.778	4.9	3.671-6.142	1.2	0.627-1.762
Nororiental	7.4	5.793-9.050	4.7	3.481-5.884	1.1	0.456-1.808
Occidental	6.8	5.461-8.203	4.0	2.859-5.110	0.6	0.226-0.993
Centro	5.2	3.766-6.655	2.4	1.398-3.318	1.2	0.434-1.988
Ciudad de México	6.7	5.118-8.374	2.6	1.716-3.507	0.5	0.117-0.909
Centro Sur	5.7	4.120-7.210	3.5	2.334-4.568	0.5	0.091-0.818
Sur	4.6	3.244-6.032	2.2	1.287-3.207	0.1	---
Nacional	6.0	5.367-6.570	3.3	2.828-3.680	0.8	0.551-1.085

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población masculina de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD28

Región	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	10.9	8.717-13.037	6.5	4.613-8.468	1.4	0.311-2.404
Noroccidental	13.8	11.099-16.490	9.2	6.788-11.656	2.2	1.060-3.251
Nororiental	12.9	9.463-16.258	8.3	5.954-10.615	2.0	0.754-3.342
Occidental	12.1	9.765-14.358	7.5	5.366-9.658	0.9	0.245-1.608
Centro	8.9	6.305-11.437	4.2	2.338-6.155	1.6	0.238-2.991
Ciudad de México	10.8	7.988-13.686	4.0	2.423-5.553	0.8	0.083-1.450
Centro Sur	10.8	7.860-13.816	6.6	4.435-8.812	0.8	0.094-1.504
Sur	8.4	5.742-11.111	4.3	2.395-6.214	--	---
Nacional	10.6	9.499-11.692	5.9	5.111-6.774	1.3	0.781-1.726

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**Incidencia acumulada del consumo de drogas en población femenina de 12 a 65 años
por región**

Cuadro ICD29

Región	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.1	0.533-1.765	1.2	0.361-2.109	0.2	---
Noroccidental	1.0	0.327-1.590	0.5	0.100-0.995	0.2	---
Nororiental	2.1	0.849-3.420	1.2	0.136-2.227	0.2	---
Occidental	1.9	0.641-3.146	0.7	0.167-1.139	0.3	---
Centro	1.9	0.809-2.906	0.6	0.081-1.175	0.8	---
Ciudad de México	3.0	1.459-4.595	1.4	0.349-2.372	0.3	---
Centro Sur	1.0	0.383-1.560	0.6	0.103-1.043	0.1	---
Sur	1.0	0.275-1.748	0.3	---	0.2	---
Nacional	1.6	1.217-2.051	0.7	0.489-0.981	0.4	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 12 a 17 años por región

Cuadro ICD30

Región	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.9	0.745-3.141	0.6	---	0.7	---
Noroccidental	4.2	1.804-6.539	--	---	--	---
Nororiental	5.1	2.097-8.126	2.8	0.637-5.044	1.6	---
Occidental	2.3	0.888-3.627	1.2	0.095-2.296	0.7	0.020-1.468
Centro	2.0	0.521-3.448	0.3	---	--	---
Ciudad de México	2.9	---	0.3	---	--	---
Centro Sur	1.3	0.284-2.286	0.7	---	--	---
Sur	2.1	0.372-3.739	0.8	---	0.2	---
Nacional	2.4	1.719-3.082	0.7	0.396-1.066	0.3	0.080-0.493

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 18 a 34 años por región

Cuadro ICD31

Región	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	8.2	6.083-10.310	5.7	3.621-7.736	1.2	0.079-2.333
Noroccidental	9.1	6.792-11.476	5.7	3.707-7.682	1.8	0.685-2.868
Nororiental	10.6	7.166-13.945	6.9	4.454-9.352	1.5	0.207-2.779
Occidental	9.6	6.803-12.358	6.5	4.139-8.934	0.9	0.079-1.796
Centro	8.9	5.974-11.878	4.7	2.434-6.930	2.6	0.762-4.529
Ciudad de México	11.2	7.636-14.848	5.0	2.822-7.194	1.2	0.161-2.196
Centro Sur	7.6	4.861-10.368	5.2	2.992-7.325	0.7	0.008-1.453
Sur	5.3	3.293-7.399	3.1	1.635-4.541	0.2	---
Nacional	8.7	7.541-9.906	5.2	4.278-6.085	1.5	0.876-2.141

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 12 a 25 años por región

Cuadro ICD32

Región	Mariguana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	5.4	3.547-7.259	2.6	1.247-3.973	1.1	0.044-2.242
Noroccidental	6.5	4.346-8.641	2.4	0.921-3.923	0.6	---
Nororiental	9.4	5.754-13.080	4.9	2.680-7.036	2.1	0.550-3.664
Occidental	5.8	3.492-8.127	2.5	1.122-3.824	0.9	0.130-1.583
Centro	5.7	3.523-7.968	2.5	0.878-4.066	1.3	0.122-2.506
Ciudad de México	6.4	3.170-9.710	1.6	0.118-3.170	0.6	---
Centro Sur	5.1	2.536-7.595	2.8	1.216-4.372	0.4	---
Sur	4.1	2.189-5.946	2.2	0.899-3.453	0.3	---
Nacional	5.9	4.905-6.857	2.7	2.020-3.311	0.9	0.528-1.369

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 26 a 34 años por región

Cuadro ICD33

Región	Marihuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	8.3	5.264-11.331	7.5	3.955-11.041	0.9	---
Noroccidental	10.3	6.848-13.658	7.5	4.336-10.636	2.7	0.825-4.616
Nororiental	8.3	4.558-11.944	7.4	3.820-11.008	0.4	---
Occidental	10.9	7.459-14.391	10.4	6.706-14.071	0.9	---
Centro	8.7	4.630-12.802	4.9	1.400-8.322	2.8	---
Ciudad de México	13.4	8.242-18.472	7.2	3.700-10.630	1.3	---
Centro Sur	6.7	3.259-10.229	5.9	2.883-8.894	0.7	---
Sur	4.9	2.038-7.788	2.9	0.761-4.957	--	---
Nacional	8.7	7.044-10.353	6.2	4.733-7.587	1.5	0.475-2.573

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Incidencia acumulada del consumo de drogas en población de 35 a 65 años por región

Cuadro ICD34

Región	Marihuana		Cocaína		Estimulantes tipo anfetamínico	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	5.4	3.555-7.271	3.4	1.959-4.931	0.4	0.063-0.653
Noroccidental	7.0	5.367-8.689	6.0	4.151-7.836	1.1	0.258-1.948
Nororiental	5.4	3.394-7.445	3.3	1.489-5.187	0.6	---
Occidental	6.0	4.385-7.699	2.7	1.556-3.780	0.2	---
Centro	3.0	1.660-4.388	1.0	0.286-1.762	0.4	---
Ciudad de México	4.3	2.645-5.942	1.4	0.553-2.226	0.1	---
Centro Sur	5.8	3.764-7.809	3.1	1.604-4.544	0.4	---
Sur	5.1	2.821-7.319	2.0	0.411-3.602	--	---
Nacional	4.8	4.141-5.509	2.5	1.983-2.945	0.4	0.181-0.600

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD35

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	2.0	1.321-2.773	1.6	0.926-2.320	0.6	0.288-0.847
Noroccidental	2.9	2.055-3.773	2.8	1.945-3.660	0.5	0.111-0.929
Nororiental	3.1	1.966-4.275	2.4	1.348-3.474	1.2	0.500-1.807
Occidental	2.0	1.365-2.627	1.5	0.921-2.014	0.6	0.252-1.006
Centro	1.5	0.837-2.131	1.2	0.591-1.784	0.3	0.042-0.653
Ciudad de México	2.1	1.186-2.976	1.7	0.874-2.575	0.4	0.016-0.699
Centro Sur	1.5	0.717-2.200	1.3	0.604-2.069	0.1	---
Sur	0.8	0.311-1.194	0.6	0.145-0.963	0.2	0.002-0.395
Nacional	1.8	1.529-2.120	1.5	1.229-1.782	0.4	0.298-0.564

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD36

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	3.2	1.765-4.610	3.0	1.588-4.340	0.5	0.119-0.858
Noroccidental	5.3	3.557-7.034	5.3	3.557-7.034	0.8	0.043-1.583
Nororiental	5.3	3.132-7.520	4.5	2.424-6.630	1.7	0.554-2.844
Occidental	3.2	2.018-4.316	2.7	1.619-3.811	0.7	0.150-1.170
Centro	2.1	1.000-3.223	1.7	0.684-2.670	0.4	---
Ciudad de México	3.3	1.694-4.923	2.6	1.141-4.115	0.7	---
Centro Sur	2.7	1.270-4.228	2.7	1.270-4.228	--	---
Sur	1.0	0.224-1.767	0.9	0.102-1.603	0.1	---
Nacional	3.0	2.435-3.516	2.6	2.126-3.147	0.5	0.308-0.765

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD37

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales		Drogas médicas	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.0	0.403-1.501	0.3	---	0.6	0.241-1.046
Noroccidental	0.5	0.031-0.984	0.3	---	0.2	---
Nororiental	1.0	0.119-1.835	0.4	---	0.6	---
Occidental	0.9	0.238-1.541	0.3	---	0.6	0.070-1.130
Centro	0.9	0.170-1.650	0.7	0.031-1.448	0.3	---
Ciudad de México	1.0	0.030-1.902	0.9	---	0.1	---
Centro Sur	0.3	---	0.1	---	0.2	---
Sur	0.5	0.064-0.976	0.3	---	0.3	---
Nacional	0.7	0.470-1.023	0.4	0.200-0.692	0.3	0.187-0.478

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años por región

Cuadro ICD38

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.5	0.353-2.599	1.2	0.145-2.267
Noroccidental	2.3	0.536-4.082	2.3	0.536-4.082
Nororiental	4.5	1.623-7.462	4.0	1.202-6.839
Occidental	1.6	0.357-2.846	1.6	0.357-2.846
Centro	1.1	0.071-2.109	1.1	0.071-2.109
Ciudad de México	2.6	---	2.6	---
Centro Sur	0.5	0.006-0.983	0.4	---
Sur	1.9	0.231-3.547	1.8	0.123-3.421
Nacional	1.6	1.093-2.188	1.5	1.001-2.081

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años por región

Cuadro ICD39

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	3.1	1.430-4.796	2.4	0.779-4.048
Noroccidental	4.0	2.314-5.697	3.7	2.064-5.391
Nororiental	4.6	2.105-7.021	3.2	0.959-5.495
Occidental	2.6	1.354-3.859	2.0	0.861-3.085
Centro	2.5	1.026-4.056	2.0	0.571-3.330
Ciudad de México	3.8	1.784-5.746	3.4	1.516-5.378
Centro Sur	2.7	0.955-4.350	2.4	0.735-4.060
Sur	0.6	---	0.5	---
Nacional	2.8	2.164-3.479	2.3	1.681-2.907

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años por región

Cuadro ICD40

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	2.5	1.052-4.041	2.1	0.649-3.595
Noroccidental	3.5	1.834-5.072	3.3	1.678-4.868
Nororiental	5.7	2.834-8.592	4.6	1.912-7.319
Occidental	2.0	0.841-3.060	1.7	0.765-2.578
Centro	2.7	1.181-4.198	2.1	0.778-3.502
Ciudad de México	3.6	1.242-5.962	3.3	0.996-5.642
Centro Sur	2.0	0.536-3.469	1.9	0.427-3.352
Sur	1.4	0.339-2.370	1.3	0.288-2.315
Nacional	2.7	2.091-3.391	2.4	1.752-2.966

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años por región

Cuadro ICD41

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	2.8	0.699-4.855	1.9	---
Noroccidental	3.7	1.245-6.062	3.4	1.041-5.795
Nororiental	2.4	0.545-4.257	1.3	---
Occidental	3.1	1.010-5.178	2.3	0.346-4.216
Centro	1.1	---	0.9	---
Ciudad de México	3.3	0.790-5.755	3.1	0.639-5.569
Centro Sur	1.9	0.194-3.510	1.4	---
Sur	0.3	---	--	---
Nacional	1.9	1.265-2.625	1.5	0.872-2.151

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años por región

Cuadro ICD42

Región	Cualquier droga		Drogas ilegales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.3	0.652-1.989	1.1	0.449-1.715
Noroccidental	2.1	1.085-3.196	2.1	1.085-3.196
Nororiental	1.3	0.345-2.275	1.1	0.165-2.032
Occidental	1.6	0.768-2.375	0.9	0.359-1.505
Centro	0.7	0.063-1.240	0.5	---
Ciudad de México	0.7	0.033-1.300	0.2	---
Centro Sur	0.8	---	0.8	---
Sur	0.4	---	0.1	---
Nacional	1.0	0.693-1.267	0.8	0.507-1.025

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD43

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.0	0.495-1.532	0.8	0.207-1.330
Noroccidental	2.3	1.548-3.005	1.0	0.363-1.686
Nororiental	1.9	1.031-2.839	1.1	0.452-1.751
Occidental	1.3	0.784-1.812	0.5	0.154-0.810
Centro	1.0	0.450-1.594	0.2	---
Ciudad de México	1.5	0.700-2.380	0.1	---
Centro Sur	0.9	0.228-1.481	0.8	0.262-1.329
Sur	0.5	0.138-0.918	0.2	---
Nacional	1.2	0.957-1.461	0.5	0.351-0.643

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población masculina de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD44

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.7	0.753-2.744	1.3	0.257-2.429
Noroccidental	4.3	2.817-5.775	2.0	0.722-3.356
Nororiental	3.8	1.999-5.619	2.2	0.895-3.574
Occidental	2.5	1.471-3.576	0.7	0.144-1.227
Centro	1.7	0.659-2.643	0.2	---
Ciudad de México	2.4	0.911-3.841	0.2	---
Centro Sur	1.8	0.488-3.105	1.6	0.543-2.681
Sur	0.8	0.053-1.545	0.2	---
Nacional	2.2	1.717-2.657	0.9	0.636-1.211

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población femenina de 12 a 65 años por región

Cuadro ICD45

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.3	---	0.2	---
Noroccidental	0.2	---	--	---
Nororiental	0.1	---	--	---
Occidental	0.1	---	0.3	---
Centro	0.4	---	0.1	---
Ciudad de México	0.8	---	0.1	---
Centro Sur	--	---	0.1	---
Sur	0.3	---	0.1	---
Nacional	0.3	0.084-0.502	0.1	0.027-0.169

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 17 años por región

Cuadro ICD46

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.8	0.023-1.550	0.3	---
Noroccidental	2.3	0.536-4.082	--	---
Nororiental	3.2	0.784-5.714	1.0	---
Occidental	1.4	0.203-2.559	0.8	---
Centro	1.0	0.013-2.036	0.3	---
Ciudad de México	2.1	---	0.3	---
Centro Sur	0.2	---	0.2	---
Sur	1.6	0.126-3.130	0.8	---
Nacional	1.3	0.816-1.835	0.4	0.160-0.641

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 18 a 34 años por región

Cuadro ICD47

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.4	0.270-2.531	1.2	---
Noroccidental	2.9	1.483-4.328	1.4	0.133-2.663
Nororiental	2.8	0.908-4.662	1.6	0.274-2.924
Occidental	1.6	0.600-2.694	0.8	0.071-1.460
Centro	1.8	0.434-3.150	0.3	---
Ciudad de México	3.1	1.215-5.052	0.1	---
Centro Sur	1.5	0.089-2.878	1.6	0.325-2.873
Sur	0.5	---	--	---
Nacional	1.9	1.295-2.423	0.8	0.476-1.106

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 12 a 25 años por región

Cuadro ICD48

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.4	0.316-2.577	0.9	---
Noroccidental	2.8	1.389-4.292	0.7	---
Nororiental	4.0	1.694-6.233	1.5	0.160-2.826
Occidental	1.2	0.446-2.039	0.7	0.072-1.386
Centro	1.9	0.592-3.276	0.4	---
Ciudad de México	2.9	0.607-5.159	0.1	---
Centro Sur	1.4	0.072-2.727	1.2	---
Sur	1.2	0.270-2.202	0.4	---
Nacional	2.0	1.417-2.550	0.7	0.405-1.031

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 26 a 34 años por región

Cuadro ICD49

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.7	---	1.1	---
Noroccidental	2.5	0.482-4.540	1.7	---
Nororiental	1.0	---	1.3	---
Occidental	2.3	0.346-4.216	0.9	---
Centro	0.9	---	--	---
Ciudad de México	2.8	0.401-5.293	0.3	---
Centro Sur	0.3	---	1.1	---
Sur	--	---	--	---
Nacional	1.2	0.566-1.740	0.6	0.259-0.923

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Consumo de drogas en el último año en la población de 35 a 65 años por región

Cuadro ICD50

Región	Marihuana		Cocaína	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.8	0.214-1.301	0.5	---
Noroccidental	1.7	0.692-2.690	1.1	0.223-1.900
Nororiental	0.7	---	0.7	---
Occidental	0.9	0.359-1.505	0.1	---
Centro	0.3	---	--	---
Ciudad de México	0.2	---	0.1	---
Centro Sur	0.6	---	0.3	---
Sur	0.1	---	--	---
Nacional	0.6	0.352-0.779	0.3	0.132-0.398

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

Bloque 4: Cuadros de Tratamiento

En este bloque se presentan los siguientes indicadores, por sexo y grupos de edad:

Tipo de tratamiento por consumo de drogas, profesionales que consultó la población por consumo de drogas, razones para no consultar algún profesional de la salud por uso de drogas, población que conoce la “Campana Para una Nueva Vida”, población que ha participado en algún taller o curso de prevención de las adicciones de la campaña, población que considera útil la información recibida en la campaña, población que considera que su actitud sobre las adicciones cambió después de participar en la campaña; así como la población que conoce los “Centros Nueva Vida”, y conoce el “Centro Nueva Vida” más cercano a su domicilio. También incluye información acerca de la población que ha recibido o conoce a alguien que ha recibido atención en los “Centros Nueva Vida”, y la población que considera que la atención recibida en los centros es de calidad.

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años, según sexo

Cuadro CT1

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	265 943		39 678		305 621	
	N	%	N	%	N	%
Tratamiento de desintoxicación	177 421	66.7	21 822	55.0	199 243	65.2
Tratamiento residencial	84 156	31.6	9 374	23.6	93 531	30.6
Tratamiento ambulatorio	28 317	10.6	6 395	16.1	34 712	11.4
Tratamiento por internet	10 919	4.1	6 125	15.4	17 044	5.6
Tratamiento en una clínica de metadona	22 389	8.4	258	.7	22 647	7.4
Tratamiento en un anexo	108 361	40.7	11 473	28.9	119 834	39.2

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su uso de drogas según sexo.

Tipo de tratamiento de los usuarios de drogas de 12 a 65 años según sexo

Cuadro CT2

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	265 943		39 678		305 621	
	N	%	N	%	N	%
Completo con profesionista	57 687	21.7	12 129	30.6	69 816	22.8
Parcial con profesionista	74 021	27.8	18 164	45.8	92 185	30.2
Autoayuda o ayuda mutua	60 381	22.7	8 354	21.1	68 735	22.5
Otro tipo de tratamiento	73 855	27.8	1 031	2.6	74 885	24.5

Porcentajes obtenidos de la población que ha recibido tratamiento por su uso de drogas según sexo.

**Población de 12 a 65 años que acudió a consultar algún profesional de la salud
por su consumo de drogas según sexo**

Cuadro CT3

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Profesional al que acudió						
Psiquiatra	78 914	29.7	14 925	37.6	93 838	30.7
Médico familiar o general	40 532	15.2	--	--	40 532	13.3
Otro médico especialista	3 758	1.4	--	--	3 758	1.2
Psicólogo	71 244	26.8	16 929	42.7	88 172	28.9
Trabajadora Social	46 429	17.5	6 970	17.6	53 399	17.5
Enfermera u otro/a profesional de la salud en un Centro de Salud	45 585	17.1	2 405	6.1	47 989	15.7
Terapeuta u otro/a profesional de la Salud de forma independiente	56 140	21.1	6 395	16.1	62 535	20.5
Consejero espiritual	56 627	21.3	3 262	8.2	59 890	19.6
Grupo de autoayuda o ayuda mutua	139 734	52.5	23 151	58.3	162 885	53.3
Médico tradicional	11 389	4.3	--	--	11 389	3.7
Consultó a algún especialista	201 317	75.7	38 647	97.4	239 964	78.5
No consultó a algún especialista	64 626	24.3	1 031	2.6	65 657	21.5

Porcentajes obtenidos de los usuarios de drogas para cada tipo de profesional según sexo.

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas, población de 12 a 65 años

Cuadro CT4

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	2 324 771	58.3	508 895	49.1	2 833 666	56.4
Pensó que podría resolverlo solo	1 450 400	36.4	320 897	31.0	1 771 297	35.2
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	638 773	16.0	123 942	12.0	762 715	15.2
No sabe a dónde acudir	350 184	8.8	52 201	5.0	402 385	8.0
No acudió por vergüenza	379 545	9.5	29 506	2.8	409 051	8.1
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	193 943	4.9	29 506	2.8	223 449	4.4
No cuenta con suficientes recursos económicos	233 899	5.9	26 959	2.6	260 859	5.2
Su seguro médico no cubre este tratamiento	134 905	3.4	15 483	1.5	150 388	3.0
El problema se acabó solo	790 341	19.8	95 275	9.2	885 616	17.6
Pensó que el problema mejoraría solo	886 429	22.2	173 044	16.7	1 059 473	21.1
El tratamiento le costaba demasiado dinero	174 735	4.4	34 175	3.3	208 910	4.2
Le preocupa lo que la gente piense de usted	242 881	6.1	32 470	3.1	275 351	5.5
Pensó que le tomaría mucho tiempo	272 256	6.8	69 935	6.8	342 191	6.8
No podía conseguir una cita	99 249	2.5	19 535	1.9	118 784	2.4
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	270 256	6.8	51 464	5.0	321 719	6.4
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	127 189	3.2	15 704	1.5	142 893	2.8
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	67 379	1.7	13 682	1.3	81 061	1.6
El problema no le molesta mucho	571 997	14.3	94 064	9.1	666 061	13.3
Tenía problemas para acudir al tratamiento tales como el transporte, el cuidado de sus hijos o los horarios	137 816	3.5	13 682	1.3	151 498	3.0

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas, según sexo.

Razones para no consultar a un profesional por uso de drogas, población de 12 a 65 años

Cuadro CT5

N por subgrupo	12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%
Usted no consultó a un profesional por su uso de drogas porque:						
Pensó que no tenía un problema	1 133 737	62.7	790 515	54.9	909 414	51.2
Pensó que podría resolverlo solo	746 661	41.3	484 251	33.6	540 386	30.4
Creyó que el tratamiento no le ayudaría	328 832	18.2	222 414	15.4	211 469	11.9
No sabe a dónde acudir	131 037	7.2	106 931	7.4	164 417	9.3
No acudió por vergüenza	137 910	7.6	166 813	11.6	104 327	5.9
Los centros de tratamiento le quedan lejos de su lugar de residencia	82 883	4.6	62 563	4.3	78 003	4.4
No cuenta con suficientes recursos económicos	74 194	4.1	89 166	6.2	97 499	5.5
Su seguro médico no cubre este tratamiento	35 512	2.0	66 559	4.6	48 317	2.7
El problema se acabó solo	336 388	18.6	248 542	17.2	300 686	16.9
Pensó que el problema mejoraría solo	338 518	18.7	376 287	26.1	344 668	19.4
El tratamiento le costaba demasiado dinero	72 726	4.0	70 996	4.9	65 187	3.7
Le preocupa lo que la gente piense de usted	104 451	5.8	124 386	8.6	46 514	2.6
Pensó que le tomaría mucho tiempo	112 781	6.2	126 412	8.8	102 998	5.8
No podía conseguir una cita	44 778	2.5	31 625	2.2	42 381	2.4
No deseaba ser internado en contra de su voluntad	159 723	8.8	113 873	7.9	48 123	2.7
No estaba satisfecho con los servicios disponibles	32 798	1.8	58 161	4.0	51 934	2.9
Había recibido tratamiento antes y no había funcionado	20 493	1.1	33 887	2.4	26 681	1.5
El problema no le molesta mucho	205 924	11.4	302 942	21.0	157 196	8.9
Tenía problemas para acudir al tratamiento tales como el transporte, el cuidado de sus hijos o los horarios	48 454	2.7	37 823	2.6	65 221	3.7

Porcentajes obtenidos de la población que no ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas según edad.

**Población de 12 a 65 años que conoce la “Campaña Para una Nueva Vida”,
según sexo y edad**

Cuadro CT8

Sexo/Edad	N por grupo	N	%
Hombres			
12-17	6 807 478	680 856	10.0
18-34	15 321 907	1 731 346	11.3
35-65	16 378 428	1 520 206	9.3
Subtotal	38 507 813	3 932 408	10.2
Mujeres			
12-17	6 630 096	679 132	10.2
18-34	16 383 671	1 528 207	9.3
35-65	18 099 630	1 659 126	9.2
Subtotal	41 113 398	3 866 465	9.4
Total	79 621 211	7 798 873	9.8

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Población de 12 a 65 años que ha participado en algún taller o curso de prevención de las adicciones de la “Campana Para una Nueva Vida”, según sexo y edad

Cuadro CT9

Sexo/Edad	N por grupo	N	%
Hombres			
12-17	680 856	21 269	3.1
18-34	1 731 346	68 852	4.0
35-65	1 520 206	60 540	4.0
Subtotal	3 932 408	150 660	3.8
Mujeres			
12-17	679 132	7 046	1.0
18-34	1 528 207	38 398	2.5
35-65	1 659 126	57 898	3.5
Subtotal	3 866 465	103 342	2.7
Total	7 798 873	254 002	3.3

Porcentajes obtenidos de la población que ha participado en la campaña según sexo y edad.

Población de 12 a 65 años que conoce los “Centros Nueva Vida”, según sexo y edad

Cuadro CT10

Sexo/Edad	N por grupo	N	%
Hombres			
12-17	6 807 478	572 626	8.4
18-34	15 321 907	909 415	5.9
35-65	16 378 428	744 041	4.5
Subtotal	38 507 813	2 226 081	5.8
Mujeres			
12-17	6 630 096	259 823	3.9
18-34	16 383 671	885 472	5.4
35-65	18 099 630	657 630	3.6
Subtotal	41 113 398	1 802 925	4.4
Total	79 621 211	4 029 006	5.1

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Población de 12 a 65 años que conoce el “Centro Nueva Vida” más cercano a su domicilio,
según sexo y edad**

Cuadro CT11

Sexo/Edad	N por grupo	N	%
Hombres			
12-17	572 626	134 948	23.6
18-34	909 415	325 811	35.8
35-65	744 041	280 107	37.6
Subtotal	2 226 081	740 866	33.3
Mujeres			
12-17	259 823	53 403	20.6
18-34	885 472	284 922	32.2
35-65	657 630	265 360	40.4
Subtotal	1 802 925	603 686	33.5
Total	4 029 006	1 344 552	33.4

Porcentajes obtenidos de la población que conoce los centros nueva vida según sexo y edad.

Población de 12 a 65 años que ha recibido o conoce a alguien que ha recibido atención en los “Centros Nueva Vida”, según sexo y edad

Cuadro CT12

Sexo/Edad	N por grupo	N	%
Hombres			
12-17	572 626	80 099	14.0
18-34	909 415	161 841	17.8
35-65	744 041	130 029	17.5
Subtotal	2 226 081	371 968	16.7
Mujeres			
12-17	259 823	26 218	10.1
18-34	885 472	118 162	13.3
35-65	657 630	129 313	19.7
Subtotal	1 802 925	273 693	15.2
Total	4 029 006	645 661	16.0

Porcentajes obtenidos de la población que conoce los centros nueva vida según sexo y edad.

**Conocimiento de la “Campaña Para una Nueva Vida”
Población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CT13

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Usted se enteró de la campaña a través de:						
Ha escuchado de ella pero no sabe en qué consiste	652 147	16.6	587 661	15.2	1 239 808	15.9
Televisión y/o radio	2 628 872	66.9	2 565 875	66.4	5 194 747	66.6
Amigos o familiares	402 212	10.2	158 367	4.1	560 578	7.2
Material de difusión	388 769	9.9	338 530	8.8	727 299	9.3
DIF	2 435	.1	25 128	.6	27 563	.4
Escuela	185 856	4.7	340 121	8.8	525 977	6.7
Trabajo	197 267	5.0	115 843	3.0	313 110	4.0
Servicio Militar Nacional	11 672	.3	22 156	.6	33 828	.4
SEDESOL	65 271	1.7	210 060	5.4	275 331	3.5
Otro medio	105 394	2.7	118 556	3.1	223 951	2.9

Porcentajes obtenidos de la población que conoce la campaña según sexo.

**Conocimiento de la “Campaña Para una Nueva Vida”
Población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CT14

N por subgrupo	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%
	1 359 988		3 259 553		3 179 332	
Usted se enteró de la campaña a través de:						
Ha escuchado de ella pero no sabe en qué consiste	151 953	11.2	510 120	15.6	577 735	18.2
Televisión y/o radio	862 400	63.4	2 335 745	71.7	1 996 602	62.8
Amigos o familiares	101 691	7.5	165 718	5.1	293 170	9.2
Material de difusión	82 551	6.1	252 823	7.8	391 925	12.3
DIF	2 435	.2	8 847	.3	16 281	.5
Escuela	269 752	19.8	164 494	5.0	91 731	2.9
Trabajo	8 477	.6	159 457	4.9	145 177	4.6
Servicio Militar Nacional	5 438	.4	12 557	.4	15 833	.5
SEDESOL	22 755	1.7	105 221	3.2	147 356	4.6
Otro medio	25 864	1.9	48 439	1.5	149 648	4.7

Porcentajes obtenidos de la población que conoce la campaña según edad.

Bloque 5: Cuadros Tratamiento por Regiones

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por región, sexo y grupos de edad:

Población que conoce la “Campaña Para una Nueva Vida”, así como la población que conoce los “Centros Nueva Vida”, y población que ha recibido o conoce a alguien que ha recibido atención en los “Centros Nueva Vida”.

**Población de 12 a 65 años que conoce la “Campaña Para una Nueva Vida”,
según sexo**

Cuadro CTR1

Región	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	8.1	7.8	7.9
Noroccidental	7.8	8.9	8.4
Nororiental	10.4	10.1	10.2
Occidental	16.3	16.4	16.3
Centro	12.1	8.5	10.2
Ciudad de México	6.3	9.6	8.1
Centro Sur	8.3	8.6	8.4
Sur	8.0	6.9	7.4
Nacional	10.2	9.4	9.8

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Población de 12 a 65 años que conoce la “Campaña Para una Nueva Vida”,
según edad**

Cuadro CTR2

	12-17 años	18-34 años	35-65 años
Región	%	%	%
Norcentral	10.0	7.4	7.5
Noroccidental	7.2	8.5	8.6
Nororiental	13.7	11.0	8.3
Occidental	16.0	16.9	15.9
Centro	8.8	10.8	10.2
Ciudad de México	9.5	9.6	6.6
Centro Sur	10.1	8.8	7.4
Sur	7.8	7.4	7.2
Nacional	10.1	10.3	9.2

Porcentajes obtenidos según edad.

Población de 12 a 65 años que conoce los “Centros Nueva Vida”, según sexo

Cuadro CTR3

Región	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	9.6	6.1	7.8
Noroccidental	3.7	5.4	4.5
Nororiental	9.9	5.6	7.7
Occidental	4.8	4.7	4.8
Centro	6.5	4.2	5.3
Ciudad de México	4.1	2.9	3.5
Centro Sur	4.1	4.0	4.1
Sur	4.0	3.3	3.6
Nacional	5.8	4.4	5.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

Población de 12 a 65 años que conoce los “Centros Nueva Vida”, según edad

Cuadro CTR4

Región	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Norcentral	8.6	8.2	7.2
Noroccidental	3.4	5.8	3.9
Nororiental	12.8	7.0	6.6
Occidental	6.8	5.2	3.5
Centro	6.5	6.7	3.4
Ciudad de México	6.6	2.6	3.4
Centro Sur	2.3	4.9	4.1
Sur	6.3	3.6	2.5
Nacional	6.2	5.7	4.1

Porcentajes obtenidos según edad.

Población de 12 a 65 años que ha recibido o conoce a alguien que ha recibido atención en los “Centros Nueva Vida”, según sexo

Cuadro CTR5

Región	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	16.0	14.0	15.2
Noroccidental	13.5	13.1	13.3
Nororiental	10.6	20.1	14.1
Occidental	33.0	16.6	24.7
Centro	15.6	9.6	13.1
Ciudad de México	18.1	24.7	21.0
Centro Sur	16.4	19.5	18.0
Sur	19.3	15.9	17.7
Nacional	16.7	15.2	16.0

Porcentajes obtenidos de la población que conoce los centros nueva vida según sexo.

Población de 12 a 65 años que ha recibido o conoce a alguien que ha recibido atención en los “Centros Nueva Vida”, según edad

Cuadro CTR6

Región	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Norcentral	10.3	19.7	12.8
Noroccidental	--	19.0	9.7
Nororiental	7.2	14.5	18.4
Occidental	16.0	25.6	30.1
Centro	14.7	16.3	6.0
Ciudad de México	11.2	16.6	28.4
Centro Sur	28.2	1.5	33.2
Sur	11.6	17.6	24.9
Nacional	12.8	15.6	18.5

Porcentajes obtenidos de la población que conoce los centros nueva vida según edad.

Bloque 6: Intervalos de Confianza de Cuadros de Tratamiento

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por sexo y grupos de edad con sus respectivos intervalos de confianza:

Población que conoce la “Campana para una Nueva Vida”, población que conoce los “Centros Nueva Vida”.

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE TRATAMIENTO**

Población de 12 a 65 años que conoce la “Campana Para una Nueva Vida” según sexo y edad

Cuadro ICCT1

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-17	10.0	7.985-12.018
18-34	11.3	9.308-13.292
35-65	9.3	7.625-10.939
Subtotal Hombres	10.2	8.904-11.520
Mujeres		
12-17	10.2	8.341-12.145
18-34	9.3	7.882-10.773
35-65	9.2	7.835-10.499
Subtotal Mujeres	9.4	8.479-10.330
Total 12-17	10.1	8.665-11.577
Total 18-34	10.3	9.046-11.515
Total 35-65	9.2	8.067-10.375
Total	9.8	8.955-10.635

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE TRATAMIENTO**

Población de 12 a 65 años que conoce los “Centros Nueva Vida” según sexo y edad

Cuadro ICCT2

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-17	8.4	6.423-10.400
18-34	5.9	4.586-7.284
35-65	4.5	3.495-5.590
Subtotal Hombres	5.8	4.881-6.680
Mujeres		
12-17	3.9	2.926-4.912
18-34	5.4	4.107-6.702
35-65	3.6	2.834-4.433
Subtotal Mujeres	4.4	3.686-5.084
Total 12-17	6.2	5.016-7.374
Total 18-34	5.7	4.728-6.594
Total 35-65	4.1	3.403-4.727
Total	5.1	4.478-5.642

Bloque 7: Tendencias de indicadores sobre percepción, exposición a la prevención y conducta antisocial.

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por sexo y grupos de edad:

Población que ha sido expuesta a la prevención, conducta antisocial y delincuencia, percepción de la comunidad sobre la venta de drogas en las escuelas o fuera de ellas, violencia y victimización en la colonia, venta de drogas en la vía pública o en las tienditas, creencias sobre la rehabilitación para las personas con dependencia. Asimismo, se presenta la comparación de estos indicadores con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad

Cuadro TI1

Sexo/Edad	ENA 2008		ENA 2011	
	N	%	N	%
Hombres				
12-17	3 412 802	50.4	4 364 306	64.1
18-34	3 971 195	26.9	5 979 126	39.0
35-65	3 060 355	21.0	5 372 598	32.8
Subtotal	10 444 352	28.9	15 716 030	40.8
Mujeres				
12-17	4 002 717	58.0	4 667 989	70.4
18-34	4 967 884	30.7	7 538 271	46.0
35-65	3 662 956	22.9	6 588 652	36.4
Subtotal	12 633 557	32.4	18 794 912	45.7
Nacional	23 077 909	30.7	34 510 942	43.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención según sexo y edad

Cuadro TI2

Sexo/Edad	ENA 2008		ENA 2011	
	N	%	N	%
Hombres				
12-25	5 830 283	40.6	8 158 484	54.5
26-34	1 553 714	21.7	2 184 948	30.6
35-65	3 060 355	21.0	5 372 598	32.8
Subtotal	10 444 352	28.9	15 716 030	40.8
Mujeres				
12-25	6 827 080	45.7	8 769 328	59.4
26-34	2 143 521	26.3	3 436 933	41.7
35-65	3 662 956	22.9	6 588 652	36.4
Subtotal	12 633 557	32.4	18 794 912	45.7
Nacional	23 077 909	30.7	34 510 942	43.3

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Conducta antisocial y delincuencia en población de 12 a 65 años según sexo

Cuadro TI3

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	537 863	1.5	178 221	.5	716 084	1.0	760 892	2.0	405 673	1.0	1 166 565	1.5
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	347 127	1.0	120 831	.3	467 958	.6	363 945	.9	153 652	.4	517 597	.7
Vendido drogas	189 005	.5	38 474	.1	227 479	.3	132 092	.3	11 887	***	143 979	.2
Tomado parte en riñas o peleas	1 399 925	3.9	451 866	1.1	1 851 791	2.5	2 243 135	5.8	737 812	1.8	2 980 947	3.7
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	238 737	.7	319 810	.8	558 547	.7	135 942	.4	20 094	***	156 036	.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Conducta antisocial y delincuencia en población de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI4

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	307 757	2.3	251 731	.8	156 596	.5	558 571	4.2	449 458	1.4	158 535	.5
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	106 438	.8	230 323	.7	131 197	.4	147 463	1.1	291 896	.9	78 238	.2
Vendido drogas	33 656	.2	142 456	.5	51 367	.2	17 176	.1	118 825	.4	7 978	***
Tomado parte en riñas o peleas	674 921	4.9	806 541	2.6	370 329	1.2	1 176 200	8.8	1 415 007	4.5	389 741	1.1
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	96 614	.7	239 774	.8	222 159	.7	67 222	.5	77 493	.2	11 322	***

Porcentajes obtenidos según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Conducta antisocial y delincuencia en población masculina de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI5

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	230 539	3.4	187 557	1.3	119 767	.8	343 717	5.1	320 187	2.1	96 988	.6
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	64 704	.9	193 975	1.3	88 448	.6	88 649	1.3	244 894	1.6	30 401	.2
Vendido drogas	26 674	.4	117 673	.8	44 658	.3	14 829	.2	112 886	.7	4 377	***
Tomado parte en riñas o peleas	494 588	7.2	619 632	4.3	285 705	2.0	841 180	12.4	1 115 351	7.3	286 604	1.8
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	48 962	.7	91 591	.6	98 184	.7	57 627	.8	76 744	.5	1 571	***

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Conducta antisocial y delincuencia en población femenina de 12 a 65 años según edad

Cuadro TI6

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, usted ha:												
Tomado dinero o cosas que no le pertenecen	77 218	1.1	64 174	.4	36 829	.2	214 854	3.2	129 272	.8	61 547	.3
Atacado a alguien con arma, cuchillo, palo, navaja, etc.	41 734	.6	36 348	.2	42 749	.3	58 814	.9	47 002	.3	47 837	.3
Vendido drogas	6 982	.1	24 783	.1	6 709	***	2 347	***	5 939	***	3 601	***
Tomado parte en riñas o peleas	180 333	2.6	186 909	1.1	84 624	.5	335 019	5.1	299 655	1.8	103 137	.6
Usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona	47 652	.7	148 183	.9	123 975	.8	9 595	.1	748	***	9 751	.1

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre conductas antisociales en su comunidad, según sexo

Cuadro TI7

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, en su colonia:												
Se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas	6 854 455	24.7	6 639 817	22.3	13 494 272	23.4	9 193 941	23.9	9 043 866	22.0	18 237 807	22.9
Alguien amenazó con armas a otras personas	5 988 788	20.4	6 208 526	19.3	12 197 314	19.8	10 129 203	26.3	8 832 068	21.5	18 961 271	23.8
Alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales usando fuerza física o bajo amenazas de herirle o matarle	1 923 936	6.7	2 321 982	7.2	4 245 918	7.0	2 304 479	6.0	2 238 960	5.4	4 543 439	5.7
Alguien atacó con violencia a otros(as)	6 940 006	23.3	6 966 807	21.2	13 906 813	22.2	13 014 933	33.8	12 475 352	30.3	25 490 285	32.0
Se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas	6 925 599	23.9	6 552 463	20.9	13 478 062	22.4	10 751 258	27.9	9 377 110	22.8	20 128 368	25.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre conductas antisociales en su comunidad según edad

Cuadro TI8

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, en su colonia:												
Se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas	2 385 935	21.6	5 717 116	24.2	5 391 221	23.5	3 009 962	22.4	7 319 485	23.1	7 908 361	22.9
Alguien amenazó con armas a otras personas	1 993 789	17.4	5 649 516	22.2	4 554 009	18.4	2 812 908	20.9	8 404 726	26.5	7 743 636	22.5
Alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales usando fuerza física o bajo amenazas de herirle o matarle	691 448	6.1	1 960 196	7.8	1 594 274	6.5	670 118	5.0	2 011 725	6.3	1 861 597	5.4
Alguien atacó con violencia a otros(as)	2 544 857	21.8	6 331 609	24.5	5 030 347	20.0	4 186 820	31.2	11 175 695	35.2	10 127 770	29.4
Se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas	2 138 989	19.0	6 094 552	24.5	5 244 521	21.8	2 782 863	20.7	8 569 622	27.0	8 775 884	25.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Percepción de la población masculina sobre conductas antisociales en su comunidad según edad

Cuadro TI9

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, en su colonia:												
Se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas	1 202 041	21.8	3 061 844	27.3	2 590 570	23.4	1 613 130	23.7	3 779 800	24.7	3 801 012	23.2
Alguien amenazó con armas a otras personas	1 009 334	17.7	2 873 186	24.1	2 106 268	18.0	1 485 026	21.8	4 770 159	31.1	3 874 017	23.7
Alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales usando fuerza física o bajo amenazas de herirle o matarle	301 467	5.3	1 008 695	8.7	613 774	5.3	323 658	4.8	1 034 065	6.7	946 757	5.8
Alguien atacó con violencia a otros(as)	1 301 740	22.6	3 278 634	27.1	2 359 632	19.8	2 229 598	32.8	5 836 839	38.1	4 948 496	30.2
Se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas	1 131 719	20.1	3 229 807	27.5	2 564 073	22.1	1 472 909	21.6	4 731 071	30.9	4 547 278	27.8

Porcentajes obtenidos de la población masculina según edad.

Percepción de la población masculina sobre conductas antisociales en su comunidad según edad

Cuadro TI10

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años		12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En los últimos 12 meses, en su colonia:												
Se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas	1 183 894	21.5	2 655 272	21.4	2 800 651	23.6	1 396 832	21.1	3 539 685	21.6	4 107 349	22.7
Alguien amenazó con armas a otras personas	984 455	17.1	2 776 330	20.5	2 447 741	18.8	1 327 882	20.0	3 634 567	22.2	3 869 619	21.4
Alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales usando fuerza física o bajo amenazas de herirle o matarle	389 981	6.8	951 501	7.1	980 500	7.5	346 460	5.2	977 660	6.0	914 840	5.1
Alguien atacó con violencia a otros(as)	1 243 117	21.0	3 052 975	22.2	2 670 715	20.1	1 957 222	29.5	5 338 856	32.6	5 179 274	28.6
Se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas	1 007 270	17.8	2 864 745	21.7	2 680 448	21.5	1 309 954	19.8	3 838 551	23.4	4 228 605	23.4

Porcentajes obtenidos de la población femenina según edad.

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo

Cuadro TI12

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto:												
Que los metan en la cárcel	912 112	2.7	638 657	1.7	1 550 769	2.1	718 745	1.9	525 537	1.3	1 244 281	1.6
Que los internen en hospitales psiquiátricos	7 042 124	20.5	7 675 450	20.3	14 717 574	20.4	7 305 153	19.3	7 057 360	17.6	14 362 513	18.4
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	16 703 791	48.6	19 598 159	51.7	36 301 950	50.2	16 967 884	44.9	19 159 570	47.8	36 127 455	46.4
Curarles en su propio ambiente	5 658 080	16.5	5 812 739	15.3	11 470 819	15.9	6 961 957	18.4	7 105 395	17.7	14 067 353	18.1
Que se curen por su cuenta	2 657 840	7.7	2 552 320	6.7	5 210 160	7.2	3 007 630	8.0	2 814 767	7.0	5 822 398	7.5
Otra	1 407 636	4.1	1 598 377	4.2	3 006 013	4.2	2 805 318	7.4	3 420 382	8.5	6 225 700	8.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según edad

Cuadro TI13

N por subgrupo	ENA 2008						ENA 2011					
	12-25 años		26-34 años		35-65 años		12-25 años		26-34 años		35-65 años	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Rehabilitación más efectiva para un adicto:												
Que los metan en la cárcel	595 433	2.1	275 479	1.8	679 857	2.3	593 226	2.0	194 727	1.3	456 329	1.4
Que los internen en hospitales psiquiátricos	6 697 967	24.0	2 687 133	17.8	5 332 474	18.2	7 068 680	24.3	2 273 070	15.1	5 020 762	14.9
Que los metan en granjas especiales para adictos lejos de la ciudad	13 150 574	47.2	7 921 304	52.4	15 230 072	52.1	12 064 966	41.4	7 404 056	49.2	16 658 433	49.5
Curarles en su propio ambiente	4 465 555	16.0	2 492 579	16.5	4 512 685	15.4	5 656 008	19.4	2 630 446	17.5	5 780 898	17.2
Que se curen por su cuenta	1 986 736	7.1	1 097 259	7.3	2 126 165	7.3	2 125 997	7.3	1 163 560	7.7	2 532 841	7.5
Otra	992 288	3.6	642 005	4.2	1 371 720	4.7	1 636 690	5.6	1 397 468	9.3	3 191 542	9.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Bloque 8: Tendencias de indicadores sobre secciones de percepción, exposición a la prevención y conducta antisocial, por región.

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por región, sexo y grupos de edad:

Población que ha sido expuesta a la prevención del consumo de drogas, que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, que ha vendido drogas, que ha tomado parte en riñas o peleas, que ha usado un cuchillo o pistola para obtener un objeto de otra persona, percepción de la población sobre: la venta de drogas en las escuelas o fuera de ellas, violencia y victimización en la colonia y venta de drogas en la vía pública o en las tienditas; ocurridos en los últimos 12 meses. Asimismo, se presenta la comparación de estos indicadores con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según sexo

Cuadro TRI1

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	24.6	25.5	25.0	47.6	48.3	48.0
Noroccidental	32.0	37.4	34.7	44.7	51.2	47.9
Nororiental	27.5	28.2	27.9	35.8	43.9	39.9
Occidental	29.1	31.4	30.3	35.6	38.7	37.2
Centro	28.2	35.3	31.9	40.5	45.5	43.1
Ciudad de México	30.0	31.4	30.7	34.6	40.4	37.7
Centro Sur	29.5	30.3	29.9	40.2	48.3	44.4
Sur	31.0	33.4	32.2	50.3	49.5	49.9
Nacional	28.9	32.4	30.7	40.8	45.7	43.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI2

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12–17 años	18–34 años	35–65 años	12–17 años	18–34 años	35–65 años
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	53.1	22.6	15.5	76.1	47.4	37.6
Noroccidental	57.1	33.7	26.5	76.6	45.4	39.7
Nororiental	56.1	26.1	18.4	62.2	42.1	29.9
Occidental	58.5	26.4	21.3	61.5	36.3	28.3
Centro	55.3	30.0	23.0	67.0	43.5	33.1
Ciudad de México	52.3	32.6	22.5	70.0	37.0	29.9
Centro Sur	51.6	26.5	22.2	65.8	41.6	37.8
Sur	50.1	31.3	23.7	65.5	47.8	45.0
Nacional	54.3	28.9	22.0	67.2	42.6	34.7

Porcentajes obtenidos según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a algún programa de prevención, según edad

Cuadro TRI3

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12–25 años	26–34 años	35–65 años	12–25 años	26–34 años	35–65 años
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	39.4	17.5	15.5	62.6	41.8	37.6
Noroccidental	47.2	28.6	26.5	60.8	40.9	39.7
Nororiental	43.6	18.6	18.4	54.7	34.9	29.9
Occidental	43.1	22.8	21.3	48.4	33.6	28.3
Centro	43.8	26.5	23.0	60.0	34.3	33.1
Ciudad de México	45.3	24.9	22.5	53.5	32.6	29.9
Centro Sur	40.8	23.2	22.2	54.2	38.4	37.8
Sur	43.1	25.1	23.7	58.8	42.0	45.0
Nacional	43.2	24.2	22.0	56.9	36.5	34.7

Porcentajes obtenidos según edad.

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según sexo

Cuadro TRI4

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres %	Mujeres %	Total %	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	2.2	.8	1.5	1.5	1.4	1.5
Noroccidental	1.8	.5	1.2	1.9	.7	1.3
Nororiental	2.5	.4	1.4	2.9	.7	1.8
Occidental	1.8	.7	1.3	1.4	1.5	1.5
Centro	1.1	.2	.6	2.1	.7	1.4
Ciudad de México	1.5	.2	.8	.8	.9	.9
Centro Sur	1.1	.8	.9	2.4	1.3	1.8
Sur	1.2	.4	.8	1.9	1.2	1.5
Nacional	1.5	.5	1.0	2.0	1.0	1.5

Porcentajes obtenidos según sexo.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen, según edad

Cuadro TRI5

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	5.4	.9	.4	3.5	1.5	.7
Noroccidental	3.7	1.2	.1	3.5	.9	.9
Nororiental	3.0	1.0	1.3	4.9	1.8	.5
Occidental	2.1	2.0	.2	5.7	.6	.6
Centro	1.5	.5	.4	3.9	1.5	.2
Ciudad de México	1.0	.6	1.0	2.5	1.1	.2
Centro Sur	2.3	.6	.5	4.4	2.3	.3
Sur	1.5	.6	.5	4.1	.9	1.0
Nacional	2.3	.8	.5	4.2	1.4	.5

Porcentajes obtenidos según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según sexo

Cuadro TRI6

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres %	Mujeres %	Total %	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	1.6	.5	1.0	1.5	.6	1.0
Noroccidental	.6	***	.3	.3	.1	.2
Nororiental	.9	.4	.6	1.4	.9	1.2
Occidental	1.0	.3	.6	.7	.1	.4
Centro	1.3	.2	.7	1.0	.4	.7
Ciudad de México	1.5	.5	.9	1.6	.3	.9
Centro Sur	.5	.6	.5	.7	.4	.5
Sur	.4	.3	.4	.7	.4	.5
Nacional	1.0	.3	.6	.9	.4	.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma, según edad

Cuadro TRI7

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	1.8	1.1	.6	.7	1.9	.4
Noroccidental	.1	.6	--	.3	.2	.1
Nororiental	.3	.7	.7	3.0	1.1	.5
Occidental	.7	.6	.6	.7	.2	.4
Centro	.8	1.1	.2	.8	1.2	.1
Ciudad de México	1.7	.4	1.2	2.7	1.4	***
Centro Sur	.8	.5	.5	.9	.9	.1
Sur	.6	.3	.3	1.0	.3	.5
Nacional	.8	.7	.4	1.1	.9	.2

Porcentajes obtenidos según edad.

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según sexo

Cuadro TRI8

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres %	Mujeres %	Total %	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	6.1	1.3	3.7	7.1	1.6	4.3
Noroccidental	3.8	1.1	2.4	5.1	1.3	3.2
Nororiental	5.1	1.8	3.4	6.1	2.2	4.2
Occidental	3.9	1.2	2.5	6.9	2.2	4.5
Centro	3.5	1.0	2.2	7.0	2.7	4.8
Ciudad de México	5.2	1.7	3.3	4.1	1.8	2.9
Centro Sur	3.7	1.0	2.3	5.6	.6	3.0
Sur	1.9	.4	1.1	2.5	.6	1.5
Nacional	3.9	1.1	2.5	5.8	1.8	3.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas, según edad

Cuadro TRI9

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %
Norcentral	8.0	3.8	1.6	9.7	5.0	1.5
Noroccidental	4.2	3.3	.7	7.8	3.4	1.2
Nororiental	8.9	2.9	1.7	10.8	5.4	.6
Occidental	3.9	3.2	1.2	12.7	3.7	2.0
Centro	3.8	2.2	1.4	11.3	5.7	1.2
Ciudad de México	7.7	3.6	1.6	7.1	4.3	.8
Centro Sur	4.8	2.3	1.0	4.6	4.3	1.1
Sur	3.2	.8	.3	3.9	1.5	.5
Nacional	4.9	2.6	1.2	8.8	4.5	1.1

Porcentajes obtenidos según edad.

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre la venta de drogas dentro o fuera de las escuelas de su colonia en los últimos 12 meses, según sexo

Cuadro TRI10

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	23.0	17.7	20.4	22.5	20.8	21.6
Noroccidental	29.5	29.2	29.4	27.1	24.1	25.6
Nororiental	18.6	18.0	18.3	20.4	18.1	19.3
Occidental	31.8	31.0	31.4	29.1	25.1	27.0
Centro	23.0	20.9	21.9	25.9	24.6	25.2
Ciudad de México	53.7	49.2	51.3	35.0	32.9	33.9
Centro Sur	16.2	12.5	14.2	17.9	16.6	17.2
Sur	15.4	13.1	14.2	14.2	12.9	13.5
Nacional	24.7	22.3	23.4	23.9	22.0	22.9

Porcentajes obtenidos según sexo.

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre la venta de drogas dentro o fuera de las escuelas de su colonia en los últimos 12 meses, según edad

Cuadro TRI11

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %
Norcentral	21.0	22.0	18.2	26.0	20.8	20.7
Noroccidental	30.1	31.2	27.0	27.5	24.4	26.1
Nororiental	23.4	17.1	17.3	20.5	18.5	19.4
Occidental	30.1	32.6	30.9	32.4	26.9	25.0
Centro	16.7	24.8	21.7	22.1	25.9	25.9
Ciudad de México	52.1	49.3	52.9	38.1	35.6	31.6
Centro Sur	15.3	13.9	13.8	13.4	18.6	17.6
Sur	13.7	12.0	17.0	14.7	12.8	13.8
Nacional	21.6	24.2	23.5	22.4	23.1	22.9

Porcentajes obtenidos según edad.

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre la amenaza con armas hacia otras personas
en su colonia en los últimos 12 meses, según sexo**

Cuadro TRI12

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	19.3	18.2	18.7	26.8	22.2	24.5
Noroccidental	20.9	21.1	21.0	30.9	29.2	30.1
Nororiental	12.5	14.3	13.4	25.5	18.7	22.0
Occidental	19.6	18.8	19.2	29.6	24.3	26.9
Centro	22.0	19.5	20.7	30.7	22.6	26.5
Ciudad de México	45.6	40.9	43.0	28.5	25.6	27.0
Centro Sur	13.2	12.3	12.7	18.1	17.5	17.8
Sur	16.2	15.8	16.0	17.5	14.0	15.7
Nacional	20.4	19.3	19.8	26.3	21.5	23.8

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre la amenaza con armas hacia otras personas
en su colonia en los últimos 12 meses, según edad**

Cuadro TRI13

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %
Norcentral	18.9	22.4	14.8	26.3	25.0	23.3
Noroccidental	19.9	23.7	18.6	26.9	32.2	29.3
Nororiental	14.0	13.2	13.4	19.3	26.1	19.3
Occidental	18.0	23.5	15.6	28.1	28.2	25.0
Centro	14.2	25.8	18.5	22.6	31.0	23.7
Ciudad de México	45.5	45.2	39.9	19.3	28.7	27.7
Centro Sur	13.6	11.0	13.8	15.1	20.6	16.3
Sur	16.2	14.8	17.3	13.1	15.4	17.2
Nacional	17.4	22.2	18.4	20.9	26.5	22.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales, según sexo

Cuadro TRI14

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres %	Mujeres %	Total %	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	7.4	5.5	6.4	5.1	6.4	5.8
Noroccidental	4.9	7.3	6.1	7.8	7.2	7.5
Nororiental	4.3	2.1	3.2	3.6	3.6	3.6
Occidental	4.3	5.4	4.9	4.7	4.1	4.4
Centro	7.1	9.7	8.5	6.9	4.7	5.8
Ciudad de México	16.5	14.3	15.3	6.1	6.6	6.4
Centro Sur	5.7	5.7	5.7	6.5	7.2	6.9
Sur	5.5	4.4	5.0	5.0	4.6	4.8
Nacional	6.7	7.2	7.0	6.0	5.4	5.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales, según edad**

Cuadro TRI15

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %	12-17 años %	18-34 años %	35-65 años %
Norcentral	4.7	8.1	5.4	5.7	5.5	6.0
Noroccidental	5.7	7.0	5.3	5.6	8.2	7.5
Nororiental	2.2	3.3	3.5	3.6	3.4	3.9
Occidental	5.6	5.9	3.6	3.4	5.7	3.5
Centro	6.7	9.7	8.1	3.8	7.1	5.2
Ciudad de México	23.0	15.4	12.5	7.3	8.3	4.7
Centro Sur	2.6	7.1	5.8	6.9	6.9	6.8
Sur	5.5	4.3	5.4	5.6	3.8	5.4
Nacional	6.1	7.8	6.5	5.0	6.3	5.4

Porcentajes obtenidos según edad.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 TENDENCIAS DE OTROS INDICADORES POR REGIÓN

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien atacó con violencia a otros(as), según sexo**

Cuadro TRI16

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres %	Mujeres %	Total %	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	23.3	19.1	21.2	33.5	29.2	31.3
Noroccidental	24.4	22.8	23.5	37.1	36.5	36.8
Nororiental	18.3	16.0	17.1	29.7	27.3	28.5
Occidental	22.4	24.8	23.6	41.1	37.8	39.4
Centro	25.5	24.0	24.7	37.8	32.1	34.8
Ciudad de México	44.8	33.9	39.0	35.4	32.3	33.8
Centro Sur	15.8	13.3	14.5	28.3	26.2	27.2
Sur	17.1	16.5	16.8	22.9	20.5	21.7
Nacional	23.3	21.2	22.2	33.8	30.3	32.0

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien atacó con violencia a otros(as), según edad**

Cuadro TRI17

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	20.6	26.9	15.4	33.4	34.8	27.4
Noroccidental	21.1	27.7	20.1	36.1	38.6	35.4
Nororiental	17.7	19.7	14.1	28.6	33.7	23.7
Occidental	25.1	26.1	20.6	45.8	38.2	38.0
Centro	22.9	27.5	22.8	30.7	40.4	31.3
Ciudad de México	47.7	38.9	36.2	33.5	36.6	31.7
Centro Sur	14.7	14.9	13.9	25.8	31.5	23.9
Sur	18.4	16.6	16.1	22.6	20.6	22.4
Nacional	21.8	24.5	20.0	31.2	35.2	29.4

Porcentajes obtenidos según edad.

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre la venta de drogas en la vía pública o tienditas de su colonia en los últimos 12 meses, según sexo

Cuadro TRI18

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	Hombres %	Mujeres %	Total %	Hombres %	Mujeres %	Total %
Norcentral	24.7	19.6	22.2	27.4	23.0	25.2
Noroccidental	33.1	29.3	31.1	45.2	37.4	41.3
Nororiental	20.8	15.7	18.2	30.8	22.4	26.5
Occidental	38.0	33.5	35.8	41.8	33.8	37.7
Centro	18.9	18.2	18.5	26.5	19.9	23.1
Ciudad de México	53.8	45.7	49.6	28.2	27.6	27.9
Centro Sur	11.9	12.0	11.9	18.4	18.9	18.7
Sur	12.4	10.4	11.4	15.1	10.8	12.9
Nacional	23.9	20.9	22.4	27.9	22.8	25.3

Porcentajes obtenidos según sexo.

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre la venta de drogas en la vía pública o tienditas de su colonia en los últimos 12 meses, según edad

Cuadro TRI19

Región	ENA 2008			ENA 2011		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%	%	%	%
Norcentral	21.2	25.2	19.3	26.6	24.2	25.5
Noroccidental	26.3	34.9	29.1	35.3	40.7	44.1
Nororiental	17.8	20.1	16.4	24.7	29.0	25.0
Occidental	29.9	41.1	33.2	35.5	40.2	36.1
Centro	15.2	21.8	16.8	16.5	26.7	22.3
Ciudad de México	49.4	47.2	52.1	17.6	32.1	27.3
Centro Sur	10.4	11.4	13.2	14.1	18.9	20.4
Sur	9.6	10.9	13.0	13.1	12.1	13.6
Nacional	19.0	24.5	21.8	20.7	27.0	25.5

Porcentajes obtenidos según edad.

Bloque 9: Intervalos de confianza de indicadores de percepción de riesgo, exposición a la prevención y conducta antisocial.

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por sexo y grupos de edad con sus respectivos intervalos de confianza. Posteriormente se muestran los indicadores por regiones del país:

Exposición a la prevención, tomar dinero o cosas de valor, conducta antisocial y delincuencia, vender drogas, tomar parte en riñas o peleas, usar cuchillo o pistola para hurtar, percepción de la comunidad en relación a: la venta de drogas en escuelas o fuera de ellas, amenazas con armas a otras personas, forzar a otra persona a tener relaciones sexuales, atacar con violencia a otros, venta de drogas en la vía pública o en las tienditas; creencias sobre la rehabilitación para un adicto.

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad I.

Cuadro ICII

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-17	64.1	60.811-67.410
18-34	39.0	36.162-41.885
35-65	32.8	30.289-35.317
Subtotal Hombres	40.8	39.059-42.566
Mujeres		
12-17	70.4	67.323-73.490
18-34	46.0	43.414-48.608
35-65	36.4	34.299-38.505
Subtotal Mujeres	45.7	44.118-47.311
Total 12-17	67.2	64.833-69.600
Total 18-34	42.6	40.779-44.489
Total 35-65	34.7	33.036-36.349
Total	43.3	42.124-44.564

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención según sexo y edad II.

Cuadro ICI2

Sexo/Edad	%	IC 95%
Hombres		
12-25	54.5	51.618-57.297
26-34	30.6	26.524-34.610
35-65	32.8	30.289-35.317
Subtotal Hombres	40.8	39.059-42.566
Mujeres		
12-25	59.4	56.583-62.138
26-34	41.7	38.557-44.855
35-65	36.4	34.299-38.505
Subtotal Mujeres	45.7	44.118-47.311
Total 12-25	56.9	54.830-58.954
Total 26-34	36.5	33.959-39.106
Total 35-65	34.7	33.036-36.349
Total	43.3	42.124-44.564

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad I.

Cuadro ICI3

Sexo/Edad	Tomar dinero o cosas de valor		Atacar a alguien con algún objeto	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	5.1	3.738-6.377	1.3	0.618-1.997
18-34	2.1	1.218-2.966	1.6	0.855-2.343
35-65	0.6	0.217-0.969	0.2	0.029-0.343
Subtotal Hombres	2.0	1.529-2.427	0.9	0.615-1.278
Mujeres				
12-17	3.2	2.178-4.309	0.9	0.398-1.377
18-34	0.8	0.405-1.174	0.3	0.044-0.530
35-65	0.3	0.154-0.527	0.3	0.093-0.437
Subtotal Mujeres	1.0	0.733-1.242	0.4	0.229-0.520
Total 12-17	4.2	3.334-4.991	1.1	0.678-1.522
Total 18-34	1.4	0.955-1.882	0.9	0.542-1.301
Total 35-65	0.5	0.257-0.664	0.2	0.110-0.344
Total	1.5	1.212-1.721	0.7	0.476-0.826

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha presentado conductas antisociales y actos delictivos según sexo y edad II.

Cuadro ICI4

Sexo/Edad	Tomar parte en riñas o peleas		Se vendieron drogas en escuelas o fuera de ellas	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	12.4	10.242-14.502	23.7	20.868-26.525
18-34	7.3	5.705-8.853	24.7	21.850-27.489
35-65	1.8	1.179-2.323	23.2	20.895-25.520
Subtotal Hombres	5.8	5.090-6.565	23.9	22.195-25.556
Mujeres				
12-17	5.1	3.608-6.503	21.1	18.216-23.920
18-34	1.8	1.002-2.656	21.6	18.990-24.220
35-65	0.6	0.288-0.852	22.7	20.394-24.992
Subtotal Mujeres	1.8	1.363-2.227	22.0	20.238-23.757
Total 12-17	8.8	7.484-10.037	22.4	20.261-24.538
Total 18-34	4.5	3.591-5.335	23.1	21.017-25.155
Total 35-65	1.1	0.822-1.439	22.9	21.142-24.733
Total	3.7	3.319-4.171	22.9	21.499-24.312

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre conductas antisociales en su comunidad según sexo y edad I.

Cuadro ICI5

Sexo/Edad	Alguien amenazó con armas a otras personas		Alguien obligó a otra persona a tener relaciones sexuales	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	21.8	19.088-24.541	4.8	3.371-6.137
18-34	31.1	27.916-34.350	6.7	5.134-8.364
35-65	23.7	21.147-26.159	5.8	4.419-7.142
Subtotal Hombres	26.3	24.228-28.381	6.0	5.052-6.917
Mujeres				
12-17	20.0	16.789-23.268	5.2	3.954-6.498
18-34	22.2	19.982-24.386	6.0	4.696-7.239
35-65	21.4	19.407-23.352	5.1	4.147-5.962
Subtotal Mujeres	21.5	19.944-23.020	5.4	4.745-6.147
Total 12-17	20.9	18.620-23.246	5.0	4.059-5.914
Total 18-34	26.5	24.485-28.532	6.3	5.225-7.465
Total 35-65	22.5	20.710-24.209	5.4	4.592-6.206
Total	23.8	22.343-25.285	5.7	5.076-6.336

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre conductas antisociales en su comunidad según sexo y edad II.

Cuadro ICI6

Sexo/Edad	Alguien atacó con violencia a otros(as)		Se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres				
12-17	32.8	29.569-35.935	21.6	18.917-24.357
18-34	38.1	34.926-41.263	30.9	27.962-33.793
35-65	30.2	27.503-32.924	27.8	25.209-30.319
Subtotal Hombres	33.8	31.672-35.924	27.9	25.997-29.842
Mujeres				
12-17	29.5	26.614-32.427	19.8	17.030-22.485
18-34	32.6	29.853-35.319	23.4	21.063-25.795
35-65	28.6	26.327-30.903	23.4	21.099-25.627
Subtotal Mujeres	30.3	28.497-32.191	22.8	21.076-24.540
Total 12-17	31.2	28.785-33.531	20.7	18.697-22.722
Total 18-34	35.2	33.027-37.469	27.0	24.924-29.134
Total 35-65	29.4	27.424-31.325	25.5	23.522-27.385
Total	32.0	30.373-33.656	25.3	23.736-26.824

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad I.

Cuadro ICI7

Sexo/Edad	Que los metan en la cárcel		Que los internen en hospitales psiquiátricos		Que los metan en granjas para adictos lejos de la ciudad	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	1.9	1.500-2.306	19.3	17.712-20.974	44.9	42.963-46.894
Mujeres	1.3	0.974-1.649	17.6	16.354-18.860	47.8	46.159-49.441
Total	1.6	1.296-1.901	18.4	17.360-19.538	46.4	45.025-47.788
Total 12-25	2.0	1.583-2.487	24.3	22.546-25.960	41.4	39.380-43.411
Total 26-34	1.3	0.833-1.753	15.1	13.087-17.093	49.2	46.170-52.136
Total 35-65	1.4	0.992-1.721	14.9	13.578-16.271	49.5	47.720-51.317

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Creencias de la población de 12 a 65 años sobre la rehabilitación para las personas con dependencia según sexo y edad II.

Cuadro IC18

Sexo/Edad	Curarles en su propio ambiente		Que se curen por su cuenta		Otra	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	18.4	16.913-19.955	8.0	7.005-8.922	7.4	6.540-8.316
Mujeres	17.7	16.280-19.173	7.0	6.261-7.783	8.5	7.645-9.422
Total	18.1	16.919-19.221	7.5	6.828-8.130	8.0	7.318-8.676
Total 12-25	19.4	17.770-21.042	7.3	6.329-8.260	5.6	4.794-6.437
Total 26-34	17.5	15.198-19.727	7.7	6.374-9.075	9.3	7.688-10.866
Total 35-65	17.2	15.639-18.729	7.5	6.579-8.479	9.5	8.425-10.550

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según sexo

Cuadro ICI9

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	47.6	43.993-51.293	48.3	45.151-51.356	48.0	45.336-50.573
Noroccidental	44.7	40.285-49.059	51.2	47.703-54.657	47.9	44.913-50.905
Nororiental	35.8	31.419-40.279	43.9	39.293-48.407	39.9	36.810-43.003
Occidental	35.6	31.201-39.970	38.7	34.689-42.689	37.2	33.909-40.454
Centro	40.5	36.416-44.513	45.5	41.861-49.217	43.1	40.252-45.974
Ciudad de México	34.6	30.270-38.974	40.4	35.519-45.311	37.7	33.886-41.426
Centro Sur	40.2	35.729-44.674	48.3	44.202-52.356	44.4	41.784-47.089
Sur	50.3	45.246-55.383	49.5	45.906-53.005	49.9	46.707-53.044
Nacional	40.8	39.059-42.566	45.7	44.118-47.311	43.3	42.124-44.564

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según edad

Cuadro ICI10

Región	12–17 años		18–34 años		35–65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	76.1	72.292-79.852	47.4	43.253-51.581	37.6	34.365-40.935
Noroccidental	76.6	71.974-81.269	45.4	40.286-50.477	39.7	35.584-43.723
Nororiental	62.2	54.911-69.574	42.1	36.890-47.287	29.9	26.115-33.778
Occidental	61.5	55.887-67.082	36.3	31.786-40.884	28.3	24.138-32.381
Centro	67.0	61.212-72.876	43.5	39.092-47.838	33.1	29.229-37.042
Ciudad de México	70.0	62.147-77.871	37.0	31.571-42.489	29.9	24.798-34.935
Centro Sur	65.8	60.829-70.781	41.6	37.461-45.735	37.8	33.792-41.747
Sur	65.5	60.476-70.433	47.8	43.096-52.493	45.0	40.257-49.652
Nacional	67.2	64.833-69.600	42.6	40.779-44.489	34.7	33.036-36.349

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según edad

Cuadro ICI11

Región	12–17 años		18–34 años		35–65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	72.3	67.265-77.296	49.4	43.530-55.303	36.2	30.840-41.490
Noroccidental	70.3	63.116-77.392	44.7	37.107-52.358	34.9	29.146-40.657
Nororiental	55.1	43.684-66.518	38.0	30.113-45.832	26.6	20.766-32.525
Occidental	59.5	51.678-67.326	32.6	26.400-38.828	28.4	22.850-34.041
Centro	68.2	61.137-75.164	38.1	31.334-44.948	30.6	24.478-36.757
Ciudad de México	69.5	58.812-80.157	32.5	25.289-39.662	26.7	21.166-32.168
Centro Sur	58.6	50.519-66.634	36.1	28.977-43.144	35.4	28.827-41.924
Sur	60.7	53.048-68.343	47.2	39.381-55.115	48.6	41.815-55.320
Nacional	64.1	60.811-67.410	39.0	36.162-41.885	32.8	30.289-35.317

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según edad

Cuadro ICI12

Región	12–17 años		18–34 años		35–65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	80.0	75.119-84.841	45.5	40.315-50.706	39.0	35.087-43.007
Noroccidental	83.3	78.091-88.592	46.0	40.070-52.012	44.4	39.188-49.521
Nororiental	69.7	62.024-77.279	46.1	38.861-53.418	33.0	27.605-38.489
Occidental	63.5	55.180-71.779	39.8	33.746-45.935	28.1	23.194-32.984
Centro	65.9	58.091-73.730	48.3	41.965-54.665	35.4	30.638-40.066
Ciudad de México	70.5	61.086-79.984	41.4	34.008-48.733	32.6	25.315-39.889
Centro Sur	73.2	66.952-79.479	46.5	40.559-52.527	39.9	34.164-45.552
Sur	70.4	64.501-76.275	48.3	43.087-53.525	41.5	36.434-46.647
Nacional	70.4	67.323-73.490	46.0	43.414-48.608	36.4	34.299-38.505

Población de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según edad

Cuadro ICI13

Región	12–25 años		26–34 años		35–65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	62.6	58.933-66.238	41.8	36.077-47.426	37.6	34.365-40.935
Noroccidental	60.8	56.167-65.353	40.9	34.418-47.482	39.7	35.584-43.723
Nororiental	54.7	48.702-60.725	34.9	28.199-41.658	29.9	26.115-33.778
Occidental	48.4	43.947-52.923	33.6	27.304-39.851	28.3	24.138-32.381
Centro	60.0	54.882-65.155	34.3	28.184-40.471	33.1	29.229-37.042
Ciudad de México	53.5	47.053-60.037	32.6	26.349-38.842	29.9	24.798-34.935
Centro Sur	54.2	49.675-58.679	38.4	33.362-43.470	37.8	33.792-41.747
Sur	58.8	54.223-63.319	42.0	36.087-47.933	45.0	40.257-49.652
Nacional	56.9	54.830-58.954	36.5	33.959-39.106	34.7	33.036-36.349

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población masculina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según edad

Cuadro ICI14

Región	12–25 años		26–34 años		35–65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	61.2	56.487-65.850	44.2	35.877-52.623	36.2	30.840-41.490
Noroccidental	58.8	52.071-65.555	38.4	29.132-47.595	34.9	29.146-40.657
Nororiental	49.6	41.560-57.621	28.1	16.833-39.330	26.6	20.766-32.525
Occidental	43.9	36.993-50.740	33.4	24.787-42.031	28.4	22.850-34.041
Centro	61.7	54.924-68.545	23.4	14.343-32.529	30.6	24.478-36.757
Ciudad de México	52.6	43.455-61.670	26.7	18.350-35.110	26.7	21.166-32.168
Centro Sur	46.8	40.236-53.439	34.1	24.963-43.228	35.4	28.827-41.924
Sur	56.7	49.957-63.506	39.6	30.013-49.112	48.6	41.815-55.320
Nacional	54.5	51.618-57.297	30.6	26.524-34.610	32.8	30.289-35.317

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población femenina de 12 a 65 años que ha sido expuesta a la prevención por región según edad

Cuadro ICI15

Región	12–25 años		26–34 años		35–65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	64.1	59.129-69.125	39.8	33.035-46.624	39.0	35.087-43.007
Noroccidental	62.7	57.229-68.266	43.6	34.756-52.524	44.4	39.188-49.521
Nororiental	60.5	52.103-68.867	40.4	32.116-48.664	33.0	27.605-38.489
Occidental	53.0	47.118-58.939	33.7	25.136-42.311	28.1	23.194-32.984
Centro	58.4	51.325-65.491	44.7	37.471-51.970	35.4	30.638-40.066
Ciudad de México	54.4	46.448-62.436	38.8	30.499-47.066	32.6	25.315-39.889
Centro Sur	62.1	56.216-68.073	41.3	33.678-48.825	39.9	34.164-45.552
Sur	60.9	55.033-66.807	44.0	37.112-50.885	41.5	36.434-46.647
Nacional	59.4	56.583-62.138	41.7	38.557-44.855	36.4	34.299-38.505

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por región según sexo

Cuadro ICI16

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.5	0.878-2.220	1.4	0.642-2.129	1.5	0.954-1.977
Noroccidental	1.9	0.852-3.027	0.7	0.235-1.158	1.3	0.730-1.911
Nororiental	2.9	1.297-4.433	0.7	---	1.8	0.816-2.693
Occidental	1.4	0.735-2.100	1.5	0.728-2.243	1.5	0.907-1.998
Centro	2.1	1.061-3.213	0.7	0.167-1.161	1.4	0.799-1.938
Ciudad de México	0.8	0.175-1.383	0.9	0.064-1.792	0.9	0.328-1.386
Centro Sur	2.4	1.124-3.688	1.3	0.657-1.952	1.8	1.102-2.555
Sur	1.9	0.814-2.889	1.2	0.648-1.819	1.5	0.978-2.094
Nacional	2.0	1.529-2.427	1.0	0.733-1.242	1.5	1.212-1.721

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por región según edad

Cuadro ICI17

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	3.5	2.049-4.986	1.5	0.522-2.473	0.7	0.171-1.130
Noroccidental	3.5	1.576-5.512	0.9	0.274-1.605	0.9	0.129-1.572
Nororiental	4.9	2.165-7.700	1.8	0.287-3.387	0.5	---
Occidental	5.7	3.258-8.179	0.6	---	0.6	0.092-1.009
Centro	3.9	2.053-5.797	1.5	0.401-2.543	0.2	---
Ciudad de México	2.5	---	1.1	0.190-2.055	0.2	---
Centro Sur	4.4	2.451-6.330	2.3	0.792-3.803	0.3	---
Sur	4.1	2.448-5.851	0.9	---	1.0	0.133-1.949
Nacional	4.2	3.334-4.991	1.4	0.955-1.882	0.5	0.257-0.664

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por región según edad

Cuadro ICI18

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	4.1	2.200-6.063	1.7	0.235-3.090	0.4	---
Noroccidental	5.3	1.788-8.776	1.2	0.089-2.313	1.4	0.013-2.698
Nororiental	8.9	4.331-13.472	2.9	0.133-5.694	0.5	---
Occidental	5.8	2.672-8.915	0.9	---	0.1	---
Centro	5.4	2.101-8.661	2.4	0.317-4.398	0.5	---
Ciudad de México	1.1	---	1.3	---	0.2	---
Centro Sur	5.0	2.184-7.765	3.6	0.528-6.678	0.1	---
Sur	3.0	1.122-4.931	1.0	---	2.1	0.298-3.993
Nacional	5.1	3.738-6.377	2.1	1.218-2.966	0.6	0.217-0.969

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado dinero o cosas que no le pertenecen por región según edad

Cuadro ICI19

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	2.9	0.520-5.247	1.3	0.183-2.498	0.9	0.058-1.696
Noroccidental	1.7	---	0.7	---	0.4	---
Nororiental	0.8	---	0.8	---	0.5	---
Occidental	5.6	1.833-9.455	0.3	---	1.0	0.116-1.842
Centro	2.4	0.277-4.589	0.7	---	--	---
Ciudad de México	3.9	---	0.9	---	0.2	---
Centro Sur	3.8	0.906-6.675	1.1	0.168-2.096	0.5	---
Sur	5.3	2.650-7.990	0.7	---	--	---
Nacional	3.2	2.178-4.309	0.8	0.405-1.174	0.3	0.154-0.527

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por región según sexo

Cuadro ICI20

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	1.5	0.418-2.653	0.6	0.122-0.980	1.0	0.453-1.614
Noroccidental	0.3	0.026-0.506	0.1	---	0.2	0.031-0.308
Nororiental	1.4	0.128-2.696	0.9	0.246-1.632	1.2	0.458-1.887
Occidental	0.7	0.176-1.209	0.1	---	0.4	0.118-0.622
Centro	1.0	0.258-1.716	0.4	0.049-0.693	0.7	0.284-1.047
Ciudad de México	1.6	0.205-2.917	0.3	---	0.9	0.216-1.591
Centro Sur	0.7	---	0.4	0.055-0.697	0.5	0.102-0.990
Sur	0.7	0.009-1.330	0.4	---	0.5	0.139-0.888
Nacional	0.9	0.615-1.278	0.4	0.229-0.520	0.7	0.476-0.826

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por región según edad

Cuadro ICI21

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.7	0.168-1.216	1.9	0.461-3.282	0.4	0.020-0.822
Noroccidental	0.3	---	0.2	---	0.1	---
Nororiental	3.0	0.868-5.119	1.1	---	0.5	---
Occidental	0.7	---	0.2	---	0.4	---
Centro	0.8	0.092-1.571	1.2	0.305-2.114	0.1	---
Ciudad de México	2.7	---	1.4	0.007-2.862	***	---
Centro Sur	0.9	0.050-1.687	0.9	---	0.1	---
Sur	1.0	0.106-1.955	0.3	---	0.5	---
Nacional	1.1	0.678-1.522	0.9	0.542-1.301	0.2	0.110-0.344

***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población masculina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por región según edad

Cuadro ICI22

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.8	---	3.3	0.493-6.040	0.3	---
Noroccidental	0.5	---	0.3	---	0.1	---
Nororiental	3.8	0.264-7.372	2.0	---	--	---
Occidental	1.2	---	0.3	---	0.8	---
Centro	1.0	---	2.0	0.228-3.769	--	---
Ciudad de México	4.9	---	2.2	---	0.1	---
Centro Sur	0.2	---	1.8	---	--	---
Sur	0.9	---	0.6	---	0.7	---
Nacional	1.3	0.618-1.997	1.6	0.855-2.343	0.2	0.029-0.343

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población femenina de 12 a 65 años que ha atacado a alguien con algún tipo de arma por región según edad

Cuadro ICI23

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	0.6	0.006-1.241	0.5	---	0.5	---
Noroccidental	--	---	--	---	0.2	---
Nororiental	2.1	---	0.4	---	1.1	---
Occidental	0.2	---	--	---	0.1	---
Centro	0.6	---	0.5	---	0.2	---
Ciudad de México	0.5	---	0.7	---	--	---
Centro Sur	1.6	---	0.1	---	0.1	---
Sur	1.2	---	--	---	0.4	---
Nacional	0.9	0.398-1.377	0.3	0.044-0.530	0.3	---

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por región según sexo

Cuadro ICI24

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	7.1	5.195-8.921	1.6	0.867-2.272	4.3	3.274-5.243
Noroccidental	5.1	3.624-6.514	1.3	0.583-1.924	3.2	2.366-3.976
Nororiental	6.1	3.996-8.289	2.2	0.782-3.687	4.2	2.845-5.474
Occidental	6.9	4.985-8.720	2.2	1.235-3.255	4.5	3.393-5.568
Centro	7.0	5.170-8.795	2.7	1.542-3.881	4.8	3.699-5.808
Ciudad de México	4.1	2.447-5.785	1.8	0.580-3.109	2.9	1.973-3.879
Centro Sur	5.6	3.712-7.475	0.6	0.132-1.109	3.0	1.997-3.975
Sur	2.5	1.388-3.575	0.6	0.139-1.028	1.5	0.898-2.127
Nacional	5.8	5.090-6.565	1.8	1.363-2.227	3.7	3.319-4.171

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por región según edad

Cuadro ICI25

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	9.7	6.936-12.462	5.0	3.133-6.838	1.5	0.546-2.508
Noroccidental	7.8	5.052-10.573	3.4	1.807-5.087	1.2	0.498-1.928
Nororiental	10.8	6.817-14.853	5.4	2.914-7.946	0.6	0.014-1.210
Occidental	12.7	8.265-17.043	3.7	2.067-5.357	2.0	1.064-2.859
Centro	11.3	8.291-14.279	5.7	3.451-8.011	1.2	0.413-1.993
Ciudad de México	7.1	2.597-11.651	4.3	2.211-6.313	0.8	0.173-1.499
Centro Sur	4.6	2.499-6.748	4.3	2.249-6.333	1.1	0.389-1.791
Sur	3.9	2.088-5.674	1.5	0.366-2.561	0.5	0.052-0.914
Nacional	8.8	7.484-10.037	4.5	3.591-5.335	1.1	0.822-1.439

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población masculina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por región según edad

Cuadro ICI26

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	14.0	9.220-18.697	8.6	5.065-12.156	2.9	0.991-4.811
Noroccidental	11.5	7.119-15.973	6.1	3.060-9.124	1.7	0.494-2.837
Nororiental	16.1	8.639-23.516	7.8	3.293-12.311	0.8	---
Occidental	17.2	11.071-23.277	6.5	3.271-9.790	2.9	1.318-4.479
Centro	15.2	9.975-20.410	8.7	4.643-12.712	1.8	0.281-3.288
Ciudad de México	10.5	2.780-18.162	5.8	2.725-8.833	1.0	---
Centro Sur	7.6	3.963-11.314	8.6	4.444-12.704	1.9	0.566-3.207
Sur	5.1	2.533-7.651	2.7	0.501-4.913	1.0	0.110-1.878
Nacional	12.4	10.242-14.502	7.3	5.705-8.853	1.8	1.179-2.323

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Población femenina de 12 a 65 años que ha tomado parte en riñas o peleas por región según edad

Cuadro ICI27

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	5.3	2.633-7.985	1.5	0.080-2.980	0.2	---
Noroccidental	3.9	1.273-6.472	0.8	---	0.8	---
Nororiental	5.4	1.612-9.180	3.1	0.609-5.582	0.4	---
Occidental	8.2	3.658-12.667	1.1	---	1.1	0.091-2.103
Centro	7.3	3.539-11.021	3.0	0.713-5.381	0.7	0.011-1.373
Ciudad de México	3.8	---	2.8	---	0.7	---
Centro Sur	1.5	---	0.5	---	0.4	---
Sur	2.6	0.506-4.735	0.3	---	--	---
Nacional	5.1	3.608-6.503	1.8	1.002-2.656	0.6	0.288-0.852

**Cuando en los intervalos de confianza incluyen al cero, se muestran tres guiones, indicando que la precisión del estudio no permite detectar la prevalencia de la conducta

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas por región según sexo**

Cuadro ICI28

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	22.5	19.050-25.940	20.8	18.227-23.381	21.6	19.215-24.049
Noroccidental	27.1	22.620-31.598	24.1	20.400-27.874	25.6	22.264-28.997
Nororiental	20.4	16.386-24.452	18.1	14.279-21.964	19.3	16.184-22.324
Occidental	29.1	24.083-34.080	25.1	20.278-29.917	27.0	22.558-31.507
Centro	25.9	22.024-29.727	24.6	20.246-29.016	25.2	21.922-28.530
Ciudad de México	35.0	30.222-39.838	32.9	27.805-37.955	33.9	30.076-37.732
Centro Sur	17.9	13.976-21.920	16.6	12.969-20.160	17.2	14.180-20.265
Sur	14.2	10.597-17.764	12.9	10.017-15.837	13.5	10.796-16.284
Nacional	23.9	22.195-25.556	22.0	20.238-23.757	22.9	21.499-24.312

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas por región según edad**

Cuadro ICI29

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	26.0	21.769-30.149	20.8	17.274-24.329	20.7	17.541-23.878
Noroccidental	27.5	22.230-32.709	24.4	19.944-28.889	26.1	21.457-30.665
Nororiental	20.5	15.810-25.273	18.5	13.564-23.517	19.4	15.617-23.256
Occidental	32.4	26.179-38.616	26.9	22.057-31.726	25.0	19.698-30.341
Centro	22.1	17.009-27.252	25.9	20.656-31.100	25.9	21.443-30.281
Ciudad de México	38.1	31.052-45.171	35.6	29.831-41.313	31.6	26.545-36.572
Centro Sur	13.4	9.397-17.471	18.6	14.193-23.059	17.6	13.898-21.273
Sur	14.7	10.871-18.482	12.8	9.383-16.161	13.8	10.187-17.477
Nacional	22.4	20.261-24.538	23.1	21.017-25.155	22.9	21.142-24.733

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES

Percepción de la población masculina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas por región según edad

Cuadro ICI30

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	25.5	20.079-30.945	23.0	17.626-28.379	20.8	15.975-25.684
Noroccidental	30.4	22.694-38.038	24.6	18.339-30.798	28.2	21.969-34.469
Nororiental	23.1	16.242-29.895	18.2	11.265-25.152	21.5	16.126-26.804
Occidental	34.3	25.235-43.345	28.2	21.826-34.617	27.7	21.432-34.032
Centro	24.4	17.672-31.226	27.6	20.603-34.565	24.9	19.134-30.595
Ciudad de México	37.0	27.170-46.800	40.6	32.985-48.312	30.0	23.647-36.265
Centro Sur	12.1	8.034-16.239	21.6	14.641-28.639	17.3	12.286-22.274
Sur	17.3	11.435-23.260	11.9	6.884-16.831	15.1	9.620-20.593
Nacional	23.7	20.868-26.525	24.7	21.850-27.489	23.2	20.895-25.520

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población femenina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, se vendieron drogas en las escuelas o fuera de ellas por región según edad

Cuadro ICI31

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	26.4	20.773-32.065	18.7	14.852-22.554	20.6	17.018-24.178
Noroccidental	24.4	17.573-31.252	24.3	18.468-30.056	23.9	18.419-29.433
Nororiental	17.9	11.362-24.476	18.9	11.861-25.874	17.5	12.469-22.597
Occidental	30.5	23.099-37.888	25.6	19.803-31.474	22.5	16.496-28.535
Centro	19.8	12.878-26.631	24.3	17.458-31.190	26.7	21.214-32.267
Ciudad de México	39.2	29.029-49.456	30.7	23.681-37.785	32.9	25.527-40.329
Centro Sur	14.8	8.593-20.935	15.9	11.515-20.354	17.9	13.169-22.536
Sur	11.9	7.697-16.117	13.6	8.964-18.293	12.6	8.512-16.744
Nacional	21.1	18.216-23.920	21.6	18.990-24.220	22.7	20.394-24.992

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien amenazó con armas a otras personas por región según sexo

Cuadro ICI32

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	26.8	23.461-30.205	22.2	19.092-25.285	24.5	21.887-27.041
Noroccidental	30.9	25.804-35.972	29.2	25.058-33.417	30.1	26.160-33.974
Nororiental	25.5	21.062-29.897	18.7	14.677-22.697	22.0	18.931-25.139
Occidental	29.6	25.114-34.083	24.3	20.328-28.194	26.9	23.351-30.356
Centro	30.7	25.252-36.153	22.6	18.739-26.396	26.5	22.664-30.250
Ciudad de México	28.5	23.846-33.130	25.6	21.507-29.770	27.0	23.500-30.491
Centro Sur	18.1	14.110-22.079	17.5	14.484-20.459	17.8	15.047-20.489
Sur	17.5	12.895-22.073	14.0	11.091-16.921	15.7	12.480-18.934
Nacional	26.3	24.228-28.381	21.5	19.944-23.020	23.8	22.343-25.285

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien amenazó con armas a otras personas por región según edad**

Cuadro ICI33

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	26.3	21.945-30.705	25.0	21.535-28.510	23.3	19.951-26.558
Noroccidental	26.9	21.408-32.322	32.2	27.242-37.252	29.3	24.319-34.197
Nororiental	19.3	13.987-24.521	26.1	20.553-31.711	19.3	15.509-23.158
Occidental	28.1	22.674-33.625	28.2	23.849-32.626	25.0	20.383-29.647
Centro	22.6	16.544-28.603	31.0	26.054-36.002	23.7	19.235-28.231
Ciudad de México	19.3	13.276-25.340	28.7	23.283-34.070	27.7	23.143-32.215
Centro Sur	15.1	11.142-19.147	20.6	16.282-24.970	16.3	13.248-19.359
Sur	13.1	9.441-16.799	15.4	11.387-19.384	17.2	13.026-21.431
Nacional	20.9	18.620-23.246	26.5	24.485-28.532	22.5	20.710-24.209

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población masculina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien amenazó con armas a otras personas por región según edad

Cuadro ICI34

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	28.3	22.127-34.532	30.7	25.382-36.095	22.7	18.292-27.197
Noroccidental	29.6	22.359-36.805	32.7	25.537-39.897	29.7	23.064-36.325
Nororiental	22.7	13.495-31.835	30.3	22.133-38.441	22.1	16.289-27.900
Occidental	33.4	25.845-41.015	31.3	24.176-38.405	26.4	21.039-31.691
Centro	21.1	14.617-27.547	41.2	33.104-49.326	24.8	18.347-31.351
Ciudad de México	15.7	9.256-22.230	33.4	26.186-40.524	28.1	21.230-34.979
Centro Sur	15.0	10.071-20.016	20.8	14.190-27.497	17.0	12.056-21.940
Sur	16.7	10.832-22.590	15.1	9.466-20.642	20.4	13.644-27.176
Nacional	21.8	19.088-24.541	31.1	27.916-34.350	23.7	21.147-26.159

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población femenina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien amenazó con armas a otras personas por región según edad

Cuadro ICI35

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	24.3	18.204-30.313	19.6	15.453-23.693	23.7	19.406-28.063
Noroccidental	24.0	17.625-30.368	31.8	26.014-37.524	28.8	23.304-34.348
Nororiental	15.7	9.663-21.767	22.0	15.383-28.702	16.7	11.135-22.345
Occidental	22.8	15.815-29.862	25.4	20.108-30.613	23.8	18.197-29.341
Centro	24.1	15.434-32.770	21.7	16.405-27.090	22.8	18.004-27.497
Ciudad de México	22.9	14.051-31.726	24.2	17.179-31.256	27.3	22.214-32.418
Centro Sur	15.2	9.579-20.916	20.4	15.890-24.974	15.7	11.809-19.585
Sur	9.4	5.905-12.891	15.7	11.320-20.072	14.2	10.142-18.305
Nacional	20.0	16.789-23.268	22.2	19.982-24.386	21.4	19.407-23.352

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales por región según sexo**

Cuadro ICI36

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	5.1	3.556-6.580	6.4	4.679-8.181	5.8	4.532-6.993
Noroccidental	7.8	5.457-10.117	7.2	5.186-9.209	7.5	5.774-9.213
Nororiental	3.6	1.686-5.598	3.6	2.115-5.178	3.6	2.405-4.883
Occidental	4.7	3.051-6.399	4.1	2.616-5.512	4.4	3.200-5.570
Centro	6.9	4.391-9.314	4.7	3.093-6.400	5.8	4.125-7.382
Ciudad de México	6.1	3.803-8.449	6.6	4.364-8.865	6.4	4.709-8.054
Centro Sur	6.5	4.381-8.683	7.2	5.473-8.948	6.9	5.442-8.333
Sur	5.0	3.095-6.834	4.6	3.222-5.974	4.8	3.595-5.959
Nacional	6.0	5.052-6.917	5.4	4.745-6.147	5.7	5.076-6.336

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales por región según edad

Cuadro ICI37

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	5.7	3.647-7.836	5.5	3.630-7.394	6.0	4.313-7.673
Noroccidental	5.6	3.006-8.109	8.2	5.757-10.716	7.5	5.286-9.772
Nororiental	3.6	1.539-5.744	3.4	1.398-5.367	3.9	1.924-5.840
Occidental	3.4	1.369-5.356	5.7	3.910-7.571	3.5	2.111-4.892
Centro	3.8	1.713-5.911	7.1	4.035-10.259	5.2	3.259-7.197
Ciudad de México	7.3	3.027-11.532	8.3	5.334-11.258	4.7	2.659-6.730
Centro Sur	6.9	4.677-9.139	6.9	4.753-9.137	6.8	4.731-8.923
Sur	5.6	3.434-7.757	3.8	2.225-5.410	5.4	3.368-7.466
Nacional	5.0	4.059-5.914	6.3	5.225-7.465	5.4	4.592-6.206

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población masculina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales por región según edad

Cuadro ICI38

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	3.8	1.217-6.326	6.5	3.465-9.558	4.3	2.280-6.317
Noroccidental	4.5	1.702-7.336	10.2	6.209-14.167	6.8	3.476-10.144
Nororiental	2.7	0.247-5.135	3.3	0.342-6.332	4.3	1.003-7.562
Occidental	3.9	1.414-6.391	6.5	3.425-9.506	3.4	1.504-5.278
Centro	4.2	0.690-7.694	8.6	4.142-12.985	6.4	2.854-9.899
Ciudad de México	7.1	2.775-11.490	8.7	4.755-12.604	3.8	0.880-6.695
Centro Sur	6.1	2.896-9.249	5.4	1.976-8.785	7.8	4.176-11.440
Sur	6.2	2.819-9.487	2.7	0.670-4.754	6.8	3.401-10.125
Nacional	4.8	3.371-6.137	6.7	5.134-8.364	5.8	4.419-7.142

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población femenina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien obligó a otro(a) a tener relaciones sexuales por región según edad

Cuadro ICI39

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	7.8	4.410-11.136	4.6	2.337-6.782	7.6	5.197-9.977
Noroccidental	6.7	2.430-10.878	6.3	3.511-8.996	8.2	5.633-10.846
Nororiental	4.6	1.211-8.043	3.4	0.733-6.123	3.5	1.415-5.596
Occidental	2.8	0.316-5.323	5.1	2.756-7.358	3.6	1.771-5.436
Centro	3.4	0.947-5.898	5.9	2.519-9.195	4.2	2.069-6.366
Ciudad de México	7.4	1.330-13.524	7.9	4.088-11.773	5.5	2.673-8.268
Centro Sur	7.8	4.134-11.394	8.3	5.596-11.087	6.0	3.789-8.151
Sur	5.0	2.335-7.699	4.9	2.512-7.193	4.1	2.030-6.261
Nacional	5.2	3.954-6.498	6.0	4.696-7.239	5.1	4.147-5.962

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien atacó con violencia a otros(as) por región según sexo**

Cuadro ICI40

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	33.5	29.832-37.084	29.2	25.831-32.652	31.3	28.529-34.085
Noroccidental	37.1	32.304-41.906	36.5	31.950-41.023	36.8	32.886-40.708
Nororiental	29.7	24.100-35.307	27.3	22.771-31.798	28.5	24.402-32.551
Occidental	41.1	36.184-45.931	37.8	33.092-42.555	39.4	35.146-43.642
Centro	37.8	32.459-43.117	32.1	27.461-36.805	34.8	30.714-38.959
Ciudad de México	35.4	30.281-40.473	32.3	27.584-37.040	33.8	29.980-37.563
Centro Sur	28.3	23.824-32.751	26.2	22.589-29.834	27.2	23.982-30.416
Sur	22.9	18.107-27.693	20.5	17.097-23.934	21.7	18.187-25.176
Nacional	33.8	31.672-35.924	30.3	28.497-32.191	32.0	30.373-33.656

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien atacó con violencia a otros(as) por región según edad**

Cuadro ICI41

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	33.4	29.028-37.740	34.8	30.863-38.713	27.4	23.568-31.278
Noroccidental	36.1	30.475-41.728	38.6	33.183-44.012	35.4	30.578-40.246
Nororiental	28.6	22.123-35.054	33.7	26.831-40.620	23.7	19.495-27.906
Occidental	45.8	39.486-52.066	38.2	33.567-42.857	38.0	32.339-43.595
Centro	30.7	25.071-36.296	40.4	35.024-45.751	31.3	26.423-36.179
Ciudad de México	33.5	26.749-40.222	36.6	30.931-42.280	31.7	26.463-36.910
Centro Sur	25.8	20.767-30.854	31.5	26.868-36.045	23.9	20.084-27.769
Sur	22.6	17.663-27.538	20.6	16.232-24.992	22.4	17.757-27.025
Nacional	31.2	28.785-33.531	35.2	33.027-37.469	29.4	27.424-31.325

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población masculina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, alguien atacó con violencia a otros(as) por región según edad

Cuadro ICI42

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	31.2	25.138-37.267	41.3	35.742-46.768	27.4	22.109-32.689
Noroccidental	38.5	31.221-45.755	41.5	33.850-49.104	32.5	26.147-38.935
Nororiental	26.4	16.908-35.904	35.7	26.422-45.040	25.4	18.858-31.889
Occidental	50.7	42.130-59.281	40.0	33.602-46.375	38.1	31.844-44.262
Centro	33.8	26.253-41.329	46.2	38.582-53.905	31.4	24.539-38.358
Ciudad de México	34.4	24.995-43.880	35.8	27.220-44.432	35.3	28.493-42.058
Centro Sur	25.9	19.904-31.912	32.3	25.290-39.374	25.7	19.490-31.872
Sur	24.6	17.877-31.307	19.9	14.196-25.569	25.3	18.007-32.518
Nacional	32.8	29.569-35.935	38.1	34.926-41.263	30.2	27.503-32.924

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

**Percepción de la población femenina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
alguien atacó con violencia a otros(as) por región según edad**

Cuadro ICI43

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	35.6	29.700-41.565	28.6	23.206-34.039	27.4	22.983-31.909
Noroccidental	33.6	25.807-41.360	35.7	29.319-42.026	38.3	32.279-44.225
Nororiental	30.9	22.655-39.052	31.8	22.972-40.531	22.1	17.322-26.937
Occidental	40.8	33.232-48.404	36.5	30.438-42.639	37.9	31.074-44.701
Centro	27.5	21.132-33.864	35.1	28.203-41.903	31.2	25.528-36.814
Ciudad de México	32.5	22.374-42.685	37.3	30.103-44.593	28.6	22.644-34.594
Centro Sur	25.7	18.278-33.142	30.7	25.550-35.799	22.4	17.872-26.917
Sur	20.5	14.863-26.211	21.3	16.027-26.562	19.7	15.626-23.731
Nacional	29.5	26.614-32.427	32.6	29.853-35.319	28.6	26.327-30.903

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas por región según sexo

Cuadro ICI44

Región	Hombres		Mujeres		Total	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	27.4	23.414-31.486	23.0	19.868-26.080	25.2	22.211-28.122
Noroccidental	45.2	39.842-50.556	37.4	32.817-41.945	41.3	37.076-45.544
Nororiental	30.8	25.937-35.723	22.4	17.995-26.751	26.5	22.886-30.196
Occidental	41.8	36.669-46.929	33.8	29.573-37.927	37.7	33.540-41.779
Centro	26.5	22.030-31.001	19.9	15.655-24.116	23.1	19.389-26.722
Ciudad de México	28.2	23.912-32.393	27.6	23.222-32.059	27.9	24.498-31.271
Centro Sur	18.4	14.178-22.652	18.9	15.132-22.682	18.7	15.383-21.963
Sur	15.1	11.728-18.377	10.8	8.222-13.446	12.9	10.436-15.358
Nacional	27.9	25.997-29.842	22.8	21.076-24.540	25.3	23.736-26.824

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011 INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES

**Percepción de la población de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas por región según edad**

Cuadro ICI45

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	26.6	22.285-30.880	24.2	20.353-28.004	25.5	21.719-29.281
Noroccidental	35.3	29.772-40.903	40.7	34.957-46.366	44.1	38.817-49.379
Nororiental	24.7	19.428-29.994	29.0	23.451-34.449	25.0	20.735-29.309
Occidental	35.5	29.842-41.133	40.2	35.215-45.127	36.1	30.944-41.324
Centro	16.5	12.010-21.045	26.7	21.534-31.861	22.3	17.583-26.954
Ciudad de México	17.6	12.185-22.980	32.1	26.549-37.574	27.3	23.049-31.623
Centro Sur	14.1	10.109-18.117	18.9	14.640-23.185	20.4	15.899-24.960
Sur	13.1	9.238-16.882	12.1	8.873-15.372	13.6	10.488-16.793
Nacional	20.7	18.697-22.722	27.0	24.924-29.134	25.5	23.522-27.385

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

Percepción de la población masculina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia, se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas por región según edad

Cuadro ICI46

Región	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	28.3	22.264-34.303	29.8	23.585-36.037	25.0	19.662-30.350
Noroccidental	39.6	31.794-47.499	44.5	37.278-51.815	47.9	40.830-54.990
Nororiental	28.7	21.304-36.053	32.6	24.536-40.728	30.0	23.924-36.021
Occidental	38.3	29.932-46.626	45.2	37.728-52.580	40.0	33.958-46.118
Centro	15.8	9.842-21.848	32.9	26.122-39.742	25.0	18.809-31.260
Ciudad de México	15.1	7.598-22.659	33.7	26.333-41.082	27.3	21.747-32.838
Centro Sur	14.0	8.953-19.047	18.3	11.274-25.227	20.6	14.594-26.691
Sur	15.0	9.271-20.643	14.5	9.453-19.514	15.7	10.913-20.478
Nacional	21.6	18.917-24.357	30.9	27.962-33.793	27.8	25.209-30.319

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE OTROS INDICADORES**

**Percepción de la población femenina de 12 a 65 años sobre si en los últimos 12 meses en su colonia,
se vendieron drogas en la vía pública o en las tienditas por región según edad**

Cuadro ICI47

Región	ENA 2011					
	12-17 años		18-34 años		35-65 años	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Norcentral	24.8	19.296-30.362	18.8	14.695-22.924	26.0	21.814-30.115
Noroccidental	30.8	23.395-38.185	36.7	30.149-43.279	40.3	34.343-46.311
Nororiental	20.6	13.731-27.457	25.3	18.021-32.634	20.4	15.052-25.694
Occidental	32.7	25.732-39.627	35.5	29.953-40.999	32.5	26.577-38.487
Centro	17.2	10.809-23.644	21.0	15.227-26.809	19.8	14.251-25.418
Ciudad de México	20.0	12.213-27.882	30.5	23.303-37.683	27.4	21.575-33.173
Centro Sur	14.2	8.040-20.417	19.5	15.043-23.966	20.2	14.992-25.494
Sur	11.1	6.662-15.522	9.9	6.506-13.319	11.7	8.146-15.253
Nacional	19.8	17.030-22.485	23.4	21.063-25.795	23.4	21.099-25.627

Bloque 10: Cuadros de Nuevos Indicadores

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por sexo y grupos de edad:

Percepción del riesgo de consumir marihuana, heroína, cocaína e inhalables, tolerancia social por parte de la familia y el mejor amigo/a ante el consumo de drogas.

**Percepción del riesgo de consumir marihuana en población de 12 a 65 años
según sexo y edad**

Cuadro CN1

Sexo/Edad	N por grupo	Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	6 807 478	4 263 369	63.2
18-34	15 321 907	8 132 695	53.8
35-65	16 378 428	9 120 854	56.6
Subtotal	38 507 813	21 516 918	56.6
Mujeres			
12-17	6 630 096	4 688 370	71.0
18-34	16 383 671	10 847 519	66.8
35-65	18 099 630	12 258 906	68.2
Subtotal	41 113 398	27 794 795	68.1
Total	79 621 211	49 311 712	62.6

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Percepción del riesgo de consumir heroína en población de 12 a 65 años
según sexo y edad**

Cuadro CN2

Sexo/Edad	N por grupo	Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	6 807 478	5 052 941	76.6
18-34	15 321 907	12 062 064	80.5
35-65	16 378 428	12 856 644	81.0
Subtotal	38 507 813	29 971 648	80.1
Mujeres			
12-17	6 630 096	5 167 938	81.6
18-34	16 383 671	13 650 024	85.3
35-65	18 099 630	14 917 464	84.9
Subtotal	41 113 398	33 735 425	84.5
Total	79 621 211	63 707 073	82.4

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Percepción del riesgo de consumir cocaína en población de 12 a 65 años
según sexo y edad**

Cuadro CN3

Sexo/Edad	N por grupo	Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	6 807 478	5 172 435	77.2
18-34	15 321 907	12 145 473	80.1
35-65	16 378 428	12 931 203	80.7
Subtotal	38 507 813	30 249 111	79.9
Mujeres			
12-17	6 630 096	5 258 347	80.5
18-34	16 383 671	13 745 813	85.3
35-65	18 099 630	15 104 420	84.8
Subtotal	41 113 398	34 108 580	84.3
Total	79 621 211	64 357 691	82.2

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

**Percepción del riesgo de consumir inhalables en población de 12 a 65 años
según sexo y edad**

Cuadro CN4

Sexo/Edad	N por grupo	Es muy peligroso	
		N	%
Hombres			
12-17	6 807 478	4 926 589	74.0
18-34	15 321 907	11 886 053	78.8
35-65	16 378 428	12 677 842	79.2
Subtotal	38 507 813	29 490 484	78.1
Mujeres			
12-17	6 630 096	5 035 171	77.6
18-34	16 383 671	13 398 891	83.7
35-65	18 099 630	14 755 504	83.5
Subtotal	41 113 398	33 189 566	82.6
Total	79 621 211	62 680 051	80.4

Porcentajes obtenidos según sexo y edad.

Tolerancia social ante el consumo de drogas en población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro CN5

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	6 775 481	99.6	6 579 564	99.6	13 355 046	99.6
Tu mejor amigo/a	5 966 872	88.2	6 121 202	93.3	12 088 074	90.7

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

Tolerancia social ante el consumo de drogas en población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro CN6

N por subgrupo	Hombres		Mujeres		Total	
	N	%	N	%	N	%
Lo vería mal:						
Tu familia	31 262 864	98.9	34 055 659	99.2	65 318 524	99.1
Tu mejor amigo/a	27 676 214	89.2	31 988 905	96.4	59 665 118	92.9

Porcentajes obtenidos para cada indicador según sexo.

Bloque 11: Cuadros de los indicadores de percepción de riesgo del consumo de sustancias y tolerancia social, por región.

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por región, sexo y grupos de edad:

Percepción del riesgo de consumir marihuana, heroína, cocaína e inhalables, tolerancia social por parte de la familia y el mejor amigo/a ante el consumo de drogas.

**Percepción del riesgo de consumir marihuana,
población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNR1

Región	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	54.2	68.3	61.5
Noroccidental	50.6	65.2	57.9
Nororiental	57.7	71.2	64.6
Occidental	47.6	61.2	54.6
Centro	58.6	69.7	64.4
Ciudad de México	62.5	64.7	63.6
Centro Sur	56.7	69.5	63.5
Sur	61.4	70.4	66.0
Nacional	56.6	68.1	62.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción del riesgo de consumir marihuana,
población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNR2

Región	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Norcentral	70.3	58.9	60.3
Noroccidental	66.1	53.6	58.7
Nororiental	70.9	62.1	64.6
Occidental	63.6	52.6	52.9
Centro	65.0	62.8	65.6
Ciudad de México	70.9	62.3	62.8
Centro Sur	67.1	61.2	64.0
Sur	69.6	64.8	65.5
Nacional	67.0	60.5	62.7

Porcentajes obtenidos según edad.

**Percepción del riesgo de consumir heroína,
población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNR3

Región	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	81.0	84.7	82.9
Noroccidental	83.7	89.0	86.3
Nororiental	78.5	85.6	82.1
Occidental	83.5	88.5	86.1
Centro	80.0	84.7	82.5
Ciudad de México	88.2	86.6	87.3
Centro Sur	77.4	81.7	79.6
Sur	71.4	77.5	74.5
Nacional	80.1	84.5	82.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción del riesgo de consumir heroína,
población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNR4

Región	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Norcentral	82.5	84.9	81.3
Noroccidental	85.4	85.3	87.7
Nororiental	82.2	83.1	81.3
Occidental	81.9	85.8	88.0
Centro	76.6	84.8	82.7
Ciudad de México	81.2	89.3	87.4
Centro Sur	79.9	78.3	80.7
Sur	71.4	73.7	76.8
Nacional	79.1	83.0	83.1

Porcentajes obtenidos según edad.

**Percepción del riesgo de consumir cocaína,
población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNR5

Región	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	78.9	84.9	82.0
Noroccidental	82.5	90.6	86.5
Nororiental	76.7	84.3	80.5
Occidental	83.7	87.6	85.7
Centro	81.4	84.0	82.7
Ciudad de México	87.1	85.8	86.4
Centro Sur	76.2	81.8	79.1
Sur	72.4	78.7	75.6
Nacional	79.9	84.3	82.2

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción del riesgo de consumir cocaína,
población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNR6

Región	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Norcentral	81.5	83.8	80.5
Noroccidental	85.9	84.3	88.8
Nororiental	79.0	80.9	80.7
Occidental	82.3	84.6	88.2
Centro	76.9	85.4	82.7
Ciudad de México	83.2	87.4	86.5
Centro Sur	77.8	78.6	80.2
Sur	73.2	75.7	76.7
Nacional	78.9	82.8	82.9

Porcentajes obtenidos según edad.

**Percepción del riesgo de consumir inhalables,
población de 12 a 65 años según sexo**

Cuadro CNR7

Región	Es muy peligroso		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	78.0	83.7	80.9
Noroccidental	84.0	88.8	86.4
Nororiental	75.5	83.4	79.5
Occidental	82.5	87.0	84.8
Centro	77.0	80.9	79.0
Ciudad de México	87.0	87.5	87.2
Centro Sur	75.3	80.2	77.9
Sur	71.0	76.0	73.5
Nacional	78.1	82.6	80.4

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Percepción del riesgo de consumir inhalables,
población de 12 a 65 años según edad**

Cuadro CNR8

Región	Es muy peligroso		
	12-17 años	18-34 años	35-65 años
	%	%	%
Norcentral	81.8	82.0	79.6
Noroccidental	85.4	85.3	87.7
Nororiental	77.7	79.9	79.7
Occidental	81.5	85.0	86.0
Centro	70.8	82.4	79.2
Ciudad de México	82.0	86.4	89.2
Centro Sur	75.0	77.5	79.5
Sur	69.2	73.3	75.8
Nacional	75.8	81.3	81.4

Porcentajes obtenidos según edad.

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas,
población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNR9

Región	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	100.0	99.6	99.8
Noroccidental	100.0	99.4	99.7
Nororiental	99.6	100.0	99.8
Occidental	98.4	98.7	98.6
Centro	99.6	100.0	99.8
Ciudad de México	100.0	99.3	99.6
Centro Sur	100.0	99.6	99.8
Sur	99.7	99.3	99.5
Nacional	99.6	99.6	99.6

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas,
población de 12 a 17 años según sexo**

Cuadro CNR10

Región	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	89.2	92.5	90.8
Noroccidental	91.8	96.1	93.9
Nororiental	82.5	96.2	89.1
Occidental	90.4	91.6	91.0
Centro	83.4	91.7	87.5
Ciudad de México	85.8	89.1	87.4
Centro Sur	92.6	94.5	93.6
Sur	95.8	96.3	96.1
Nacional	88.2	93.3	90.7

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tolerancia social por parte de la familia ante el consumo de drogas,
población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNR11

Región	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	98.8	99.2	99.0
Noroccidental	98.9	99.4	99.1
Nororiental	99.2	99.6	99.4
Occidental	99.1	98.9	99.0
Centro	98.4	99.4	98.9
Ciudad de México	98.7	98.6	98.6
Centro Sur	99.5	99.1	99.3
Sur	99.2	99.3	99.2
Nacional	98.9	99.2	99.1

Porcentajes obtenidos según sexo.

**Tolerancia social por parte del mejor amigo/a ante el consumo de drogas,
población de 18 a 65 años según sexo**

Cuadro CNR12

Región	Lo vería mal		
	Hombres	Mujeres	Total
	%	%	%
Norcentral	90.6	97.3	94.0
Noroccidental	86.8	96.9	91.8
Nororiental	88.7	95.9	92.4
Occidental	92.1	97.7	95.0
Centro	87.2	95.3	91.5
Ciudad de México	91.5	94.6	93.1
Centro Sur	88.6	97.4	93.2
Sur	92.5	97.8	95.2
Nacional	89.2	96.4	92.9

Porcentajes obtenidos según sexo.

Bloque 12: Intervalos de confianza de nuevos indicadores

En este bloque se presentan los siguientes indicadores por sexo y grupos de edad con sus respectivos intervalos de confianza:

Percepción del riesgo de consumir marihuana, heroína, cocaína, inhalables y frecuentemente alcohol; tolerancia social de familia y amigos ante el consumo de drogas y alcohol.

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE NUEVOS INDICADORES**

Percepción del riesgo de consumir marihuana en población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN1

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	63.2	60.004-66.410
18-34	53.8	50.741-56.781
35-65	56.6	53.939-59.248
Subtotal Hombres	56.6	54.727-58.554
Mujeres		
12-17	71.0	68.031-73.874
18-34	66.8	64.348-69.274
35-65	68.2	65.892-70.483
Subtotal Mujeres	68.1	66.473-69.703
Total 12-17	67.0	64.877-69.204
Total 18-34	60.5	58.486-62.547
Total 35-65	62.7	60.724-64.691
Total	62.6	61.142-63.997

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE NUEVOS INDICADORES**

Percepción del riesgo de consumir heroína en población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN2

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	76.6	73.683-79.614
18-34	80.5	78.224-82.836
35-65	81.0	78.937-83.162
Subtotal Hombres	80.1	78.533-81.600
Mujeres		
12-17	81.6	78.964-84.207
18-34	85.3	83.544-87.123
35-65	84.9	83.228-86.545
Subtotal Mujeres	84.5	83.334-85.749
Total 12-17	79.1	77.086-81.049
Total 18-34	83.0	81.495-84.526
Total 35-65	83.1	81.600-84.532
Total	82.4	81.293-83.457

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE NUEVOS INDICADORES**

Percepción del riesgo de consumir cocaína en población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN3

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	77.2	74.426-80.045
18-34	80.1	77.998-82.300
35-65	80.7	78.599-82.867
Subtotal Hombres	79.9	78.381-81.380
Mujeres		
12-17	80.5	77.956-83.097
18-34	85.3	83.472-87.030
35-65	84.8	83.106-86.461
Subtotal Mujeres	84.3	83.111-85.455
Total 12-17	78.9	76.967-80.754
Total 18-34	82.8	81.357-84.202
Total 35-65	82.9	81.389-84.342
Total	82.2	81.111-83.198

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE NUEVOS INDICADORES**

Percepción del riesgo de consumir inhalables en población de 12 a 65 años según sexo y edad

Cuadro ICCN4

Sexo/Edad	Es muy peligroso	
	%	IC 95%
Hombres		
12-17	74.0	71.099-76.809
18-34	78.8	76.377-81.222
35-65	79.2	76.947-81.454
Subtotal Hombres	78.1	76.518-79.711
Mujeres		
12-17	77.6	74.893-80.371
18-34	83.7	81.742-85.601
35-65	83.5	81.685-85.232
Subtotal Mujeres	82.6	81.310-83.896
Total 12-17	75.8	73.715-77.822
Total 18-34	81.3	79.775-82.843
Total 35-65	81.4	79.851-83.020
Total	80.4	79.268-81.590

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE NUEVOS INDICADORES**

Tolerancia social ante el consumo de drogas en población de 12 a 17 años según sexo

Cuadro ICCN5

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	99.6	99.349-99.946	88.2	85.865-90.593
Mujeres	99.6	99.310-99.915	93.3	91.612-95.022
Total	99.6	99.406-99.854	90.7	89.276-92.192

**ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2011
INTERVALOS DE CONFIANZA DE NUEVOS INDICADORES**

Tolerancia social ante el consumo de drogas en población de 18 a 65 años según sexo

Cuadro ICCN6

Sexo/Edad	Lo vería mal tu familia		Lo vería mal tu mejor amigo/a	
	%	IC 95%	%	IC 95%
Hombres	98.9	98.433-99.330	89.2	87.882-90.481
Mujeres	99.2	98.949-99.479	96.4	95.630-97.133
Total	99.1	98.800-99.309	92.9	92.136-93.669

